

Tola le 26. Juillet 1877

Très honoré Monsieur,

J'ai remarqué à votre honoré lettre, que Mr. Borbas a décrit quelques espèces, dont il me n'a pas envoyé des exemplaires, p.e. le Leucanthem. platylepis et le Onosma fallax. A cause de cela je suis hors d'état de dire quelque chose sur ces plantes aussi que sur le Verbascum repandum et le Hieracium brevifolium, que je ne connais pas aussi.

Le Onobrychis Kisarii Barb. est sans doute cette plante, quelle B. a pris d'abord pour le O. Tommasinii S. Tard. et dont il m'a écrit que la semble l'être toute la même comme votre O. alba. - J'ai remarqué dès lors à Borbas l'incorrection de sa opinion pour quoi le O. Tommasinii ne ressemble pas au O. alba Desv (= Hedysarum album Wald. Kit.). J'ai lui remarqué en outre que votre O. alba sera peut-être

identique comme le *O. echinata* Dietr. (= *Hel-
ysarum echinatum* Jus. [Plantae rariorum quas in
Hiera per aras Iovis ac Adriatici maris etc
collegit. Neapoli 1826.] = *Oenobr. alba* Ten. non Desv.)
qui a l'aspect du véritable *O. alba* Desv.

Après cela Barbac mi'a envoyé 1-2 de gousses
de sa plante. Ils sont toute comme celles
de *O. echinata* et pour cela je croi aussi
jusqu'ici que le *O. Visianii* Barb. est le même
comme *O. echinata* Dietr. - Malheureusement
je ne peut vous envoyer de cette espèce,
car j'ai relâché les gousses peu à Barbac.

De *Trifolium adriaticum* Barb. je rais, qu'il
est une hybride de *T. hirta* et de *T. squarrosum*.
Je vous enverrai un original de cette plan-
te, mais je vous prie, veuillez me le retourner.

De *Eupatorium syriacum* on a trouvé
un seul individu aussi près Pola. Je
possède cette plante seulement de la Grèce
et de l'Asie mineure. Suivant Boissier
le *E. syriacum* n'est qu'une variété de

E. carnabinum. Des exemplaires de Dalmatie
je n'ai pas encore vu.

Le *Galium elatum* Thuill est la forme
commun du *G. Mollugo*, L. et pour cela la
plupart des botanistes prennent ces deux
noms pour synonymes. - Mais le *G. Mollu-
go* de Linné contient aussi le *G. erectum*
Florb. - Je n'ai pas vu jusqu'ici l'un ou
l'autre de Dalmatie.

Le *Cerastium glutinosum* Fries (non Humb. Boiss.
Kunth) contient suivant Nees & Meyen in
Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien XIV (1875)
deux espèces distinctes:

1.) *C. obscurum* Chaub. - Cette plante est
caractérisée par un vert sombre, par le marge
des bractées non scarieuses et par les sepales
dont le part vers atteint le sommet.

C'est quasi une forme intermédiaire entre
le *C. triviale* et le *C. pumilum*.

2. *C. pumilum* Curt. (non Gren. Godr.) = *C. glutinos.*
Fries (pr. parte) = *C. glutinos. (β) pallens* Koch, = *C. pallens*

F. Schultz nunc = C. semidecand. β . herbaceo-bracteatum
Fenzl, Neibl... - Cette plante est distincte
par son vert pâle, par les bractées largement
scarieuses et par les sepales, dont le part
vert n'atteint pas le sommet. - Forme
quasi intermédiaire entre le C. obscurum et
le C. semidecandrum L.

En Dalmatie on trouvera sûrement
aussi bien le C. obscurum que le C. pu-
nilum, mais le dernier plus rare.

Les marques du Arenaria serpyllifolia
et du A. leptoclados sont suivant Nees & Meyenb.

1. A. serpyllifolia L. (= A. sphaerocarpa Ten.) - La
cyme est répétée - et régulièrement fourchée;
les sepales du calice sont plus courts que
la capsule et celle est très ventreuse à
la base ^{de la} et rétrécie vers le sommet. Les
pédicelles sont dressés (non arqués au sommet).
Plante robuste.

2. A. leptoclados Juss. - Seulement les deux,
tout au plus les trois divisions inférieures