

Specie vegetali friulane

ommesse nel Catalogo della Prov. Veneta,
 x *Allium carinatum* L. in prati circa Udine, Friul.
 x *Allium ochroleucum* W. Krb. Ne ho raccolti due soli
 esemplari nella parte sup. della Valle di Resia, ma
 non ho dubbio sulla esattezza della determinazione,
 essendo esattamente simili ad esemplari che ho avuti
 anche dall'Ungheria.

x *Listera cordata* Rbr. Nei boschi subalpini presso Ligozzù,
 nel sito di Casatta, Morosini ne raccolse due soli esem-
 plari, e me li mandò per la determinazione. V.

Arum italicum - comunissimo anche nelle siepi del
 medio Friuli.

Correzioni od aggiunte

da farsi al Syllab. Flor. Goriziana,

x *Alnus pubescens* Turcz. Nelle convalle subalpine della
 Carnia

Salix rosmarinifolia L. Nelle due anfore del
 Tagliamento

Salicornia fruticosa et herbacea - liborale friulano in
 gran copia

Salvia Pragensis - delectum - è la S. Kati.
 x *Soldanella minima* Hoppe. nel M. Premaggiore. V.
 x *Primula villosa* Jacq. } sul Monte Premaggiore in V.
 x — *spectabilis* Tratt. } Carnia

x *Centunculus minimus* L. nei luoghi umidi a Malisana
 presso S. Giorgio di Nogaro. V.

x *Euphrasia serotina* L. presso Amaro. com. Morosini.

x *Pedicularis Jacquinii* Koch. Monte Liès V.

x — *recutita* L. Prati subalpini nella Valle d'Inca-
 ro in Carnia V.

x *Veronica prostrata* L. fra i sassi intorno a Udine.

x *Scrophularia vernalis* L. Nella Valle dell'Isongo.

x ~~the~~ *Hoppii* Koch. nella Valle del Natisone. V.

x *Pulmonaria azurea* Bess. nella Valle del Juri

x *Cynoglossum montanum* Link. Valle del Natisone V.

Jasminum fruticans - *delectatur* -
Phyllirea media β . *angustifolia* - in gran copia
 in Pineda delle dune.
Campanula Trachelium Wulf. sulle cime del M. Amariana
 — *pusilla* Haenke - anche in Carnia
 — *carnica* Schieda - Gemona e Canal del Ferro.
 — *medium* ^{delectatur}
 — *Lorei* Pollin - *delectatur* -
Hieracium aurantiacum L. Nei prati alpini presso
 Ligofullo e presso Monajò in Carnia.
 — *β. bicolor* - presso Coneglian sui
 monti.
— incisum Hoppe. ^{V.} reg. subalpina del Matajura
— Schraderi Scheid. M. del Lago presso Ligofullo
 e M. Amariana.
— auxplexicaule L. nei monti della Carnia non
 raro. ^{V.}
Soyeria montana Momm. M. Pale Val d'Incarojo ^{V.}
Crepis paludosa Mönch. - M. Dimon in Carnia
Prenanthes purpurea β . *angustifolia* - M. S. Simeone.
Hypochaeris uniflora Vill. M. Dimon presso Ligofullo.
Scorzonera austriaca Willd. M. Amariana ^{V.}
— alpina ^{Hoppe} ~~Prati alpini~~ *angustifolia*. Monte Pale. ^{fan}
~~*— alpina*?~~ ^{V.}
Leontodon Berini Roth. Nelle ghiaccia dei Torrenti
 Torre, Tagliamento, Spurgo frequente -
 — *saxatilis* Rehb. Nei siti aridi e ghiacciati intorno
 Udine
Lappula tomentosa - *delectatur* -
 — *minor*. lungo le strade, i muri qua e là.
Carduus personatus est Cord. *tenuiflorus* Curt.
 — *achanthoides* L. presso Amaro. ^{V.}
Cirsium pauciflorum - *eripithale* Nagel. nei boschi
 umidi lungo il Tagliamento presso Amaro.
^{V.}

x Cerastium brachypetalum Spreng. presso Udine,
x Stellaria cerastoides L. M. Lavij presso Ligofullo. ^{V.}
x Alpine tenuifolia Wühlb. sui margini dei campi a
 Zagagna, a Udine.
x Sagina subulata Himm. Nei pascoli subalpini della ^{V.}
 Carnia.
 — *bryoides* Graeb. Alpi presso Pontebba. ^{V.}
Silene italica Pers. comune nei campi
Polygala comosa Schk. *delectatur*,
Coleophaea Corvini - *delectatur* -
x Lepidium graminifolium - lungo i muri a
 Virio, Flaumbr -
Camelina sativa Litz. fra i cereali a Amaro.
Sinapis arvensis - comune in tutto il Friuli -
Dentaria bifolia H. Kib. - Nelle fessure delle roccie del
 M. Plaurij nel luogo detto S' Sips, presso
 Verzone. - ^{V.}
Papaver alpinum L. M. Premaggiore in Carnia
Aconitum Anthora L. *delectatur*.
Aquilegia Haenkeana Koch. A pic' delle alpi nella
 Valle del Natisone - Dell' Spurgo. ^{V.}
 — *virens* - *delectatur* - è la Aq. atrata Koch ^{V.}
Ranunculus cassubicus L. Presso Tortano.
 — *muricatus* - *delectatur* -
Anemone hepatica Wulf. *delectatur* -
Thalictrum Jaegerianum Koch. Monti d' Verzone
^{V.}

Lo *Scirpus* che aveva portato l'anno scorso a Padova
 sotto il nome di *Sc. littoralis*, e di Elle ha dubitativa-
 mente considerato come una varietà del *Sc. mar-
 timus* non può essere considerato come tale. Le
 foglie sono costantemente due vaginanti; l'in-
 volo è sempre monofllo e retto, quasi la conti-
 nuazione del culmo, (retto anche a spiche mature)
 gli stili due, le spighe mai più di tre, spesso due
 ed una sepoli - le cete ipogine 3, 4. lunghe.
 non cigliate o pinnose. Il frutto piano-convesso
 acuminato, pungente e substriolato, d'color
 cinreo, liscio. Mi parrebbe doverlo riferire al
Sc. (Rothii) Hoopesii, ma le cete ipogine non pinnose
 lo fanno differire. Se potessi farne raccogliere
 in Pineda sul mare dove l'ho raccolto, ne
 manderei a Lei di maturi. ma come fare
 ora?

- x *Juncus nemorensis* L. nei cespugli presso
 Monzù in Carnia
 x *Galium Helveticum* Weig. - Sin Forca di Suola V.
 nel M. Pennagione, col *Papaver alpinum*
 — *parviflorum* β *divaricatum*, nei luoghi aridi
 a Dignano, a Jagagna
Loranthus europaeus - *deleatus* -
Malabaila Haquetii Tausch. cresce in copia anche
 a Montebelluna, sul M. Quarnan, etc. V.
Penedanum Schottii Bess. fra i cespugli nei luoghi
 sassosi dei colli presso Jorgana V.
Tommasinia verticillaris *deleatus*.
Cnidium apioides Spreng. comune nei prati montani
 a Gemona, Venzona, etc.
~~*Taxifraga*~~
 — *Mohierii* Cuss. Secondo il Cav. Tommasini
 il *Selinum Mohierii* del Catal. di Suffren non
 sarebbe altro che il *Sel. venetum* di Sprengel.
 L'ubicazione data dal Suffren (prati di V. di David
 Toluggo etc) mi obbliga a non accettare tale opinio-
 ne, non avendo io mai trovato un solo esemplare
 del *Pened. venetum* nei prati di nessuna parte
 del Friuli, ma sempre nelle siepi o nei cespugli V.
Pimpinella dioica L. cresce in copia sul colle di S. Agnese
 presso Gemona.
Eringium planum - *deleatus* - cresce però presso
 Vipacco e Gorizia. V.
Taxifraga dioica Weig. Nei monti della Carnia non
 rara
Oenothera biennis, cresce in gran copia fra i cespugli
 presso il Porto Dignano. V.
Epilobium alpinum Nei luoghi torbosi dei monti
 presso Ponteba.

- Rosa rubrifolia* Vill. Nelle convalle subalpine Valle
 dell'Aupa. V.
 — *sempervirens* L. nelle siepi Udine, Latisana
 — *gallica* L. colli d'Manzano V. V.
 — *rubiginosa* L. presso i Boschi di Muzzana V.
 — *Cimamomnea* — *delectur* — e la R. alpina
Poterium polygamum Whitt. comune abboccatura
 ai tuoglii sud del medio Friuli V.
Genum rivale L. *P. hybridum*, / *P. hybridum* Wulf / mostruosa
 col calice cangiato in foglie - Nel M. di Monf. V.
Spiraea decumbens Koch. - Maggio ed altrove nel Canal
 del Fano. V.
Orobanch tuberosus L. comune nei colli tutti del Friuli
 x *Vicia cordata* Wulf - Lungo le siepi a Corno di Rosazzo,
 Gornogliano. V.
Coronilla montana - Valle del Judri presso Costanzo
 x *Phaca astragalina* - *delectur* - est *Oxytropis tri-*
flora Hoppe - V.
 x *Melilotus parviflora* Hoff. lungo gli argini delle
 Valli sotto Latisana.
Medicago Pironea Vis. - cresce in copia fra i fassi a
 Genova sul monte delle Fontane, a Monte
 nars. V.
 x *Genista elatior* Koch. - lungo le vie presso Cividale,
 Jaudy, Tricpinio.
Ononis cotinus L. comune nelle due presso la foce
 del Tagliamento.
Rhamnus infectoria L. nelle siepi presso Accaro. V.
 x *Geranium palustre* L. Nei cespugli presso Venzona
 Paluzza. V.
Linum angustifolium - sugli argini delle valli
 nel basso Friuli