

Déplacement.

Je ne puis rien dire de certain sur ce sujet, il est probable que cette forme lui est naturelle, bien cependant n'empêche de croire que ces morceaux détachés aient pu continuer de végéter, s'ils ont été placés dans des conditions avantageuses; car tout le monde sait que les lichens n'empruntent pas les éléments de leur nutrition aux corps sur lesquels ils prennent naissance, mais bien à l'air et à l'eau qu'il leur est en dissolution.

100 parties de *Lecanora esculenta* ont donné à M. Goebel de Dorpat:

1.75 de résine melle, d'un goût âcre et soluble dans l'éther et renfermant de la chlorophylle d'un vert jaune.

1.75 de résine melle insipide et insoluble dans l'alcool.

1.00 d'une substance amère soluble dans l'eau et dans l'alcool.

2.50 d'inuline.

20.00. de gelatine,
 2.20. de debris de lichen,
 60.90. d'oxalate de chaux,
 99.10.

Voyez Lehmann's, Journ. f. Chem. u. Phys. 1850
 N. III. Hft. 4. S. 292.

M. Leclercq pense que ce lichen est si abondant
 dans quelques contrées, que l'on pourroit
 en obtenir a bas prix l'acide oxalique de
 chaux.

2. Bericht über die Untersuchungen etc

Tom I. pag. 195-200.

Über die Natur des Kürzels in Klein Asien
 vom Himmel gefallenen Manna.. Von Dr. L.
 Ziffer.

Si riferisce alla manna cavata nel gennaio 1846
 nel distretto di Tenischikir nell'Asia minore,
 fa paragone colla manna degli Israeliti.
