

Regny 8 juin 1958

Monsieur et cher Collègue,

Merci de vouloir bien me continuer vos
bons offices. J'essaierai d'en profiter.

Le délai de l'envoi de nos plants causé
par votre absence me permet de vous
faire part de nos doutes sur le n° 2.

bractée de *Charma sphaerella cylindrica*??

Après mon envoi, le hasard m'a fait recueillir

une feuille de Chêne (*Q. pedunculata* ou *serotina*)
portant des perithèces agregées cette fois

non éparpillées comme sur la bractée. Même

aspect et même aspect, ce sans doute même
plante. Seulement sur le chêne les perithèces

avaient une apparence nectrioidé. En

cherchant dans les hypocreas de de Clee,

j'ai trouvé sur Chêne *Charonectria succinea*

Vol. I X, mais avec asies clavatis subobovatis

Ma plante n'est pas cela. En me tenant

par compte de l'aspect un peu nectrioidé,

j'ai songé à *hypospilium crumida*.

Asques et spores se rapportent assez bien

Mais je n'ai pas vu de rotium, ni
l'épiderme bullatum inflata de hypopila.
Je ne sais que penser.

J'ajoute, si vous voulez bien quelques
nos. — N° 10 sur papier pourrisé
dans un haie. belle plante Spheria
Sphaeragmii. — J'ai pris les 2 ou 3
petits. étudiés sur le frustulum
collé et marqué a; je pense qu'il en
reste. Je crois qu'il y en a aussi sur
le frustulum collé marqué b. Je ne
crois pas qu'il y en ait sur le papier

non collé. Ascis 130 avec le petit. 160
(autre petite de 10 seulement —)
sur 20^e de large clavate, paraphysate.
119 à 206

Sporid. lutea 3 septata, non constructa
deux furca 30-38 = 12, diticha vel
subditicha. Sans doute une Lycosporia
faute. il la rapprocher de L. Kunzeana
ou L. typharum sur typha. ?

N° 11 sur acer-pseudoplatanus
Valsa! au pseudoplatani? vel
amblicus? les spores sont en general

plus grande que les mesur. du Lyl. par
V. pseudo-platanus - et un peu plus petites
et moins uniformes de taille que V. ambigua.

N^o 12. Sur Atropa belladonna -

manus
Ophiobolus (junior) denthecia mollis,
membranacea, hypniobolus - asci de
cylindraceo-clavati circiter 120=10, perispori
in massâ rosulata - Sporidia -

Multiguttata, (longitudinarius asci?)

2^u latitudinis. Se trouvait à côté de

Oph. porphyrogonus -

N^o 13 - Sur Dryas (et Lappamuios?)

trouvée sur bien d'autres ~~la même~~
autres plantes.

Leptosporia! au galionum? ressemble

à la N. gentiane par les spores

distiques. Je les ai trouvés toujours distiques

même sur galionum.

N^o 14 - Sur Lythrum Salicaria

Diaporthe cypartha! impossible
à moi de voir un seul et faut le

regarder -

19 sur *Fraxinus lauro-cerasus*

Diaportha sur ortho! (qui n'est pas
Leutha, pour des sur feuilles) impossible
de voir s'il s'identifie à un autre.

16 - Sur *Wistaria sinensis* -

Une Diaportha qui me paraît être
un Chorostate et non pas le Diap.

(tetrast) Deponita du Vol I du Syllage.

dent. valiformes, pas de ligne noire
du moins - n'en vois pas -

En somme, sauf le n° 10 et le n° 16
peut-être, rien qui puisse vous
intéresser, mais vous me rendez
service, en dissipant mes doutes et
rélevant mes ignorances.

Le n° 5 je l'ai (sur chêne) et le
teignent de rouge, est le Leich. turgens
je crois - Je viens de le retrouver
non plus sur chêne, mais sur vaulx

Veuillez agréer, avec mes

sentiments reconnaissants

l'assurance de mon

dévouement

J. Haeger
ami de Rigay.

S.S. - Je vous envoie
de la souche
Van Franck
L'Institut
de la Cour
de la Cour