

WELTPOST-VEREIN (UNION POSTALE UNIVERSELLE).

11  
CORRESPONDENZ-KARTE (CARTE POSTALE).

(ADMINISTRATION D'AUTRICHE.)



An  
Chiamerino Sig.<sup>r</sup> Professore  
F. P. A. Saccardo

in

Padova  
H. Orto Botanico

Gregorio Vig. Professore,

Trento li Marzo 1891

La ringrazio delle sue indicazioni. Il mio n. 1 è Polyp. australis Fr. che è comune nella parte meridionale d'Europa. Lo troverà anche nell'Essicata di Linhart sotto i nomi: Pol. Linarthii Kalkbr. et Pol. adpressus Schulz. Dall'Italia lo ebbi più volte da Martelli, e molti esemplari ne esistono nell'Erbario del Museo fiorentino. Il mio n. 2 è Pol. appplanatus Fr. (non Vig.) che differisce dal primo per la corteccia più sottile, e superiormente color cannella carico persistente, per il tessuto <sup>color</sup> ~~modo~~ più chiaro, e per la spora affatto liscia, o appena puntata. Tra queste due forme c'è poi il Pol. vegetus, il quale ha il colore dell'australis, ma la corteccia e la spora dell'appplanatus. Errore il Pol. gelicicola eguale al mio n. 1, io non posso considerare altrimenti che Pol. australis Fr. A questa specie è pure da riferirsi il Pol. appplanatus Pers. Obj. 2 p. 2 a reputo buono, e Ganoderma appplanatus Patoull. le pure Ganoderma sp. Gf; mentre che il Gan. australe Pat. l. c. è da riferirsi al Pol. vegetus. Ho dunque perciò la seguente sinonimia:

Ganoderma australe Fr. Syn. Pol. appplanatus, Pers. Fr. Patouillard  
Pol. Linarthii Kalkbr. Pol. adpressus Schulz. Pol. gelicicola Berlep.  
Ganoderma vegetus Fr. Syn. Gan. australe, Pat.

Ebbi recentemente da Alcocker esemplari autentici di Thelyphora perdia Korbij, di Daedalea Paetschii Schulz, e Daedalea Schaeferi Paetsch. La prima è semplicemente Mercurium frustulosum Fr., la seconda affatto Trametes protracta Fr., e la terza è la forma media tra Trametes subrepens e Trametes bicolor, che Blonski descrive nell'Herwigia 1889 sotto il nome di Daedalea subrepens Alb et Schw. var. anceps Bl.

Uti vides con Affinitate etc. Sua Offina G. Brusadola