

Trento 25. II. 96

Stimatissimo Amico,

Il Hymenochaete n.° 2010 è senza dubbio
affine all'Hym. tabacum e H. ferruginea,
e come le stape allo stato perfetto pilate.
La differenza sta principalmente nei tubercoli.
Dell' invenis, i quali forse non sono costanti
e converrebbe avere molti esemplari
sott'occhio per vedere come si mantengono.
Talvolta scoppi tubercoli, anche copiosi, nell'
Hymenoch. ferruginea Bull. (= rubiginosa Scler.),
e nell'Hym. cinnamomea [Cott. Fr.]; del resto
con nessuna specie da me conosciuta di Radulum,
Adonia o Grandina è la stape affine. —
La Trametes populina, secondo me, è specie
distinta dalle Tram. Tropici e
sospettare che il Protomyces Carstianus fosse
simile al Prot. violaceus, ma non avendo
fra le mani nessuna ~~specie~~ pubblicazione
del Præst 'altius non era in capo di de-
cidere —

Publicare un saggio di sinonimia degli Invenis
miceti coriacei-legnosi sarebbe certamente uti-
le, ma mi sembra di non avere amore abbastan-
za materiale, avendo trovato, come già le Aspi,
poichissimo nell' Erbario di Triest, ed inoltre avendo
ancor meno materiale delle specie dell' America del Nord.
Mi credi
Vittorio Mattioli Sordaniola

WELTPOST-VEREIN (UNION POSTALE UNIVERSELLE).

CORRESPONDENZ-KARTE (CARTE POSTALE).

(ADMINISTRATION D'AUTRICHE.)



An

Nur für die Adresse
Réservé exclusivement à l'adresse

Chauspino Vjhr Professore

Dr. P. A. Saccardo

in Padova

R. Orto Botanico.

