

Trento 16. VI. 1896

Gregio Amico,

Ricevuto sabato la sua cartolina e per  
mattina il piego dei funghi australiani. Le  
co pranto poter rilevare.

1. Ganoderma ochroleucatum Mont. !
2. Trametes ochroleuca Berk. ! (Polyp. Syst.)
3. Lenzites, è vicino del Pol. plebejus, dal quale però è distinto. L'esemplare è troppo incompleto per tentarne una determinazione -
4. Polyporus contractus Berk. forma ad Pol. zonatae accedens. Da nuovi confronti fatti sarei ora disposto a distinguere il Pol. contractus dal Pol. rugulosus Lev. delle Plantae javanicae, che rinveniva nei funghi delle isole di St. Thomè e Principe. Il primo lo trovo sempre fertile, e ritengo una forma resupinata dello stesso, introdotta in Europa colle piante esotiche, il Pol. undatus Pers. (= Polyp. Broomii Rabenh. !)
5. La ritengo una forma giovane delle Trametes cubensis Mont., però mi resta qualche dubbio -

6. Ignoto. Probabilmente un Fomes; ma ha  
l'imenio quasi distrutto, simile a. per cui  
non saprei ove riferirlo

7. Trametes n. sp.? Tengo di questa specie  
un frammento imitativo da Patschke, pure  
dell'Australia, e che da Cooke fu determinato  
Polyp. biformis Berk. Certamente non è Polyp.  
biformis Klotz, nec Fr. — Propenderei a crederlo  
nuovo. —

8. Polystichus dispar Kalesh. ! Però non è  
che una semplice forma del P. elongatus Berk.  
il quale, secondo me, sarebbe pure una forma  
del Pol. biformis Klotz Fr. in Klotz Linn. VIII.  
Anche il Pol. pergamentum Fr. e il Pol. flabellum  
Munt. in un solo capace di distinguersi dallo  
stesso — Si vede che è un fungo cosmopolita,  
che varia nelle forme e nell'indumento del  
cappello. Si trova anche in Italia (Firenze, Sar-  
degna), nell'Ungheria e Slavonia e comunissimo.  
Ne ebbi da Kmet tutte le forme possibili —

9. Polyporus dichypus Mont.

10. Troppo poco sviluppato e incompleto; secondo  
me indeterminabile
- 11 Polystichus scinthopus Fr.
- 12 Fomes hemileucay Berk. = Pol. vittatay B.  
= Pol. aculearay Berk. etc
- 13 Polystichus sanguineus l'esemplare più tenue  
con rudimenti di gambo, e  
Trametes cinnabarinus (Sap.) l'altro.  
Non ebbi mai esemplari fertili di P. sanguineus  
per confrontare le spore con quelle della  
Trametes cinn. Forse sono soltanto due for-  
me della medesima specie -
- 14 Fomes carneus Nies, utri videtur. Pos-  
stratosi! Il Fomes carneus però degli  
autori dell'America del Nord non lo ritengo  
distinto dal Pol. roseus Alb. & Scha
15. Piuttosto Hexagonia hirta Pol. per gli in-  
crementi annui che il suo esemplare presenta.  
Del resto degli esemplari vecchi, che sempre ebbe,

non sono giunto amore a rilevare tra questi  
due specie una esatta specifica differenziale.

16 Polystichus Peradeniae Berk. ex Cooke  
(= Pol. chrysolaucy Kuhn!)

Probabilmente anche = Hemaf. utellina Ces.,  
che non conosco. Non mi sembra diverso neppure  
il Pol. byrsinum Mont; ~~ma~~ finora non ho  
che frammenti —

17. Hirneola fusco-succinea Mont. ! = Laschia  
~~hemellop~~ e delicata D. = Laschia velutina Lev. !  
= Membrina favoscy Will! Almeno io non so tro-  
vare nessuna nota stabile differenziale; perciò  
stando alle priorità sarebbe da ritenersi sotto  
il nome:

Hirneola delicata (D.) Bry. Fungus dello Sudafrica.

Möller la unisce alle Hirneola auricula Tadm.,  
ma intendo a torto; inoltre mi sembra che non  
sia giustificata l'unione col genere Quadrularia  
del genere Hirneola —

18 Hexagonia glabra Lev. ! var: lenzitoidea  
 (= Liotrema ochroleucum Lev. !)

Fungo <sup>= Lenzites lancea Cooke</sup> variabilissimo a pari diffuso in Oriente,  
 onde non capisco come non sia registrato nel  
 Handbook of Australian Fungi di Cooke -  
 Torp è dato sotto un altro nome. Mi rin-  
 cresce che Cooke sia ora impotente, altrimenti  
 si gliene manderei un esemplare per veder.  
 I suoi due esemplari sono marcatamente la-  
 mellati, per cui sarebbe meglio classificarli tra le  
Leptoglyphis o tra le Trometes. Una vera Hexagonia  
 non è. Io ne tengo un esemplare tutto poroso.  
 Da giovane il cappello ha tinta arilla-va ed è,  
 sub lente, pubescente —

Gradisca i sensi della mia distante stima ed  
 affettuosa amicizia

Osimo  
 G. Bresadola

P. Dell'opera del dr. Lanzi: Funghi della Pro-  
 vincia Romana sono usciti più di tre fascicoli?