

Gregis Amice,

Veneto 20. VI. 96

L'esemplare che determinerei Trametes cinnabarina è = Pol. sanguineus, var: sessilis, Kalchb!

È una forma in Cinnabara, che però si avvicina molto più alla Tram. cinn. colle quale ha comune:  
1. Cappello marcatamente dimidiato - sessile, anzi sovente elongato in serie. 2. Color più oscuro - nu-  
mato. 3. margine del cappello molto ottuso d'color ranciato. 4. Spora. I pori sono più piccoli, quasi come quelli del P. sanguineus, ma invece hanno le pareti più grosse e i tubi più lunghi. La testatura deli' imenio è quella del P. sanguineus, ma con un numero maggiore di ipi d' dimens. di  $2\frac{1}{2}\mu$ . Dunque per la conformazione imeniale è forma media, pel resto è appunto Tram. cinnabarina. - Osservo poi, che X

Il n.º 18 non è Buziles nivea, la quale è di color bianco, di forme pulvinata e con lamelle molto più larghe. La figura di Cooke che dà la sezione del cappello offre anche questi caratteri; l'altra è un po' ambigua

Mi permetterò di spedirle la ventura settimana due o tre funghilli dubbi pel suo parere. —

Mi creda con fin cordale  
e per poter calcolare sulla dimen-  
sione dei pori converrebbe sempre  
avere esemplari perfettamente  
sviluppato, altrimenti si troppovano  
G. Bresadola

WELTPOST-VEREIN (UNION POSTALE UNIVERSELLE).

CORRESPONDENZ-KARTE (CARTE POSTALE)

(ADMINISTRATION D'AUTRICHE.)



Nur für die Adresse  
Réservé exclusivement à l'adresse

An *Chiarissima Sig.<sup>ra</sup> Professoressa*

*Dr. P. A. Saccardo*

*in*

*Padova*

*R. Orto Botanico*