

Carpino Amico,

Tronto 4/V 913

Prima di tutto, per non dimenticarmi un'altre
votta, la viziosità del fascicolo della *Mycotho-*
ca italica, per le dire viziosità su suoi funghi:
1. *Bolbitis*? Sembra una forma di *Bolbitis tener*,
ma osservo che un esemplare mostra qualche
filetto all'apice del gambo per cui sembrerebbe
avere le lamelle decorrenti ed allora sarebbe
piuttosto una *Tubaria*. Del resto sovra un esem-
plare disseccato e che non presenta chiari rap-
porti i caratteri principali io non fabbriche-
rei una specie nuova. Per li *Aporrhiz* conviene
sempre preparare una esatta diagnosi del fungo
fresco.

6. Per me è certamente *Coprinus clavatus*, che
per la spora più grande si distingue dagli
altri *Coprinus comatus*, e *Copri. ovatus*. La
forma clavata svanisce coll'età e quando
è bene sviluppata ha il pileo espanso, spe-
cialmente se si sviluppa a temperatura calda,
colateralmente prima che cominci il decolorimen-
to, così succede di tutti i *Coprii*. Non è quindi
una varietà, ma lo sviluppo normale del fungo.

Il *formez fulvus* v. *Olea* sarà probabilmente
la forma rosupinator di *Fomes robustus*, il quale
non ha salute nell'inverno come il *fulvus*, per
accertarsi basta che constati la mancanza
delle stesse, inoltre il colore del *fulvus* è ben diverso
da quello del *robustus*. Affettuosi saluti J. Braccardi

ÖSTERR. POSTVERWALTUNG
ADMINISTRATION
DES POSTES D'AUTRICHE

KORRESPONDENZ-
KARTE

CARTE POSTALE



*Il Fomes fulvus v. Obasi
dell. Erb. Lan. m.
in pini / per cause d'alt.
esempl. / riferire con
imp. d'alt. /
abbe. d' F. Harkign.*

Chiam. S.^r Professore

Dr. P. A. Saccardo

Padova

R. Orto Botanico

