

Dijon sur arrose 18 Juni 1893

Monsieur et bonjour Maître,

Étant occupé, même empêché de vous faire plutôt de vous en, j'en désire  
pourtant vivement vous communiquer. Si je ne suis pas encore cette fois tout à fait de corré  
j'espère cependant arriver progressivement à m'y entretenir. Je vous fais part d'abord d'un  
schœnillelles marqué a) de *Dipnoella ? miscobryta*. Varsatz en raison de mettre en, point de  
doute. Cette belle espèce ne peut être une *Dipnoella*, parce que 1<sup>o</sup> la plante est normalement et  
primitiuement coccinelle (fecta) 2<sup>o</sup> mes schœnillelles sont corticol (ou non lignicole) comme les  
Valsech. 3<sup>o</sup> Si je ne m'abuse, les peritheas sont souvent groupés en amas valiformes, et d'ors si  
l'on remonte des peritheas isolés, on doit en pas conclure que c'est pas avortement de autres peritheas.  
4<sup>o</sup> d'après vous, la spore est seulement *Dipnoella* à maturité. De tout cela j'en conclus à mettre la plante  
dans les *hyalodidymies*, dans les *melanconis* on peut être le *Dipno. chorotata*, à moins que vous n'en  
fassiez un genre nouveau, comme vous l'avez indiqué au Sylloge. J'ai trouvé la plante en assez grande  
quantité pour la publier dans le *Fungi assiccati Gallie* de Toulouse. La centurie m'a dit  
Mr Ferry de vous paraitre au 1<sup>er</sup> juillet, je vous saurais gré si vous pouviez rectifier son état  
civil de ce *Dipnoella* assez à temps pour que je puisse avertir à Toulouse avant le 1<sup>er</sup> juillet  
l'occasion ne paraît bonne pour cette rectification.

N<sup>o</sup> 15. racines de *Fraxinus spinosa* et rameaux de chêne. un parasite *Ceratoma geliforme*  
pas vu de thèse, mais des spores agglomérées par 4 sur la pousse, tel que vous êtes pour le  
*Cer. fallax*.

N<sup>o</sup> 16. *Calycanthus floridus*. une *Diaporthe* non signalée aux matures.

N<sup>o</sup> 17. *Vitis vinifera* - Sur l'écorce une *sphaerella* qui a bien l'aspect extérieur de  
*Sph. fumaginea*, mais les dimensions des organes sont bien plus grandes. Asc. 40. Sporidia 18-20.

N<sup>o</sup> 18. Sur *Schiuma vulgare*. une *phoma* non citée dans le Sylloge que j'en crois  
bien la *Spermogonie* de *Oph. Cesatii*. Je propose donc le nom de *Ph. Cesatii*.  
peritheas tectis vel per unias <sup>epidermidis</sup> longitudinales, erumpentes, rotundatis vel ellipticis  
ex compressione laterali ellipticis, nigris, hyphas hyalinis <sup>brun</sup> raris inferne gerentibus, ad basin  
colli depressis, collis longiusculis, epidermidem perforantibus, ostioloque hyphis brunneis  
deciduis hirtello, nucleo sponuloso roseo - Sporuli hyalini, singulis, rectis vel subcurvis  
9-11 = 2-3 plasmate bipartito p. 1-sept.



guttulati, cylindrici, utrinque obtusis 10-12 x 2 1/2.

19 - Hypocaulis sur bois de Hêtre (tr. mort) <sup>avis</sup> et carié. C'est à mon avis  
*Sphaeroderma* nouvelle. assy mauvais échantillon. le moule Dabard.

Il y a d'un côté qq. peritheis de *Sporormia gigaspora*, ce qui me confirme que c'est  
bien du hêtre, car c'est un des fragments de hêtre, d'au moins jadis, au même endroit  
que j'ai trouvé l'année dernière le *Sp. gigaspora*. - Peritheis semi-imbriqués, presque  
régulièrement, papillati.  Sur le peritheis cirés, j'ai un vais des soies raides  
qui sont peut-être des cellules du hêtre  - Sporidies ovales, inaequilaterales  
primis hyalini, guttulati ,  d'un dév. colorats, d'une membrane interne fessée

et utrinque hyalino-apiculati  22-24 x 12-14 - Asci tetrasporis, cités  
évanescentiels , sporidies bandées distinctes in arce - quelques filaments hyalins  
et courts vers la base du peritheis. Si les soies raides à deux appartenant  
à la plante, je proposerais *Sphaeroderma armatum*.

20 - Sur *Alnus campestri* - *Phoma ulmiola* vel *Myxosporium hypodermium*  
ou avec basides longues de 50-50 µ de petits spores jeunes de 12 à 15 µ  
puis des spores détachés sans bandes de 25-30 µ et 15 de large avec gros guttule.  
Les 2 plantes <sup>phoma et Myxosp.</sup> à détacher à mon humble avis ne seraient-elles pas la même ?

21 - Sur *Populus nigra* asci 90-150 = 15. spor. 22-30 = 6.7. d'abord hyaline  
4 guttulés puis biguttulés - j'ai mis en note *Omphipharia*. Le peritheis  
est distinctement *perithecium*. Serait-ce une *Trematophoria*, d'abord 1 septé  
puis finalement plurisepté. - Spores plus petits que dans *exaltata*.

22 - Sur *Populus nigra* - *Hyphomycete* à ascospores. Spores jaunes, capitales,  
spinuleux - sp. aéro-pleurogène - sp. = 10-12. ronds.

23 - *Diplodia brassicae* sp. nov. du mois non citée peritheis  
éruptifs entre les fils, stiole allongée (roste) 380-400 µ puis le peritheis  
sp. 18-22 = 10-12 bandes courts.

N° 24 - Sur *Solanum dulcamara*. Me paraît non un *Sphaeropsis* mais  
une *Hyloporella* nouvelle sp. 15-22 = 12. spores par 4 ronds ou  
ovales. 1 ou biguttulés - pas de paraphyses, vus - stérigmates courts.  
Si c'est une espèce nouvelle - je propose *Hyloporella Cardoniae* du  
nom d'un de mes amis chez qui j'ai vu Dabard.

N° 25 - *Fenestella Rheis* sp. nov. ?? (*Rheis typhinum*)



N<sup>o</sup> 26 - *Rhus typhina* *Chytridia* ? *disparat* per *ete* *incertans*  
asci Clavati 60-70 = 12 au sommet - pedicellati.  
Sp. trisectati 12-15 = 4-5.

N<sup>o</sup> 27. *Helleborus fatidus*. *Anthostomella azia* sp. nov. (d'azé leu-  
de la récolte) avril 1893. asci 100-110 = 8-9 = cylindriques.  
Sp. ovatis, 1-guttatis 0 0 12 = 4-9 paraphyses tenues.

N<sup>o</sup> 28 - *Helleborus fatidus* *Diaporthe* - au *Ebenyana* ??

N<sup>o</sup> 29. - *Hellib. fatidus*. ~~*Hellib.*~~ *Ophiobolus*. *matijconensis* ? sp. nov.  
*macinnai*  
thyphus 80-100 y longi. asci 150 = 8-9. - spondis 80 = 1.2 hyalini.

N<sup>o</sup> 30 - Sur *Tralle* - *peritheis* poils & *pili* 38-50 <sup>18-20</sup> - asci 70  
*supreme angustioribus* } spondis 15-18 = 9 8-6 septati - mihi videntur  
*muralia* - *quid?* au *phosphoria*?  N<sup>o</sup> 15 = 6-7.

N<sup>o</sup> 31 *Robinia* *Eutypa* <sup>ludibund</sup> au *Eutypella pseudocinnam* ?

N<sup>o</sup> 32 - *Ulex europaea* - *Kalmusia* sp. nov. *Rigniacensis* (de Rigny)

N<sup>o</sup> 33 - *Acer nigrum* <sup>campur</sup> - *Othria quadrigellensis* sp. nov. *Dimensions*  
(Chabollaie)  
*différentes de Othria acris* -

N<sup>o</sup> 34 Sur *Charme* - *Chytridia* *hyperici* ?? J'ai trouvé sur *hypericum perforatum*  
un peu de *Chytridia hyperici* - et j'ai constaté qu'à la fin les spores brunissent, vous le demandez dans le  
tylloze. Les spores sont exactement pareilles mais hyalines. Cela me semble un *Chytridia* -  <sup>spores très différents</sup>  
<sup>de Chytridia</sup>  
<sup>notariici</sup> -

N<sup>o</sup> 35 *Crataegus* *Sphaeria allantospori* au *Diatrypa* ? (*Diatrypella*)

N<sup>o</sup> 36 Sur *Noisetier* plante curieuse assez très fins 90 = cylindriques  
spondis 7-8 = 4 00 au *Cryptosporella anomala* ??

N<sup>o</sup> 37. Sur *noisetier* intérieur de *Sauze* *Sphaeria allantospori* polygone. très peu.  
N'en vaut guère la peine. Mais doit être sp. nov.

Mes occupations journalières m'ont empêché de donner à l'écriture ces devoirs.

Je ferai mieux plus tard. Si vous pouvez me répondre tout de suite pour la *Rigniacensis*  
uruguay, je vous en serai reconnaissant, le reste peut attendre. Je publie également  
dans le *fungi caricati* plusieurs autres espèces entre autres *Massaria flageoletiana*.  
Par faute typographique, le *premier* a mis *Massaria*. C'est peut-être heureux; j'ai  
trouvé en effet des spores très vieilles, et certainement absolument brunes. M'autorisant  
vous de lui laisser le nom de *Massaria*, en ajoutant entre guillemets "Dans  
ma traduction de votre diagnose. Spondis bruyants hyalins, même en dehors de l'apex, mais  
à la fin certainement bruns (8-9) x 20 vous n'avez pas mis le *diminuer*.".



Veuillez agréer, Monsieur et cher Maître, mes  
sentiments respectueux et dévoués

J. Hagobert  
avocat à Paris

7