

Rigny 20/3 1902

Cher Monsieur,

Vous me faites pleins de compliments que je n'en mérite. Si j'ai vu quelquefois a des déterminations exactes, d'autres fois a des detesm. assez approchées, le mérite en est au sylloge et a son auteur dont le système carptologique est un outil d'une merveilleuse efficacité même entre des mains inhabiles comme me sont les miennes.

Je voudrais bien pourtant être agréable à la chère fille en lui envoyant quelques cartes post. illustrées de la région; j'en sais pas si j'en réunis, mais j'en ai. L'ami dont j'ai parlé à propos ma photographie, j'en n'ai pas encore si elle est suffisamment réunie, mais j'en ai bientôt vous en envoyant une; et j'en serai très heureux d'adresser la votre. — J'ai vu le XVI^e volume du sylloge; j'en n'en vais recevoir pas le prix; ne sachant pas si vous pouvez ou ne pouvez pas cette fois me faire la remise ordinaire de 25%. J'attends ce que vous m'en direz.

J'ai remarqué que Lambotte et Tautou ont publié une Cryptosphaeria fraxini qui m'a tout l'air d'être notre Chyridaria. Je suis surpris même que vous n'en ayez pas fait la remarque. Et de fait à l'œil nu, cette Chyridaria ressemble à une Cryptosphaeria.

* X même et passe aussi avec l'argue des Cryptoglypharia.
Pas pour a certains Iaptothoria mes p. altitud de.

et comme d'autre part le stroma paraît fort différent
de autres stroma de Chyudania que je connais, je
serais au de leur avis de en faire un genre nouveau
Cryptoglypharia. Qu'en pensez-vous ? X X

Vous pourriez publier comme il vous plaira
tout ce que j'ai vu au voyage d'Antennant de
Sankhate que le moule enserme encore
deux ou trois n° à joindre aux autres.

N° 81. sur troie. Hysterozaphium, je croi que
c'est flexuosum asc. 4-6. ov. clavate 150-160 = 20.22
Sp. dentata, uniformis, luteofusa, circulo hyalino
obovata 40 = 15.18.

N° 82. sur Slata Ceratostoma au. piliferum?
au Graphid? Le 1^{er} vol. du Sylloge dit qu'on
n'a pas trouvé l'argue de C. piliferum. Vous
n'en signalez la découverte dans aucun des vol.
suivants. Cependant je croi l'avoir recolté avec
argues sur Trametes epiriza, me serais-je trompé?
Dans l'échantillon d'aujourd'hui, il y a des argues
des spores conglobates, comme il est dit de Graphid,
Il y a des hyphes aussi, mais je n'ai pu
m'assurer s'ils appartiennent au peritheis ou
s'ils sont de nous. Sp. 8-7 = 3.3/2 (asc. 15 = 10 p. 1/2)

N° 83. sur Saule et tremble - Euche verine, peritheis
avec des hyphes! asc. 90 = 10.12 pedicellat
cylindrica Sp. 15.18 = 8.9 ordinari monosticha
3 septes ordint. par 4 septes (au p. septis?)

sur l'échantillon 6) les sp. sont p. syles, la tache
vivace et peu visible, mais elle existe sur les échant.^{ons}
que j'ai gardés. - l'argue m'a paru qq fois tétra-pore.

[A ce propos, j'ai sur robinia une sylvie
avec tache vivace ayant à l'œil même aspect;
cependant l'argue est claviforme, la spore un
peu d'effrètement de forme avec une ou 2 divisions de plus.
Vous me l'avez nommée autrefois *Zeichospora*
rubida sp. nov. Mais le Sylloge m'a paru, publiée.
L'auriez-vous perdue? Je ne puis la retrouver, n'en
ayant que qq peut-être.]

(*Zeichospora* au *cruentula*? voir *flouitina*?)

N° 84. Sur Cornus mas. *Metaphoma* au
Cinerea? ressemble exactement à *Corticola*,
sauf que les arges et spores sont plus grands.
asa 140-150 = 9. sp. 20-22 = 8 ad sylvia l'entier
constructé.

N° 85. Sur Cornus mas *Meurophoma* probl.
pamulata. sp. 22-28 = 10-12 hyaline, granuleux

N° 86. Sur Rhamnus catharticus. *Calophoma*
tr. probl. minima. Les arges sont botryon
aggregata sur un filament  comme
on le dit. sp. peu visible.

N° 87. Sur Cornus mas. *Deleporthe* (tetrasteya)
au Corni? je n'ai pas vu d'appendicels à la
spore. asa 45-50 = 8-9. sp. 10-12-13 = 3 distincta
la guttata, recta et subrecta.

N^o 88. In fuiso caprino. Sporormia prol. intermedia.
asci 150-160 = 20-25. late cylindrica, vix pedicellati,
paraphysati. sp. 4-locularia, contracta, fusca,
80-85 = 8-10.

N^o 89. Sur Sambucus nigra. Signolla? fache vniem,
mais pas toujours en jument. - asci oblongo-
cylindrica, 60 = 8-9 vix pedicellati, paraphysati
sp. disticha, hyalina, 4 guttata, utrinque
attenuata, 12-14 = 3-3½ recta vel subrecta.
espèce nouvelle prob^{le}

N^o 90. Sur Tamarix anglica. Diaporthe (tet.)
asci 40 = 6-7. sp. disticha 10 = 2½ incurvata, lanudata
fere eguttata.

N^o 91. Sur Tamarix anglica. Maury, dom a sp. 25 = 10-12
videtur a M. tamarisci diversum, ob crassitudinem
sporularum.

N^o 92. Sur Magnolia. Diaporthe (tet.) asci 40-45 = 6-7.
sp. 10 = 3 disticha, 4 guttata, utrinque attenuata.

N^o 93. Sur Rhus typhinum. Diaporthe (tet.) asci 80 = 9-10
(junior) sp. 10-11 = 3 4 guttata, attenuata.

N^o 94. Sur Sanicula officinalis ophiobolus prol.
vulgaris.

N^o 94 bis. in Rhoma sur la même plante, au herbarium?

N^o 95 Myxosporium, in ramis Crataegi. sp. ovata, roseola.

N^o 96. in Staleo sp. rotunda fusca 2 septata (Dichomera ??)

N^o 97. Cypha - Stagonospora? sp. hyalina, guttulis, bacilliformes.
mutabilis

Veuillez agréer mes sentiments recommandés,
et respectueux, comme de vous I. T. Pappe