

Rigny sur Aisne 1^{er} Août 1892
par Dizain (Vauvartien)

Cher Monsieur

A mon avis, la plante que vous m'avez envoyée sous le
N° 31 est plus intéressante que tout ce que je vous ai envoyé
jusqu'ici. C'est d'abord une espèce nouvelle, et probablement
genre nouveau. Malheureusement, j'en ai trouvée bien peu
(dans le jardin du prêtre); j'ai donc envoyé la meilleure moitié
de la récolte, et j'ai eu peu pour la grossir un nombre
incalculable d'éclats de chêne, sans résultat. Elle paraît donc
rare, si vous la jugez aussi intéressante que je la fais, j'oserais
dire qu'il serait peut-être opportun d'en faire faire le
dessin à quelqu'un de vos aides, pour que vous en ayez
plus en avoir le temps. Je piquerais, je peindrais votre curiosité
en vous disant ce que j'y ai vu dans mon examen très
élémentaire. « Peritheis ostioli, donc Sphérie simple
superficielle, quelques filaments bruns à la base du perithecie.
Des paraphyses, des asques ^{courtes} bispores; sporidies brunes
didymes, tringones, à deux loculi ronds très largement
ocellés; loculi semblant normalement se séparer, ^{mais} après
la sortie de l'asque, aperçu quelque chose de hyalin

autour des spondies; mais ce doit être des debris
de l'argue. S'il faut la mettre dans le cadre d'yeux
établis, la présence des quelques filaments autour du
peritheu en ferait une *Neopetitia bipora*.
Mais si l'on doit tenir compte de la séparation
normale? Des deux bords, cela la rapproche de
Ohleria qui ont aussi quelques filaments autour du
peritheu et alors ce serait: *Ohleria bipora*?
Que si je me trompe dans mes conjectures, vous lui
donneriez le nom que vous jugerez convenable.
La recherche d'échantillons plus considérables m'a
fait remonter en abondance: *Sporosmia ulmicola*
sur éclats de chêne ^(un fragment est dans la boîte) - *Ohleria modesta* sur branches
décortiquées de hêtre, avec les spores submonostiques.
Sur un rameau de hêtre j'en trouve aussi une
autre *Ohleria* à spores au moins 4-stiques,
qui doit être nouvelle, je ne crois pas que ce soit
un *perisporium*, j'ai donc constaté l'existence et des
paraphyses, j'en vais en envoyer sous le N° 32.

N° 33 - sur platane une *Metaphysa*?

N° 34 Sur tilleul une *Leptospheria* avec hyphes?

N° 35 Sur *Berberis vulgaris*. Aspet à l'œil nu de
Diaporthe hypopileta des feuilles de *Mehornia* et
trouvée dans les mêmes manifs; la différence

de matrice, et sa présence sur l'écorce ajoutée au dimension,

3 organes en font peut-être une espèce nouvelle.

N° 36 Sur Saule *Metastheria*?

N° 37 Sur bois de charbon, bord de la rivière, doit être saule
Une *Dizenoella*?

N° 38. Sur hêtre. Sauf erreur, c'est ce que M. DeLaurois a
appelé *Ceratostoma truncatum*. Je n'y vois pas de
système. J'en ferais volontiers une *Rosellinia sordaria*?
Mais je dis "sauf erreur", car je ne puis garantir
l'identité. J'espère que vous avez reçu sa brochure

N° 39. Sur Châtaignier, très petit échantillon qui sera peut
être suffisant pour me dire si c'est le *Cucurbit.*
castanea. La plante est courvée dans le morceau
envoyé; sur ce qui me reste, une partie voyante sur
la cassure, en dehors de l'épiderme.

N° 40. Écorce intérieure de saule An *Phloeophelia mutabilis*?

N° 41. - *Staphylea pinnata* - Une fenestella.

N° 42. *Cytisacabum* An *Massaria pericellata*??

N° 43 *Rhamnus cathartica* - paraît *Phaeodidymia* - An
Amphiphysa nouvelle? -

Voilà un gros envoi; mais la première plante m'a mis
en veine, et je crois qu'il y a dans le total plusieurs
Choses intéressantes. J'appellerai le n° 32 volontiers

Ohlenia ocellata, a cause des ocellus, des spores; si c'est
 une espèce nouvelle. — J'oublierai d'écrire sur mon
 n° 31; d'abord, j'ai vu une fois sur 4 ou cinq
 expériences, des spores d'hyphomycètes qui paraissent
 entourer la peritheis, de cette forme à peu près
 *dilute flavescens*. En serait-ce la conidie? Si
 vous n'avez pas la chance de la trouver, n'en parlons plus.
 En second lieu, sur l'éclat aplati; dans le coin marqué
 par le papier; il y a 4 ou 5 petits points noirs
 qui m'ont donné une agglomération de spores
 didymes, tous renflés, avec un apicule à chaque
 bout, apicule lui-même septé.  Serait-ce un
 développement de la sporidie du n° 31. Alors cette
 sporidie ne se diviserait pas toujours normalement.
 Sur l'éclat aplati, il doit y avoir aussi quelques peritheis
 épars de la plante 31. J'en ai ~~vu~~ vu un au
 microscope. Ils sont heureusement groupés sur l'autre
 éclat de bois.

Veuillez se voir que m'excuse d'être si
 long, et me croire votre reconnaissant et dévoué


 curé de Ripon