

Bruxelles, le 9 juillet..... 1895

Vrai. cher confrère,

Un de mes collègues, M^r Dr. Wildeman a
 bien voulu m'envoyer de plants du Brésil quelques
 feuilles portant des champignons. Je vous en prie
 de bien vouloir me dire si vos nombreuses occupations
 vous laisseraient le loisir de les examiner. Dans l'affirmative
 il les enverrait à votre adresse et vous en rendriez à
 qui vous voudriez; la liste pourrait, si vous le désirez
 être publiée dans le Bulletin de la Société de
 Botanique.

Je me permets de vous adresser ci-joint, dessin
 et diagnose d'un champignon *Asprophila*
 qui, j'ose l'espérer, vous paraîtra intéressant.
 Sur un des 4-spores, à distance l. effectuant
 par un fissure longitudinale à l'instar de
Ascondozia Reumy et surtout les spores tétrispes
 de la cinquième l'éloignant de types connus.


Je vous prie de bien vouloir nommer
 ce beau Champignon et indiquer sa place
 dans la classification du Sylloge.

Comme j'ai une nouvelle note sur les
Champignons Coprophiles de Belgique,
j'aimerais de le faire figurer dans votre Bulletin.
Je l'ai eu, pendant quelque temps,
très beau en culture: malheureusement
la maladie m'a fait abandonner mes champignons
et il a été perdu avec quelques autres.

Cependant j'ai le ferme espoir de le retrouver
l'automne en Ardennes.

Il me serait extrêmement agréable
de recevoir bientôt de vos bonnes nouvelles
et d'apprendre aussi si vos vœux
ont été à votre admirable Lycée.
En attendant à plaisir, je vous
resterai, cher confrère, la répétition de
mes sentiments affectueux.

Marcus



a carnulosa, sessilia, hemisphaerica.
 annis margine ciliatus ascis papillatus.
 nji 4-Sporii, fissura longitudinalis
 et, paraphysati. Sporidia
 hyalino-cinerea lacinis numerosis
 involuta.

Ascomatibus sparsis, 0,5 mm. lat.
 initio candidis dein albedo-cinereis, sessilibus
 margine pilis subflavescentibus hyalinis
 ciliato; disco concolore ascis
 apice papillato; paraphysibus
 numerosis filiformibus articulis
 1,5-2 μ crassis superne ramosis
 ascos superantibus; ascis
 rectis 95-115 = 20-25 μ subsessilibus
 superne rotundatis vixi apice

Ascomata coriulosa, sessilia, hemisphaerica.
Discus planus margine ciliatus ascis papillatus.
Asci oblongi 4-spori, fissura longitudo
dehiscens, paraphysati. Sporidia
globosa hyalina-cinerea lacinis numerosis
angustis involuta.

Ascomatibus sparsis, 0,5 mm. lat.
initio candidis dein albido-cinereis, sessilibus
margine pilis subflexuosis hyalinis
ciliato; disco concolore ascis
eximie papillato; paraphysibus
numerosis filiformibus articulis
1,5-2 μ crassis superne ramosis
ascos superantibus; ascis
rectis 95-115 = 20-25 μ subovoidibus
superne rotundatis iodi opre

haud coerulescentibus; sporidiis
monostichis, globosis 15-17 μ diam.
albido-cinereis episporio laevissimo
protoplasmaticis hyalinis, flavosis
irregularibus tecto setae non
raro subcalvo.

Hab. Observatus sub vitro, in
fimo vulpino veteri. *Arduum*.