

La Linaria raccolta da Ball nella regio-
ne superiore dell' Atlante maggiore
non mi pare diversa dalla L. marginata
Desf. se non per la minor pube-
scenza e la mancanza di glandole nell'
infiorescenza, l'occhio può dipender
dalla maggior altezza ^{del monte} e rigidezza del
clima in cui cresce. Anche nella L. mar-
ginata i cauli sono prostrati - Se po-
tute perirò nominare

L. marginata Desf. β . glabriscens Ballii Vis.
inflorescenza glabriscens

Hab. in regione superiore Atlantis majoris
in jugo Daghest a 2800^m ad 3500^m

Anche la L. melonantha che ^{Borzi} ~~lungo arbuti~~
~~per uno elizim. coltivate nel 1840~~
~~del Daghest~~ non mi pare diversa dalla
vera specie

La L. Webbiana ^{fu} stampata nel 1842
mentre la L. sagittata ^{Hook} lo fu appena
nel 1872: sono però sinonimi

La L. Webbiana fu da me descritta nell' Or-
to botanico di Padova nell' anno
MDCCXLII - Padova p. 142. e il Walp. ^{copiando}
per un ^{orto bot.} stampo Torino - ^{colle mie}
descrizioni. La L. leucophylla del Desf.
è diversissima dalla mia per le foglie ^{non} astate
ma lineari, per pedicelli ^{non} solitarii e stellati
capillari ^{di colore verde} palati, ma spicati brispiati
^{per le lacune} ~~per le lacune~~ lineari ~~non~~ lanceolati - acuminati
nati. Più è simile alla L. sagittata
Poir. Enc., ma non paragono il Fons de
Bot. mag. ove l' Hooker ^{col nome di Linn.} la descrive
hai potuto vederlo ed accertarne.
Ma ripieno per me d' non poter da
queste piante dell' Atlant. il
nome del suo benemerito esploratore
ma te vorrò mandarmi qualche esem-
plare delle piante di quest' orto botanico
mie fornirte pure. il piacere d' appli-
care il vostro nome ad alcune di quelle