

Stachys anisochetor (Panč in litt.)

Radice multiplicata, caulis in orbem dispositis ascendentibus hirsuti ex axillis superioribus ramis sterilibus emittentibus; foliis longe petiolatis ovalibus grosse crenato dentatis rugosis, supremis sessilibus integris flore brevioribus; verticillatis sub sesquifloris in apicem subcontinuan congestis, calycibus ample campanulatis bilobis lobis lobis superiore bifido aut tridentato, inferiore angustiore bifido aut bipartito, vel raris lobis utroque integro; tubo corollae inclusis supra basin filii sparsim papillis annulato, supra annulam pubescente, limbo inequaliter bilobato, labio superiore integro aut obsolete repando, inferiore trilobo lobis lateralibus minoribus angulatis, intermedio late obcordato; genitalibus inclusis, staminum filamentis ad medium filamenti supra medium sparsim glanduloso pilosis; stylo nudo apice bifido subaequaliter bifido, stigmatibus subulatis.

Hab. in montibus caucasicis ab Medvednik et Poolev C. Valjevskis, ad Mokra gora, Derwent et Občinske Stene C. Vircens.

Flos. villosus in Augustum.

Flores flavae, labio superiore dilutius albo, luncie ad paucos pilos pubescentes. Achenia compressicula inequales trigona atro fusca sub lente