

Dianthus pelviformis Heuff.

Flora Regensb. bot. Zeitung No 1855 pag 625.

Syn. D. conentus Gr. var. microgelatus Panč Voz. Des seb. Thun 364

Cyme 8-80 flora compactissima interdum alterutro fasciculo ex ultimis foliis caulinis
orto aucta, fructifera globosa; bracteis fusco scarieis obovatis in aculeum brevem fa-
tulam abrupte desinentib., caliciorib. ampliorib. (hic for a Heuffelio sic dictis)
in planta hermaphrodita medium calycis aequantib.; in ~~planta hermaphrodita~~ feminea
eosdem paulo breviorib., inferiorib. tandem refractis; calycis dentibus in pl. hermaphro-
dita 10^{mm} longi triangulari acuminatis, in feminea 8^{mm} longi, orati acuminatis; peta-
lorum limbus ^{ellipticis} ~~rotatis~~ in unguem paulo angustiores tendens abeuntib. facie gla-
bris, apice integro emarginatis aut paucis dentatis 1/2 - 2^{mm} longis in pl. herm. circa
calycem reflexis; staminib. in planta herm. perfectis antheri oblongis obortis in
planta feminea medium geminis vix superantib., antheri effete albi; pistilli in pl.
herm. tempore florentie vix, in planta feminea calycem longe superantib.; capsulis
longe exsertis, seminib. ovalib. apiculatis, albis, aequaliter miculatis.

Hab. in declivib. herbis in meridie spectantib. ch. Rtanj C. collectis;
nascens. Substrato calcareo.

Flor. April. Mayo. Etiam in horto qm omnes alii Dianthi praecocet. Plantae
femineae isolato semina non proferunt.

Nota 1. *A. D. atrombente* All. cui proximius differt: squemmis amplioribus in aristan brevem patulam subito contractis, nec in eam adpressam sensim abeuntibus, inferioribus in capitulis fructifero refractis, petalis glabris, capitulis longius caespitibus, seminibus majoribus, peculiari statione ac sociali crescendi modo nec non precociori florendi tempore. *Dianthus clementis* Gris et *D. liburnicus* Bastl. propter capitulas in calycibus profunde immersas longius distant.

Nota 2. *E. Dianthus capitati*: *D. atrombens* All. *D. pelviformis* Henff. probabiles *D. clementis* Gris et alii videntur, ut id de nonnullis *Siseneis* semel dudum notum in dielapsum, et possunt vel hac peculiari modificatione sphaeris semine ab affinis formis *D. Carthuriarum* tuto distinguuntur. Alii characteres, ut: quantitas, forma ac magnitudo bracteolarum et earum ad calycem relatio, forma ac color antherarum, capituli ad calycem relativa magnitudo et seminum forma ac scilicet. sua praebent fortius stabiliorem notas ad iudicandum velorem specificum *Dianthi Carthuriarum* affinium formarum quae recentiori tempore in non artem numerum increverunt, quam adaeque armati characteres, a foliis eorumque nervatura, vaginarum longitudine, caulis forma, numero florum ac colore partium depropti. Confidendum horum characterum observationem exinde commendamus botanophilis incunctis et austeris plagas perscrutantibus. —