

Specimen unicum possideo. Caulis 8 foliis albus, erectus, undique squetis.
 Les foliatus, alba medium simpli. affinis, superne raris 3 sterilib. abbrev.
 iatis auctus. Ex omnium foliorum superiorum axillis pedunculi accessorii
 bipidi proveniunt. Umbellae terminati 8fid rari sencl bipidi. Folia
 infima fere ad squammas reducta; intermedia maxima 10 lin. longa, 2 lin.
 cuneata lata; involucralia $3\frac{1}{2}$ lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Fructus desideratur.

Excerptum ex: Verhandlungen der k. k. wiss. bot. Gesellschaft in Wien 1858

Achropeema caephorum n. spec.

von J. Burdetke pag 38.

Char. gen. Calyx 5dentatus. Petala 5, unguiculata, lamina 4 crenata, fauce squammas
 binis crenata. Stam. 10. Stylus in genere 3. Capsula diffeopimento caeco. (unilocularis)
 dentibus duplo stylorum numero detinens. Sem. compressa, margine papillis paleaceis ciliatis.

A. caephorum totum albo intus, hanc viscosam canticulis hanc coephoris, ex parte
 bi-terve dichotomo gymis, foliis inferioribus spatulatis in petiolum longe acuminatis,
 superioribus lanceolatis sessilibus; calycibus tubinatis villosis obolete 10-striatis den.
 Libris ovatis obtusis; petalis cuneatis quadrilobis; capsula subglobosa caephorum gle.
 bae triplo superante calyce nichosa; seminibus fuscis granulatis margine papillis
 papillis semini diametro decies fere brevioribus paleaceis compressis ciliatis.

Hab. In imperio volcanitarum fissuris Thiro prope Tuffes supra balnea:
 Rönchbad dicta, ubi mense Iuni (A. 1857) stirpem florentem primam legit
 cl. Fr. Wepfelsky cuiusque portum dux Dr. Skofitz benevole communicavit.

Herba perenni hanc coephoris, hanc viscoso glandulosa, est illo copioso monileformi
 crispato albo, canticulis diametrum 2plo altior superante denie vixit. Canticuli copiosi
 e decubito ascendentes, tenelli, floriger steriles, digitatis ac palmatis, basi foliis annatis et
 maritis obfusi in cyano terminalium 3-coephorum lencem ac postesse diversicaten folichten
 soluto. Folia petentia inferiora plus minusve confecta cum in ramulis. Sterilium spatulata,
 novae apertum attenuata, utrinq. prosetini margine et petala densius albostriata; super.
 vix florentia lanceolata v. late triecsa obtusitate sessilia 6-3" longa ac $1\frac{3}{4}$ " lata sessi.
 lie. Calyx 2" long. sub antheri infundibulata, in fructu tubinatis. Basi hanc tormentis, plus
 minusve intus, obolechiffine 10-nerviis pallide viscum. Florum alarum inferiorum pedicelli
 stylorum in petiolas, superiorum 6-4" long. gracillimi, post antheri petentis, vel diffe.
 as (?) in vix apice subnatis (?) abiq. hanc ineffati. Petala calyce triente ex sepa

albo cuneato spatulata 3" longa $1\frac{1}{2}$ " lata, lamina 4 crenata, fauce squammas binis crenata. Stam. 10. Stylus in genere 3. Capsula diffeopimento caeco. (unilocularis) dentibus duplo stylorum numero detinens. Sem. compressa, margine papillis paleaceis ciliatis.

Euphorbia Euphlaea ex Ledebour: Flores rossicae T. III pag 577.

Sect III Eula. ++ Perennans 4 Caulis umbellae multifida terminato,

- 56 E. corsia Karst. et Koid. glabra caerulea glauca, rad. multifida, umbellae multif.
rami dichotomi, fol. sessilib. integerrimis, caulibus inferiorib. oblongo lanceolatis, ob-
tusis, multis v. mucronatis; superiorib. acutiusculis; ramis angustiorib.; involucrialis
constrictis, involucrii ovato-strobili subtriangulibusve acuminato cuspidatis,
diametro longitudinali transverso etiam subsuperante, glandulis bicornib. capsula
glabra, punctulata, semine lori.

Hab. In Sibiria altaica deserto songoro-kirghisico. 4. —

- 57 E. subcordata C. A. Meyer. glabra glaucescens, radice subrepente, caulibus
et quovis capite plurib., umbellae multifidae rami dichotomi, foliis subcor-
datis acutis integerrimis; caulibus lanceolatis subcordatis; superiorib. involu-
crialibusque basi rotundatis; ramis linear lanceolatis, involucrii late
ovato subcordatis, glandulis bicornib. capsula subglobosa coarctata distincta dor-
so rotundata subscutellata, semine lori. Ledeb. Icon. fl. ross. tab. 186.
Hab. ut prior 4.

- 58 E. andrachnoides Schrenk. glabra glauca, caulib. sterilib. simplicissimis lon-
gatis caule florifero longiorib., umbellae multifidae rami dichotomi, foliis tri-
ribus sessilib. subcoriaceis, glaberrimis integerrimis; caulium sterilibus subdi-
stichis cordatis; floriferorum ovatis, involucrii cordato-subreniformib., glandu-
lis semilanceatis, capsula glaberrima coarctata distincta dorso rotundata, se-
mine lori. E. lenti affinis, caulib. sterilib. flagelliformib. insigni.

Hab. In Sibiria altaica des. songoro-kirghisico: in montib. aridis m. Altai. 4.

- 59 E. discolor Ledeb. glaberrima, umbellae multifidae rami biparti, foliis caulibus
sessilib. obovato cuneatis margine subrevolutis versus apicem denticulatis.
hi coarctati integerrimis discolorib. sublus glaucis; infimis minimis; inter-
mediis oblongis; summis acutis v. mucronatis; involucriis obovato ellipti-
cis mucronatis, involucrii subcordato-reniformib. mucronatis, glandulis lu-
natis, capsula. . . . —

Hab. In Sibiria baikalensi pr. Tokulsk. 4.