

M. Grenier et M. Godron
 flore de France T. I. pag 47.

Delphinium orientale (1) Gay in Desmoul. cat. hort. p. 12, (1840) et herb. !; D. ornatum Bouché in Mohl. bot. zeit. 1, (1843) p. 26. — Fleurs disposées en grappe grosse, longue, dressée, très-serrée. Capsule pubescente à poils glanduleux à la base, atténuée brusquement, et terminée par le style très-court et tout à fait latéral. Déhiscence s'opérant par une ouverture échancrée, à bords très-renflés.

Graines rugueuses, rides membraneuses, continentes ondulées. Pédoncules dressés, courts, raides, épais, s'allongeant peu à la maturité. Bractées inf. foliacées tritermées, égalant ou surpassant le pédoncule; bractéoles, allongées dépassant le pédoncule.

Feuilles inférieures pétiolées tripennées, les supérieures sessiles ternées-décomposées en longues lanières linéaires. Tige de 25 à 60 centimètres, grosse, dressée, caide, glabre, peu rameuse, à rameaux dressés. Fleurs ordinairement violettes, blanches ou roses.

Hab. Originaire d'Orient, cultivée dans les jardins. Cette plante ne se trouve jamais en France que comme échappée des jardins. ① Juin-juillet.

(1) Delphinium orientale Gay monog. ined. — Uni-bipedale, crassiusculum, firmum, strictum, simpliciusculum, glabratum, ramis paucis erecto-patentibus; foliis inferioribus petiolatis, tripinnatifidis, superioribus sessilibus, ternato-decompositis; floribus (plurimumque violaceis) longè plus minus ramosis; pedunculis brevibus, crassis, rigidis, erectis, fructiferis parum elongatis; bracteis inf. foliaceis tritermatis, pedunculum aequantibus vel superantibus, superioribus ternatis simplicibusque, pedunculo brevioribus; bractéolis elongatis, pedunculum superantibus!; carpellis viscido-hispidalis, in stylum brevem!, quasi lateraliter ramosis (Erit error hypographicus pro) remotis.

affidum, abrupte attenuatis!, dehiscentibus apice excisis!, margine incrassatis;
seminibus rugosis, rugis membranaceis, continuis, undulatis. — Species verosimiliter
è regionibus Caucasosis allata. Capella non raro 2, rarius 3.

Obs. — Nous nous sommes fait un devoir de reproduire le texte même de
la monographie que M. Gay a bien voulu nous confier; et nous saisissons
avec empressement cette occasion de lui renouveler nos remerciements pour
la générosité avec laquelle il a mis à notre disposition non seulement son
riche herbier, mais encore les notes nombreuses qu'il renferme.

Hab. in Serbia: in ^{arvis} ~~XXXX~~ ad Paracin, in campis
gramine parvis obductis ~~R. Capriensis~~ ad Lesje C.
Capriensis; in ^{arvis} ~~XXXX~~ ad Laskovo C. Belgradens.
hic copiosissimum. Flor. Majo