

TAB 2-098

Manassia, Gornjak, m. Stol, de Stanj. Flor. Ann.
exemplar minus in m. Stol, Tali an.
detexit et legit cl. Pance!

Obs. Hieracium marmoreum affine H. taggeteo Boiss. sed differt involucri foliolis
obtusis, foliisque caulinis brevioribus,
ovalis, cordatis. — A Hieracio lanato
W. K. diversissimum caule perfoliato,
ramis in axilla folii perfecti nec
squamaeformi orientibus et involucri
villosa atque pilis glanduliferis,
ligulisque dorso pilosis nec glabris.
H. marmoreum Andryaloideis Fries.
epicr. p. 74 adnumerandum ^(species hujus sectionis) in herbario
sequenti modo dispositae:

Andryaloidea Fries

A. Ochrocarpa (ωχροκάρπια, pallidus)
obactaenia pallida, testae glandulae ^{imprae}
Quercus colore.

a. Oxylepida, involucri foliolis cuspidatis,
Huc. H. taggeteum Boiss. etc.

b. Copholepida, involucri foliolis obtusiusculis,
L. Involucrum villosa-tomentosum,
atque pilis glanduliferis. Huc
H. marmoreum (folia caulina cordata).

B. Involucrum ~~villosum~~ ^{munatum}, ~~cineritis~~ pilis
 plerisque glanduliferis v. glabrum. Hac.

H. lanatum W. K.

Habeo e monte Velebit in Lika: Vukotin-
 vič! Hierac. croat. p. 14 (H. crisphyllum

Vuk.) et e m. montenegr. Sella,

Fae. 1847: Tommasini! (H. Tommasini

Host). — Hieracium lanatum Visiani!

fl. Dalmat. n. 785 (H. Tommasini Host)

valde differt a speciminibus c.

Vukotin. et Tommas. caulis bipedalis
 parte inferiore ^{cum} foliis ~~lanatis~~ elongatis, denticulatis
 ultra caulis mediam adscendentibus
 lanato, superiore vero cum capitis
 n. 4, ut Sonchi maritimi similibus,
 glabro = H. lanatum * semivestitum
 L. Bip. An species propria?

B. Melanocarpa. Ochsenia atra.

Hac. Hieracium tomentosum Jer.

H. Liottardi Vill., H. andryalooides

Vill., H. Kochianum G. G. etc.

u

demum in Squamas, abeuntibus, obfitos.

Capitula Semper erecta, speciosa, multi-
flora (59 flores numeravi), pedicellis
 $1\frac{1}{2}$ - ~~3~~ $2\frac{1}{2}$ pl. 2 poll. longis infidentia,
parce villotis sed pilis stellatis dense
obstitis. Involacri obscure cani,
pilis stelligeris dense obstiti, immixtis
villis rarioribus, carina confortioribus,
5 lin. longi, hemisphaerici, subimbricati
foliola linearia v. lineari-lanceolata,
obtusula, exteriora minora varia longi-
tudinis, interna (n. 21) subaequalia.
Flores flavi, 5 lin. longi, ad tubum,
2 lin. non attingentem et ligulae
dorsum piloti, ceterum glabri;
antherae $1\frac{1}{2}$ lin. longae, exsertae,
pallidae; styli rami pallide
flavi. Achaenia $1\frac{1}{2}$ lin. longa,
pallida, testacea, costata, glabra,
apice truncata; pappus $2\frac{1}{2}$ lin.
longus, persistens, copiosus, barbel-
latus, sordidus.

Patria. In Serbiae orientalis
rupibus marmoris ad Ravanica,

ad Schultze

Hieracium marmoreum Pancic in litt.
nov. Andryaloidearum species.

Descriptio. Herba 4, rhizomate liquescente fibroso, aphyllopoda (an semper?), codranthalis - sesquipedalis, dilute viridi-lutescens, villosa, corymboso-paniculata, ~~p~~ caule foliato albentivirente, $\frac{1}{4}$ lin. diametro metiente, tereti, striato, medullâ facto, foliorum carinâ in caule ~~+~~ ^{hinc minus} decurrente subangulata; folia 4-2 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll. lata, oblongo-ovata, inferiora in petiolum late alatum paulo attenuata, subsessilia, oblongo-obovata, obtusa, apiculata, reliqua oblongo-ovata, cordata, acuta, omnia denticulata, utrinque, praecipue vero margine, infra et carina pilis elongatis, denticulato-barbellatis (plumosis auct.) villosis; ad medium caulis in axilla foliorum decreescentium in ramos abit palmares et breviores, 1-2 cephalos, foliis parvis ovatis,

in horto semper!

Cassiniaceae delictum pect. nov. e cassia
auct. C. H. Schultze Rijad. — (C. in fronsiphi)