

Nasturtium proliferum Heuff.

Regensb. Flora 1853 II. p. 624.

Siliquis oblongo-linearibus, linearibusque pedicello dimidia brevioribus. foliis omnibus pinnatis profunde pinnatifidisque, foliis oblongo-lanceolatis, linearibusque dentatis, racemo congesto ramoso proliferoque, petalis calycem aequantibus.

Radix annua aut biennis fusiformis, fibris lateralibus copiosis firmata. Folia inferiora lata grabra, pinnata, foliola inaequalia, par infimum minimum, media oblongo-lanceolata inaequaliter dentata, terminale maximum, oblongum acutum, inaequaliter et grosse dentatum, folia caulis summa profunde pinnatifida, foliola lanceolato-linearia in rachis decurrentia, petiolum alatum sistens, obsolete denticulata aut integra, extremum oblongo-lanceolatum dentatum. Caulis $1\frac{1}{2}$ - 2', basi rubellus; striatus, glaber, a medio ramosus, rami erecto-patuli, foliosi, ex axillis denuo ramosi. Flores in apice ramorum in racemum densum, ramosum congesti. Petala flava, calyce parum longiora. Siliqua oblongo-linearis, arcuata, pedunculo duplo brevior, stylo brevi coronata.

In fossis rivulisque muranis ad Danubium in Banatu. Jun. Jul.

Heuffel. Enum. pl. Banat. in Verh. d. k. k.
zool. bot. Gesellsch. (Abh. p. 52. VIII (1858))

Copia diagnoseas nonnullis verbis mutatis.

Roripa prolifera Neitr. Aufzähl. d.
in ungar. u. Slaven. herb. Gefäßpflanz.
p. 263.

Citatur duo supra mem. scripta Heuffe-
liana; diagnosis nulla.

Nasturtium proliferum Heuff. Neilreich
Diagnosen d. in ung. herb. Gefäßpfl.
Beilage z. d. Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. Bd.
XVII. (1867.) p. 10.

Copia diagnos. Heuffel. adjecta animadvertens
sequente:

"Nil nisi forma monstrosa N.
silvestris racemis uberime evolutis
sed floribus diminutis et fructibus
abortivis.