

Chiarissimo Sig. Professore!

Voleva rispondere immediatamente al gentilissimo d Lei foglio del 4. corr. ma ho protratto di giorno in giorno non saprei neppure io perché. In quella lettera Ella mi voleva domandare scriptari d' alcune specie, ma non ho trovato l'elenco di Ella nella fretta ha forse dimenticato di trasferire sulla seconda pagina. Mi onori adunque d' altre due righe perché possa servirle con tutta sollecitudine. Ho fatto questi giorni una escursione nella valli del basso friuli nel distretto di Latisana, fra il Porto di Guano ed il Porto Tagliamento. La vegetazione era ancora poco avanzata, ma tuttavia la gita è stata profittabile. Ho raccolto il Melilotus parviflorus Hoff. la Plantago maritima L. e lo Scirpus Holoschoenus o romanus che mancavano al mio Syllabus - Ho poi raccolto lo Scirpus littoralis Schrad, la Phytolacca media p. angustifolia L. lo Silenea incurvatus L. la Psamma arenaria R. S. il Phleum arenarium L. il Lepturus incurvatus Trin. lo Asparagus scaber Brign. il Glaucoium luteum Scop. il Glaucium illyricum Koch ed altre che tutte figurano nel Syllabus come spettanti alla regione del friuli.

e del litorale austriaco. Perché non posso io percor-
rere con più di pazienza la bassa regione fra il Lemene
e l'Isongo! Chi fa' qualche specie, forse nuove, non
vi si dovrebbero rinvenire!

Da un giorno all'altro presenterò l'istanza alla
Luogotenenza per ottenere un permesso di quattro
settimane onde poter recarmi ai faugli d'Albaus.
La ringrazio delle gentilissime espressioni adoperate
nella graditissima sua in questo riguardo, e mi orda
che io aveva fatto calcolo sulla di Lei benevolenza.

Mio Zio m'impone di riverirla distintamente;
mi onori dei di Lei riveriti comandi, e mi erida
quale ho l'onore di essere pieno di stima e gratitudine

Udine 29. Maggio 1858.

Di Lei

Obbediente e obbligar servo e discepolo
G. Pirrona

Specie vegetali friulane

ommesse nel Catalogo della Prov. Veneta,

- x *Allium carinatum* Linn. Sin. prostr. circa *utinum* Guil.
 x *Allium ochroleucum* W. Kib. Ne ho riuolti due soli esemplari nella parte sup. della Valle di Resia, ma non ho dubbio sulla appartenenza della determinazione, essendo esattamente simili ad esemplari che ho avuti anche dall'Ungheria.
 x *Listera cordata* R.Br. Nei pochi subalpini presso Ligosullo, nel sito di Casatta, Morosini ne raccolse due soli esemplari, e me li mandò per la determinazione. V.
Arum italicum - comunissimo anche nelle siepi del medio Friuli -

Correzioni od aggiunte

da farsi al Syllab. flor. Gorizialis,

- x *Alnus pubescens* Turcz. Nelle convalle subalpine della Carnia
Salix rosmarinifolia L. Nelle due alluvioni del Tagliamento
Salicornia fruticosa & herbacea - litoreale friulana in gran copia
Salsola Pragensis - Delectu - è la S. Kali -
 x *Glandanella minima* Hopp. nel M. Premaggiore. V.
 x *Primula villosa* Jacq. } sul Monte Premaggiore in V.
 x — *spectabilis* Tratt. } Carnia
 x *Centunculus minimus* L. nei luoghi umidi a Malifama presso S. Fiorenzo di Nogarò. V.
 x *Euphrasia serotina* Linn. presso Amaro. com. Morosini.
 x *Pedicularis Jacquinii* Koch. Monte Lius V.
 x — *recutita* L. Prati subalpini nella Valle d'Unza rosi in Carnia V.
 x *Veronica prostrata* L. fra i sassi intorno a Udine.
 x *Scrophularia vernalis* L. Nella Valle dell'Espongo.
 x ~~the~~ *Hoppii* Koch. nella Valle del Natisone, V.
 x *Pulmonaria azurea* Bess. nella Valle del Judri
 x *Cynoglossum montanum* Link. Valle del Natisone V.

Jasminum fruticans - *deleatur* -

Phyllirea media *B. angustifolia* - in gran copia
in Pineta delle dune.

Campanula Trachelium Wulf, sulle cime del M. Ameriana

— *pusilla* Haenke - anche in Carnia

— *carnica* Schieda - Garbana a Canal del Ferro.

— *medium* *deleatur* *S.*

— *Lorei* Pollin - *deleatur* -

x *Hieracium aurantiacum* L. Nei prati alpini presso
Ligofullo e presso Monzoj in Carnia.

— *B. bicolor* - presso Coneglian sui *S.*
monti.

x — *incisum* Hopp. *V.* reg. subalpina del Matojaro

x — *Schraden* Scheid. *M.* del Lago presso Ligofullo
e M. Ameriana.

x — *amplexicaule* L. nei monti della Carnia non
raro. *V.*

Soyeria montana Momm. M. Pale Val d'Incarojo *V.*

Crepis paludosa Mönch. - M. Dimon in Carnia

Prenanthes purpurea *B. angustifolia* - M. S. Simeone.

x *Hypochaeris uniflora* Vill. M. Dimon presso Ligofullo.

Scorzonera austriaca Willd. M. Ameriana *V.*

x — *alpina* ^{Hopp.} *Prati alpini* *B. angustifolia*. Monte Pale. (an
alpina?) *V.*

Leontodon Benini Roth. Nelle ghiaie di Porreut.

Torre, Tagliamento, spesso frequente -

— *saxatilis* Rehb. Nei siti aridi aghiziosi intorno
Udine

Lappula tomentosa - *deleatur* -

— *minor*. lungo le strade, i margini etc.

Carduus personatus ex Cord. *semiflorus* Curb.

— *achanthoides* L. presso Amaro. *V.*

x *Cirsium pannonico-crisithalys* Naegel. nei boschi
umidi lungo il Tagliamento presso Amaro.

V.

x *Senecio nemorensis* L. nei cespugli presso
Monajo in Carnia

x *Galium Helveticum* Weig. - In Forca di Suola V.
nel M. Penazzione, col *Papaver alpinum*

— *perispermum* β *divaricatum*, nei luoghi aridi
a Dignauo, a Jagagna

Loranthus europaeus - dilectus -

Malabaila Haquetii Tausch, cresce in copia anche
a Montenuov, sul M. Quarnan, etc. V.

Peucedanum Schottii Batsch, fra i cespugli nei luoghi
salsi dei colli presso Jorgaria V.

Tommasinia verticillaris, dilectus.

Enidium apiodes Spreng, comune nei prati montani
a Gemona, Venzona, etc.

~~*Senecio nemorensis*~~

— *Monierii* Cuss. Secondo il Cav. Tommasini
il *Selinum monierii* del Catal. di Suffren non
sarebbe altro che il *Sel. venetum* di Sprengel.
L'ubicazione data dal Suffren (prati di S. David
Toluzzo etc) mi obbliga a non accettare tale opinio-
ne, non avendo io mai trovato un solo esemplare
del *Peuced. venetum* nei prati di nessuna parte
del Friuli, né sempre nelle siepi o nei cespugli V.
Pimpinella diaria L. cresce in copia sul colle di S. Aquile
presso Gemona.

Eringium planum - dilectus - cresce però presso
Vipava e Jorizia. V.

Saxifraga aizoon f. J. Nei monti della Carnia non
rara

Oenothera biennis, cresce in gran copia fra i cespugli
presso il Porto Dignauo. V.

Epilobium alpinum Nei luoghi torbosi dei monti
presso Pontebba.

- Rosa rubrifolia* Vill. Nelle cornalli subalpine Valle
 dell'Aupa. V.
 — *serpyllifolia* L. nelle siepi Udine, Latisana
 — *gallica* L. colli di Mangano V. V.
 — *rubiginosa* L. presso i Boschi di Muggana V.
 — *Cimamomnea* — *delectata* — e la R. alpine
Poterium polygamum Willd. comune abbozzanza
 ai luoghi aridi del medio Friuli V.
Genium rivale L. *hybridum*, *hybridum* Walf. mostruosa
 col calice cangiato in foglie - Nel M. di Mon. V.
Spiraea decumbens Koch. - Maggio ed altrove nel Canal
 del Jam. V.
Orobancha tuberosa L. comune nei colli tutti del Friuli
 x *Vicia cordata* Walf. - Lungo le siepi a Corno di Rosazzo,
~~Fagnyiano~~. V.
Coronilla montana - Valle del Judri presso Costanzo
 x *Phaca astragalina* - *delectata* - est *Oxytropis tri-*
flora Hayne - V.
 x *Melilotus parviflora* Hoff. lungo gli argini delle
 Valli sotto Latisana.
Medicago Pironae Vis. - cresce in copia fra i fagioli a
 Genovese sul monte della Fontana, a Monte
 nass. V.
 x *Genista elatior* Koch. - lungo le vie presso Cividale,
 Jacis, Tricignano.
Ononis Cotinus L. comune nelle due presso la foce
 del Tagliamento, V.
Phacelia infectoria L. nelle siepi presso Accursio.
 x *Geranium palustre* L. nei cespugli presso l'Argonne
 Paluzza. V.
Linum angustifolium - sugli argini delle Valli
 nel basso Friuli

- x *Cerastium brachypetalum* Spreng. presso Udine,
 x *Stellaria cerastoides* L. M. Lavis presso di Gopullo. V.
 x *Alpine tenuifolia* Wahlenb. sui margini dei campi a
 Fagagna, a Udine.
 x *Sagina subulata* Winn. Nei pascoli subalpini della
 Carnia.
 — *bryoides* Graeb. Alpi presso Pontebba. V.
Silene italica Pers. comune sui calli.
Polygala comosa Schk. Delectatur.
Celestina Corvini — Delectatur —
 x *Lepidium graminifolium* — lungo i muri a
 Virco, Flumho —
Camelina sativa Litz. fra i cereali a Amaro,
Sinapis arvensis — comune in tutto il Friuli.
Dentaria trifolia H. Kth. — Nella festuca delle valli del
 M. Plaurij nel luogo detto S' Slips, presso
 Verzone. — V.
Papaver alpinum L. M. Premaggiore in Carnia
Aconitum Anthora L. Delectatur.
Aquilegia Haeutkeana Koch. A pic' delle alpi nella
 Valle del Natizone e dell' Sponzo. V.
 — *viscosa* — Delectatur — è la Aq. atrata Koch V.
Ranunculus cassubicus L. Presso Tortano.
 — *muricatus* — Delectatur —
Anemone hepaticifolia Wulf. Delectatur.
Thalictrum Jaegerianum Koch. Mout. di Verzone
 V.
-

Lo Scirpus che aveva portato l'anno scorso a Padova
sotto il nome di Sc. littoralis, e di Elle ha dubitativa-
mente considerato come una varietà del Sc. mar-
timus non può essere considerato come tale. Le
foglie sono costantemente due vaginanti; l'in-
terno è sempre monofillo e retto, quasi la conti-
nuazione del culmo, (retto anche a spicche mature)
gli altri due, le spighelette mai più di tre, spesso due
ed una sepolte - le cete ipogine 3, o 4. lunghe.
non cigliate o pinnate. Il frutto piano-convesso
acuminato, pungente e subtrijutato, d'color
cinnabro, liscio. Mi parrebbe doverlo riferire al
Sc. pungens, ^(Rothii Hagen) ma le cete ipogine non pinnate
lo fanno differente. Se potessi farne raccogliere
in Pineda sul mare dove l'ho raccolto, ne
manderei a Lei di maturi. ma come fare
ora?