

Nota. Nota mia chiesta, m. comunicata

Il professor P. Bauerni Nota mia chiesta, m. comunicata
essendo nello scorso mese due pacchetti dell' Erbario Micheli con
presunti i funghi. Egli m' informo contemporaneamente che
questi due pacchetti pervennero all' Istituto Botanico fiorentino, insieme
ad altri di fungo e ortogono Micheli, settanta da 5.6
anni addietro sotto la direzione del prof. A. Martelli, per dono dell' ora
congiunto prof. A. Targioni-Tozzetti e figlio Federico. Ma poiché l' Erba-
rio micologica dell' autore dei Nova plantarum genera doveva essere assai più
copioso, si spera di rinvenire altre reliquie in un lascito generoso del
predetto Targioni-Tozzetti. Ento che l' Erbario Micheli fu parte della raccolta Targioni-
Tozzetti e due pacchi che ora esaminai, risultano di 29 specie conosciute di car-
tellini Micheliani autentici e corrispondenti per la massima parte ai tipi
descritti a questo anche figurati nei predetti Nova plantarum genera e di 58 funghi
e pseudofunghi per le più fillozozoi, quasi tutti già riuniti in uno de-
due pacchi, i quali mancano di qualche scheda autografa Micheli e non
corrispondono che in minima parte ai tipi descritti nell' opera. Altre
probabilmente furono raccolte da Giovanni o da Ottaviano Targioni-Tozzetti
e i nomi recati nei cartellini sono tratti dalle opere di Persoon o di Per-
sone. De Candolle datate dal 1790 al 1820 circa.

Alcuni nomi degli esemplari tipo Micheli sono identici e determinati
di mano del D. Francesco Baglietto (che molti anni addietro vide anche i licheni
Micheliani che si conservano nell' Erbario fiorentino). I generi *Tylostoma* e *Geaster* fa-
ranno novità e i cartellini del D. L. Petri a questi ultimi. Molti nomi
presenti ora due elenchi. Nel primo sono i tipi Micheliani ridotti
alla nomenclatura moderna. Dopo questa sta il nome o la frase del cartellino
originale; quindi la frase corrispondente dei Nova plantarum genera (N. P. G.)
Nel secondo elenco figura la nomenclatura moderna dei tipi che in
N. P. G. e nei Micheliani racchiama nel 2° fascio. Non valendo
però di riportare i nomi delle schede autografe e poco esat. di questo
fascio pubblico, cito di origine Micheli: *Geaster* *hirsutum*, *Phloeospora*, che figurano
nei cartellini. I nomi Micheliani originali.

Hymenomyces

Polystictus pictus (Schultz.) Fr. - Sacc. Syll. II p. 210.

- « Funghetto perforato colore d'oca di Montescalari del 1794; Funghetti di
color d'oca, coriacei, a foglia d'imbuto colti di ~~1794~~ 1796 al largo Serrone (interurb.)
« *Polyporus exiguus coriaceus fulvus*, pileolo concavo ac in medio nudit
umbilicato. Pietriverso de' prati. Julio mense circa Abbatiam S.ri Casti-
onis, vulgo Montescalari, juxta locum La Fonte al Farle » Mich. N. P. G.
p. 130, n. 5 tab. 40, fig. 9.

2 *Periophora*
~~*Periophora*~~ *disciformis* (DC.) Fr. (Cook) - Sacc. Syll. II p. 642.

- « Agarici lichenosi di Poggio Imperiale » Mich. in herb.
Non si trova il corrispondente nel N. P. G.

3 *Periophora incarnata* (Pers.) Bres. - Sacc. Syll. II p. 625 (Corticium).

- « Agaricus lichenosus aureus della Cascina del Castiglioni il 15 gennaio » Mich.
« Agaricum lichenis faciem aureum. Tempore praedicto (jan. et febr.) in
Monte Murello circa stabulum vaccarum domini Marchionis de Casti-
lionis, ad truncata ligna » Mich. N. P. G. 124 n. 11 (Tab. VIII).

Gasteromyces

4 Clathrus cancellatus Linn. - Sacc. Syll. VII, p. 19.

« Clathrus n. 1 » Mich. in Herb.

^{quasi selvatico rosso.}

« Clathrus ruber, Majo, Novembri atque Decembri mentibus in arundinibus et ad sepes nec non in repletis non raro oritur » Mich. N. P. G. p. 214, n. 1, Tab. 93

5 Cylostoma mammosum (Mich.) Fr. - Sacc. Syll. VII, p. 60

« Lycoperdon omnium minimus, globosus pediculo donatum della Polina di Loiano » Mich. in Herb.

« Lycoperdon (album mammosum) Parisiense minimum pediculo donatum Vesica gambata piccola cattiva. Januario et Febuario mentibus in sylvis locis nec non ad sepes, repes ac agrorum limites et in muscosis locis passim. » Mich. N. P. G. pag. 217 n. 10.

~~Gli esemplari Micheliani furono determinati dal Dr. S. Petri.~~

6 Geaster coliformis (Dicks.) Pers. - Sacc. Syll. VII, p. 73. ~~(Det. Dr. S. Petri)~~

« Geaster n. 4 ? » Mich. in Herb.

« Geaster major umbilico seu osculo stellato. Mense Septembri in Vallibus bosae sylvis copiosus nec non per Imprunete, Pletariam ut in Loiano cedua sylva » Mich. N. P. G. pag. 220, n. 4; tab. 100 fig. 4. ~~(Det. Dr. S. Petri)~~

~~Il sinonimo Micheliano rimane in po' dubbio - Gli esemplari Micheliani furono determinati dal Dr. S. Petri.~~

7 Geaster fimbriatus Fr. - Sacc. Syll. VII, p. 82 ~~(Det. Dr. S. Petri)~~

« Geaster n. 1 ? » Mich. in Herb.

« Geaster major umbilico fimbriato. Autumni tempore in Boboli viridario per sylvas Tenuiae propinquas ac eam ambientes » Mich. N. P. G. pag. 220 n. 1, tab. 100 fig. 1. ~~(Det. Dr. S. Petri)~~

~~Come per la specie precedente il sinonimo Micheliano rimane alquanto dubbio. Gli esemplari Micheliani furono determinati dal Dr. S. Petri.~~

8 Cyathus vernicosus (Bull.) DC. - Sacc. Syll. VII, p. 38

« Cyathoides » Mich. in Herb.

« Cyathoides cyathiforme cinereum et veluti sericeum. Vere, autumnali atque brumali tempore in sylvis ad ligna putrescentia nec non in agris et circa palearia super triticeos culmos tabefactos » Mich. N. P. G. pag. 222, n. 1; tab. 102 fig. 1 -

9 Cyathus striatus (Huds.) Hoffm. - Sacc. Syll. VII, p. 36.

« fungoides fuscus, extus hirsutus intus glaber et striatus semine foetus » Cyathoides n. 2 » Mich. in Herb.

« Cyathoides cyathiforme obscurum externe hirsutum interne plumbeum, glabrum et striatum. In sylvis et repletis non raro oritur, interdum in eisdem fere locis cum antecedente » Mich. N. P. G. pag. 222 n. 2; tab. 102 fig. 2.

- 14 Saldinia concentrica (Bolt.) Ces. et Desb. - Sacc. Syll. I p. 393.
 « Lichenagaricus tuberosus niger Agarici officinalis facie cortice mi-
 tido et fere splendente. ~~est~~ In Etnuriae maritimis Aprilis mense ad defecta
 rum arborum candelices oritur » Mich. in Herb. et in N. P. G. p. 104 n. 1 (Ordo II).
- 15 Nummularia repandoides Fuchs - Sacc. Syll. I, p. 397.
 « ~~Lithophytoidei~~ ^{Lithophytoidei} » Mich. in Herb. - La specie non è trovata con sicurezza nei N. P. G.
- 16 Bronia punctata (L.) Fr. - Sacc. Syll. vol. I pag. 348.
 « Lichenagaricus O. 2 n. 9 » Mich. in Herb.
 « Lichenagaricus terrestris, sentatus, albus, in agris prope
 Celamonem in Etnuria, Martio mense » Mich. N. P. G. p. 105 n.
 9, tab. 54 fig. 3 (Ordo II).
- 17 Ustulina maxima (Weber) Schröt. = Ustulina vulgaris Ten. Sacc. Syll. I, p. 351.
 « Lichenagaricus ad O. 2 » Mich. Herb.
 « Lichenagaricus crustaceus, crassus, borinum renem veluti repre-
 sentans, niger et quasi densatus. In viridario Botoli ad emortuas
 Lauri radices. In sylva Eucarpia iuxta locum ad Brutas
 servandas » Mich. N. P. G. p. 104 n. 3, tab. 54 fig. 1 (Ordo II).
 « Lithophytoides nigrum arboribus adnascens, crassus, borinum renem
 veluti representans. ~~Mich. Bull.~~ della ragnata delle broke di Botoli »
 (Mich. in Herb.)
- 18 Hypoxyton coccineum F. Bull. - Sacc. Syll. I p. 353.
 « Lithophytoides ferrugineum della Falterona a di 15 di Ottobre, colto
 sopra gli Abeti (senza piuttosto Jaggio!) » Mich. in Herb.
 « Lyogala globosum, grani pisi magnitudine aeris recentis coloris »
 - Mich. N. P. G. pag. 216 n. 2, tab. 95 fig. 2. (In Horto Soc. bot. Soc. Sept. et
 Feb. mensib. ad ligna uidebatur pabida)
 (Non è ben certo che questo sinonimo spetti ad Hypoxyton coccineum, perche, come
 la specie Lyogala, dovrebbe essere ~~differenza spiana~~ ^{differenza} « crassiori humore repl-
 ta » ciò che non è degli Hypoxyton)
- 19 Xylaria Hypoxyton (L.) Gr. - Sacc. Syll. I p. 333
 « Lichenagaricus O. I n. 1 » Mich. in Herb. (un altro esemplare anonimo).
 « Lichen-Agaricus nigricans ligno adnascens plerumque multiplex
 et compressus, ima parte villosus, summa vero glaber, albidus et pulverulen-
 tus. In aridis et putrescentibus lignis non solum per viridarium Botoli vi-
 dent etiam in quamplurimis sylvis circa Florentiam » Mich. N. P. G. pag. 104, n. 1,
 tab. 55 fig. 1 (Ordo I).

11 Xylaria digitata (L.) Grev. - Sacc. Syll. I p. 339.

« Lichthyoides digitatus pulverulentus, cinereus, radice longissima membranacea et del Giardino dei Semplici di Firenze » Mich. in Herb.
 « Lichen-Agaricus terrestris digitatus niger apicibus albo-rufis, seminibus griseis indigne confertis, radice membranacea longissima varie divaricata et implexa. In umbrosis ambulatorijs Horti Medici Florentini sponte crevit ubi radicem suam usque ad cubitalem longitudinem in humo demittit (precisamente come si vede nell'esemplare originale) » Mich. N. O. G. pag. 104 n. 4, tab. 54 fig. 5 (nec) (Ordo I).

12 Xylaria infressiformis Becc. - Sacc. Syll. I p. 333.

« Lichenagarius O. I n. 3 » Mich. in Herb.
 « Lichen-Agaricus nigricans infressiformis ramosus et non ramosus lignis aridis adnascens. In quercubus lignis circa Catimini ecclesiam » Mich. N. O. G. p. 104 n. 3, tab. 55 fig. 2 (Ordo I).

13 Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. - Sacc. Syll. I p. 193.

« Lichthyoides lichenosus obscurus sub soluta ente ramorum Castanearum dejectarum innascens et late se diffundens. Inello di Maresca » Mich. in Herb.
 « Lichen-Agaricus crustaceus niger et veluti densus sub soluta Castanearum ente innascens et late se diffundens. Prope marescam in Historiensibus montibus » Mich. N. O. G. pag. 105 n. 5 (Ordo II)

14 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. - Sacc. Syll. ed. pz. I p. 191

« Lichenagarius bullatus parvus ex obsuro nigricans sub ente arborum exsiccatarum erumpens. Colto vicino alla Ferriera di Maresca e ne' monti della Falterona » Mich. in Herb. et in N. O. G. p. 105 n. 8, tab. 54 fig. 2 (Ordo II)

20 Butyria spinosa (Pers.) Tul. - Sacc. ^{Syll.} I p. 169.

« Lichthyoides crustaceus, verrucosus, nigris. Della Vernia » Mich. ^(sic) in Herb.
 « Lichenagarius » (altro esemplare) senza localita. Mich. in Herb.
 « Lichenagarius crustaceus, tartaricus, ligni adnascens niger et veluti densus receptaculis florum pyramidalis et verrucosis. In saltu Montis Alverniae in ea parte quae septentrionem respicit » Mich. N. O. G. pag. 101, n. 2. (Ordo XXXVII)

21 Cucurbitaria Saburni (Pers.) Desot. - Sacc. Syll. II p. 308. -

« Lichenagaricus cespitosus, acanlis, nigricans sub ante Anagyridis non foetidae erumpens. Per il bosco di monte Genario e nel bosco della cascina del Castiglione a monte Murello » Mich. in Herb. et in N. P. G. pag. 105, n. 1, tab. 54 fig. 5 (Ordo III).

22 Amphisphaeria conica (Lev.) Ces. et Desot. - Sacc. Syll. I p. 419.

~~Frax.~~ Lichen O. 37, n. 3. » Mich. in Herb. ^{inello de' Lecci dalle Giacciarie in Boboli}

« Lichen crustaceus tartariens in arborum cavernulis proveniens niger et veluti densus receptaculis florum pyriformibus non verrucosis. Per Fliem et Quercum cavernulas in viridario Boboli et aliis » Mich. N. P. G. p. 102 n. 3, tab. 54 fig. 1 (Ordo XXXVII).

23 Ophelia rugulosa Juck. - Sacc. Syll. II p. 97.

« Lithophytoideus crustaceus arboribus adnascens niger et veluti densus capitulis rotundis. ~~Et~~ Colto nelli Olmi de' Frattini di su la Costa a di 28 Maggio » Mich. in Herb.

« Lichen crustaceus tartariens arboribus adnascens niger et veluti densus receptaculis florum exiguis mammiformibus. In Ulmorum caesuris intra et extra Florentiam » Mich. N. P. G. p. 102 n. 4, tab. 54 fig. 4 (Ordo XXXVIII).

24 Nectria cinnabarina (Code) Fr. - Sacc. Syll. II p. 479.

« Lichenagaricus cespitosus acanlis ruber sub ante Anagyridis foetidae erumpens. Ne l'autunno per i gioghi della Jalterona (et in Carnateulentibus) » Mich. in Herb. et in N. P. G. pag. 105, n. 2 (Ordo III).

25 Hysterium angustatum (A. et S.) Sacc. Syll. II p. 764.

« Lichen crustaceus tartariens, arboribus adnascens niger et veluti densus, receptaculis florum transverse oblongis et intortis. In emortuis Fliem caesuris plurimis locis et fortissimum per viridarium Boboli (sp. pie' del Bosco del Labirinto nuovo) » Mich. in Herb. et in N. P. G. pag. 102, n. 6 (Ordo XXXVIII).

Hysterium pubicaria Pers. - Sacc. Syll. II p. 463.

« Lithophyloides crustaceus arboribus adnascens niger et veluti dentibus capsulis transverse oblongis. De Leccei de Vinori del Poggio Imperiale » Mich. in Herb.

« Lichen crustaceus tartariensis arboribus adnascens niger et veluti dentibus receptaculis florum transverse oblongis et quasi reniformibus, non intortis, brevibus. Per ambulacrum Imperialis Villae in Thium cavernulis late se diffundens » Mich. N. D. G. p. 102 n. 7, tab. 54 fig. 2 (Ordo XXXVI).

27 Ostropa cinerea (Pers.) Fr. - Sacc. Syll. vol. II pag. 804.

« Lithophyton albus, crustaceus. De Cipressi del Poggio imperiale colto il dì 10 gennaio 1721 e del dì 25 marzo 1721 » Mich. ^{in Herb.} N. D. G. pag. 102 n. 16, tab. 54 fig. 3 (Ordo XXXVII).

« Lichen crustaceus, farinaceus, arboribus adnascens albus receptaculis florum rotundis, nigris et inter se longe distantibus. In iisdem arboribus (Cipressus) crescit non solum ubi praecedens (Poggio Imperiale) verum etiam per viridarium Boboli et alibi intra et extra urbem » Mich. N. D. G. p. 102, n. 16, tab. 54 fig. 3 (Ordo XXXVII).

Myxomycetae

28 Stemonites fusca (Gledit.) ^{Roth} - Sacc. Syll. VIII p. 397

« Clathroidastrum n. 1. » Mich. in Herb.

« Clathroidastrum obscurum majus per Campodarensis agrum mense junio in ligni putridi cavernulis » Mich. N. D. G. pag. 215, n. 1; tab. 94 (nec 74) fig. 1

Myalia strobila

29 Rhizomorpha subcorticalis Pers. - Sacc. Syll. XIV p.

« Agarium nigrum reticulatum compressum emortuis arboribus inter corticem et lignum, interdum in ipso ligno immascens ac late se diffundens. In Jalleronal, Carmaldulentiura et Vallumbrosanorum sylvis nec non in nemoribus circa Florentiam toto anno » Mich. N. D. G. pag. 125 n. 20, tab. 66 fig. 3 (Ordo VIII)

Nell' Erbario sta anonimo l'esemplare originale riprodotta nella figura, ^{in parte} ad esso un esemplare della ^{stato} stessa varietà ^{terez} ^{terez} Duby (Syll. XIV fig.) Sta quale probabilmente corrisponde a « Agarium nigrum reticulatum compressum » Mich. N. D. G. p. 125 n. 21.

II Paus. Funghi Tergomani.

Hymenomycetae

- 1 *Collybia volutipes* (Curtis) Quel.
- 2 *Sclerophyllum alneum* (L.) Schröt.
- 3 *Clavaria fragilis* Fr.
- 4 " *pistillaris* L.
- 5 *Corticium caeruleum* (Schrad) Fr.
- 6 *Himeola Auricula-Judae* (L.) Berk.

Uredinaceae

- 7 *Puccinia Taraxaci* (Rebent.) Plow.
- 8 " *Canaceti Balsamitae* (Sc.) Wint.
- 9 " *Pumispinosae* Pers.
- 10 " *Aegopodii* (Schum.) Mart.
- 11 *Uromyces proeminens* (Luby) Lév.
- 12 *Gymnosporangium juniperinum* (L.) Will.
- 13 *Cronartium asclepiadum* (Willd.) Fr.
- 14 *Melampsora Helioscopiae* (Pers.) Wint.
- 15 " *populina* (Jacq.) Lév.
- 16 " *Cremulae* Tul.
- 17 " *betulina* (Pers.) Desm.
- 18 " *Lini* (Pers.) Tul.

- 19 *Coreosporium Ruffratiae* (Schum.) Wint.
- 20 " " var. *Phimanthacearum* (Sc.)

- 21 " *Eustilaginis* (Pers.) Lév.
- 22 " *Campanulae* (Pers.) Fr.

- 23 *Aecidium Cyparissiae* Sc.
- (ad Urom. *Pisi* (Pers.) Despy.)

- 24 " *Dragopogonis* Pers.
- (ad Pucc. *Dragopogonis* Corda)

- 25 *Aecidium Clematidis* Sc.

(ad Pucc. *Agropyri* Will. et Ex.)

- 26 " *frangulae* Schum.

(ad Pucc. *coronatae* Corda)

- 27 " *Berkenidis* Pers.

(ad Pucc. *graminis* Pers.)

- 28 " *Erythronii* Sc.

(ad Uromyces. *Erythronii* (Sc.) Pers.)

- 29 " *Asterifolii* Pers.

(ad Pucc. *Antigonem-veram* (Sc.) Wint.)

- 30 " *Eustilaginis* Pers.

(ad Pucc. *Poaenum* Willd.)

- 31 " *cornutum* Gmelin

(ad *Gymnosporangium juniperinum* (L.) Villars)

- 32 *Uromyces Eranyni* (Gm.) Wint.

- 33 *Uredo Rubi fruticosi* Pers.

(ad *Phragm. Rubi* (Pers.) Wint.)

- 34 *Uredo gyrosa* Reb.

(ad *Phragm. Rubi-Idaei* (Pers.) Wint.)

Ustilaginaceae

- 35 *Ustilago Avenae* (Pers.) Jent.

Pyrenomycetae

- 36 *Erysiphe Polygami* (Sc.) var. *Consolidae* (Sc.)

" " *Lathyris* (Sc.)

- 37 *Phyllactinia suffulta* (Rebent.) Sacc.

- 38 *Tortridella Ulmi* (Durr.) Wint.

- 39 *Polystigma rubrum* (Pers.) Sc.

- 40 *Gnomonia Gnomon* (Pers.) Schr.

- 41 *Nannaria Coryli* (Batsch.) Ces. et Levet.

- 42 " *fimbriata* (Pers.) Ces. et Levet.

Volte

Discomycetae

- 42 Geoglossum hirsutum Pers.
43 Ciboria rufa-fusca (~~W. Fl.~~ Wehert.) Sacc.
44 Stegia Iliei Fr.
45 Phytisma punctatum (Pers.) Fr.
46 " acerinum (Pers.) Fr.
47 " salicinum (Pers.) Fr.

Leptotheciaceae

- 48 Leptothecium abneum (Lév.) Sacc.

Pseudofungi

- 49 Phloeomyces (Pseudoprotomyces) in Populo.
50 Galle & P. Neuroterus nummularis (Oliv.) Nyl.
51 Urineum ciliaceum Pers.
52 " abneum Pers.
53 " ilicinum Sc.
54 " acerinum Pers.
55 " Vitis Sw.
56 " Juglandis Sc.

③

Balletus hystrix