

TOM. LANE BOT.

De Witt

refram ab H. borealis nonglicy omnia dimissis. Cuius refraus ad
non illigatione physis digne, et exacte symm. hic alibi
un abf re foud mung.

H. tomentosa Lob. Skp. hift. p. 218. P. Bauh. hift. pl. 3. p. 384 excl.
 syn. Tabern. Ray. hift. pl. 2. p. 1020. L. sp. pl. 2. p. 1106 excl. var. β .
~~Lam. fl. fr. xviii. et Enc. meth. d. Bot. h. p. 166 excl.~~
 Guss. H. monsp. p. 402. ~~W. sp. pl. 3. part. 2. p. 1406 excl. var. β~~
 Lam. fl. fr. 880 n. XVIII, et Enc. meth. d. Bot. h. p. 166 excl.
 + 149. Tabern.
 var. β . W. sp. pl. 3. part. 2. p. 1406 excl. var. β .

H. caule hirsuto tincto asperandulo, foliis ovatis oblongis semianplexicaulis utriusque peltatis, nervis ^{laevibus utrinque} pinnatis, loricis subnullis, laxe distinctis. paniculatis, calycis linearis ovatis ^{laevibus utrinque} ~~acuminatis~~ brachypteris linearibus ^{laevibus utrinque} ~~acuminatis~~ peltatis, corollae utrinque pinnatis, stylis ^{laevibus utrinque} ~~acuminatis~~ bifidis.

Syn. *Hypericum tomentosum* & *Hypericum pygmaeum* Closii. Bot. Non-Ship. p. 400
t. 486. eadem ac in Ship. list.

5. *H. supinum* *tomentosum* *alberrimum* *Clug.* ^{var.} ~~pl.~~ *fig.* 2. p. (lxxx) *end.*
icon as *Abelii*.

2 H. *horreum* - *foliolis* *Dolich.* *hisp.* *leg.* 2 p. 1154 *cad.* *ac* (Bates) *ed* *in* *sc*
for. *herb.* p. 540. *cad.* *ac* *foliolis*.
 10 *fol.* *hisp.* *leg.* 2 p. 1154

44 *Androsace* ~~altissima~~ *altissima* tomentosa Lob. Kirg. adoup. p. 183.

5 *Hypericum supinum* L. Pempt. p. 77 nec Clas.

6. *H. lupinum tomentosum* minus vel monspeliacum C.B. Pin. 279. Reyn.
bot. monsp. p. 135. Journ. Inst. v. Lerb. p. 255.

7. *H. tomentosa* var. *hispida* Perkins. *Trans. bot. p. 592.* *pl. novine*, et huc addita p. 7. *Clusia* *H. repens* *tomentosa* *alaba. sup. cit.*

8 *H. supracinctum* *horvathii* majus Monj. *hisp. oc. Sect. v. tab. VI. fig. 5. exd.*
syn. C. B. Pin. et Cluj.

g. H... fls. biggish *calycum* *corolla* *capitata* *Law. mth. fl. p. 149 n.*
300. *H. liden*

[illegible]

Deser. Caulis tereti quadranguli tomentosi adscendens. Rami oppositi longe petiolati, subrotundi vel elliptici tereti subcaute utrinque ~~laeviter~~ ^{laeviter} sulcati. vaginulae, confusae, pubescentes, vaginulae immixtae, caulis apicem oblonge bracteae petiolatae.

[illegible]

Liegt in m^e Pothill. Partien. Aufsteig l. offener, großflor u. s. d. flüß
 substanz, d. den eig. algen- ^{baum-} ~~stamm~~ für d. harten Ring.

8. *Aphrographus* *Carlinianus*

[illegible][illegible]


[illegible][illegible]

9 Antivitamin c Phenol

Linum grisea

Linnæa gracilis
Antislav. Gymn. Borg et Chamb. exp. de Mor. bot. p. 125 pl. XXI
Linnæa L.

[illegible][illegible]



Chiranthus linearifolius *

Chiranthus lineifolius * Kotschi N. 119. Lohy di 3. May fl. 25 Oct.
Sennar. 1892.

Сеннаат.

[illegible]

Silpho patiently? having uterine attachment ^{comp.} velly adn. partly obstr. & lin. peric
biliary, right abd., velly nerve made driving by. Semen white - xanthomic
^{comp.} = colorable, also membranous bits of sperm rising from pen. soft, ungelatin.
Obs. Seminal quantity in male between a squinty velly drop.

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Flor. in cult. H. Bot. M^s. Mojo, agr.

[illegible]

Julia nearsley 10th Oct. 6th. 1. p. 45

Peterson very
attractive &
longer.

ap. 7. 18

4. 2 4 6
flower like
leaf same

Ben-jing.

2388

chr.

cytini

17.

T. glauca

foliis - perianthii caryophylli

[illegible]

President usually gives major addresses, plus triple lecture at general assemblies, represents people in
... 3 inch frame, always plus many.

Flv.-lvs. like ~~the~~ ~~very~~ ~~young~~ ~~at~~ ~~in~~ ~~South~~ ~~juv.~~
Differs from *P. lutea* Benth. by 50, 2388 when it forms a large tree, very - has larger leaves.

[illegible]

Religion heavenly both vol. 6th. 1. p. 45

Petalum purpureum, inflorescentia composita, calice alba, corolla flava, tubo corollae
 utrinque flavo, lobis corollae ^{natis}. Perianthium nunc plus minusve
 longior. Antherae ^{fuscae} quatuor. Flor. Mart. Dec. de Toll.

[illegible]

7. *Antigen* *

[illegible][illegible]

Ole Kanda in the mountains
Philly. N. York N.Y.

[illegible]

Hydnora ericetorum B

2. *Agrostis* a species frequently perennial: long *perianth* much longer than the
 inflo ~~axis~~ longitudinal corolla, very slender, *obovate* at the apex
~~perianth~~ ^{long} narrow fls. white, yellow ~~at the apex~~
 in 2. corolla segments often 5 narrow long fls. *obovate* *obovate* at the apex
 yellow fls.

Nachdem er wieder fort. Ost Romulus-jungf. den. 2. zu
Hofst. Hagen. Ker in Gt.-ing. SPS, et Kern Ing. ic. war.
2. t. 2go. Hoffst. flij. moffj, na Leuth-Substij. u. nit
Ing. na Substij. ut Ker - an idem?

~~Page 1~~ ~~Page 1~~ ~~Page 1~~
Dugline Ridge

[illegible]

Amide ad L. ouliphon Haskel. scritto secondo il qual nome esso
coltiva in tutti i giardini - forse in Calligiti ma questo ultimo
si distingue dall'altro per vari caratteri e volutamente, per la
parte che è conosciuta e per la sua forma, e per la sua qualità
del suo profumo che è nel suo profumo. Vol. VI. p. 462
e per la sua forma, la quale parte non può essere quella di lui
e per la sua forma, la quale parte non può essere quella di lui

Calamiantha Fenzl. Wj.

C. pedunculata descendens pubescentia subcaulescens, foliis
petiolatis ovatis rhombicis, sublonge subulatis, floralibus decem

Brasilia? palustris.

Radix perennis, crassius, digitum aequans, non raro squarrosa, prope
perpendiculariter descendens, superius gemmis, antheris et demum dracopis
ovatis, inferius, plerumque indivisis, petiolatis, longioribus
subcaulescens, alba, sapore ruginoso, subacris.

Caules in primo anno nulli, in secundo anno solitarii, divi caesi
gemmis radicalibus plures angustius, ^{3-4 pedalis} erecti, teretes, leviter, vix, quandoque
vix basi lenticulis purpureis, prope basi aut superius ramosi, laterales
indivisi; rami axillares, subpatuli, elongati, indivisi.

Folia petiolata, plana aut carinata et superius recurva, subcaulescens, pin-
gitis, omnia glaberrima, rursus inferius punctis leviter minutis, et foliis
albis subulatis et nervaturis angustis, ciliatis, superiora oblonga, lanceolata,
basi angustata et in petiolum decurrentia, sinuata lobata, et rursus punctis
lobis rhombicis, indivisim, et in indivisim, minoribus punctis triplicibus, cau-
lis aciculatis brevibus petiolatis, superiora lanceolata sinuata lobata, et indivisim,
petioli sublonge emittentes, supra plani, et marginibus laevibus, decurrentibus
subcaulescens.

Flores in racemis denique valde elongatis; pedicelli patentissimi breviter, albae
diplo breviter.

Calyx viridis-flavescens, sub antheris perennis et post antheras horizontaliter
patens; sepalis oblongis, apice ~~perennibus~~ connatis, glaberrimis.

Petalis flava; unguis calycis longioribus aut perennis brevior; laminae oblongae, ole-
olae, indivisimae patens.

Stamina calyce longiora aut subaequalia, filamenta breviter apice acuta,
viridis-flavescens; antherae sagittatae, apice oblongae et sub antheris connatis.

Pistillum pedunculatum; germen toris; stylum subteretibus geminis dividentibus
longitudinem aequans; ~~sepalis~~ capitulum subulatum.

Pandulae nectariiferae quatuor, duo inter stamina longiora et calycem breviter, albi-
do inter stamina minora et pistillum angustiores.

Calamintha Fenzlii Vif.

C. puberula ascendens, pube tenui subcaesosa, foliis
petiolatis oppositis sublongioribus subversis, floribus densis
et 3-4 floris

Brasica ? palustris.

Radix perennis, crassius digitata, aequantibus, non raro fissurata, prope
perpendiculata, descendens, papinis gemmis, anaphis et demum in dracopis
inferius glomeratis, induratis, portulacae foliis longitudinem
subcaesosa, alba, sapore rariore subacris.

Caulis in primo anno nullus, in secundo anno solitarius, divinus
gemmis radicalibus plures angustius, ^{3-4 pedalis} erecti, teretes, leviter, vix
vero basi lenticulati - perperascentes
indurati; rami axillares, sub

Folia petiolata, plana
glabra, omnia glaberrima, rari
alibi subulata, in nervaturis
basi angustata, et in petiolum
lobis retundatis integerrimis, an
rari aciculata breviter petiolata,
Petioli subulati, semiteretes, supra
subcaesulati.

Flora in racemis densis vel
duplo brevioribus

Calyx virido-flavescens, sub
paucis; sepalis obtusis, apice

Petalis flava; unguis calycis
obtusis, integerrimis patens.

Stamina calyce longiora aut subaequalia, filamenta teretes apice acuta,
virido-flavescens; antherae sagittatae, apice obtusae et sub antheris recurvae

Pistillum pedunculatum; germen toris; stylum subteretis geminis dividam
longitudinem aequans; stylis capitatum subbilobum.

Stamina nectarifera quatuor, duo inter stamina longiora et calycem breviora,
do inter stamina minoris et pistillum angustiora.

ut superius ramosi, laterales
indurati.
in recurvas subcaesosa per
by duratis, minutis, et foliis
lucida oblonga, lanceolata,
lobis aut rari primis
lobis parvis tripartitis, caulis
primis lobis vel integerrimis.
lamina foliorum decurrente
3 floris, paucissimis brevibus
1. pantheis horizontalibus
labemina.

Malva - anthera

~~Platanus~~ ^{Platanus} ~~argentea~~ ^{argentea} ~~var.~~ ^{var.}
~~Lept.~~ ^{Lept.} ~~argentea~~ ^{argentea} ~~Boott.~~ ^{Boott.} (Haut- lat. p. h. mod. sup.)
 L. vultu pili pili int. et ovum lenticulari cruchi, 1894 p. 22.
 lenticulari, acuminat, mucronat, in petiole attenuat, glo-
 byo, ^{int. lat. p. h. mod. sup.} ~~lat. p. h. mod. sup.~~ ^{lat. p. h. mod. sup.} ~~lat. p. h. mod. sup.~~
 byo, ^{lat. p. h. mod. sup.} ~~lat. p. h. mod. sup.~~ ^{lat. p. h. mod. sup.} ~~lat. p. h. mod. sup.~~
 lat. p. h. mod. sup.

Siliquae in meningi sequipedalibus diffusae, petiolis minus patentibus
 et cum his angulum facientibus, pollicarum asquipedalium, basi lineari in
 medio valvarum minus prominula subtriangula, apice breviter, stylo persistente
 rostratae; valvae diffusi-membraceae, a basi deflexae. Semina
 ovata rugulosa, nigra, ferruginea.

Habitat in coenosis turfosae prope Bagum Vico circa Molini capisita
 fms.

Floret Maio - Sub fine Junii siliquae maturantur et statim deflexae.

Multis nobis cum Brasilia elongata Ehrh. convenit, differt tamen radice
 perenni caulis pluri annuatis; foliis omnibus glabris, calyce horizontaliter
 patente, antheris apice obtusis et recurvis, siliquis pedicello duplo longioribus,
 latitioribus, et flexuosis, seminibus ovatis, nec glabris, quae nota
 forsan a genere Brasilia hanc nostram speciem differt.

Calamintha Thymifolia W.

C. thymifolia ascending puber. toment. subcaulescens. folijs
petiolatis ovatis. strobiliis ovatis pubescentibus. floribus densis

3-4 fl.
minutis
albis

th.
L. Calam.
10 dist.
spica
sem. v. r.
m. f.
XII p.
et caly.
ites
h. 76

ruca
nd
bie
e

Calamintha Hungarica Vrf.

C. fruticulosa ascending with terminal subcaneous. filig
petiolate with slender subcaneous. fls. white, decan

Nictia gen. n. sp. - *Pentapoda*

instructo peristomate, Minivibry, decem
gemmae & albae portula, angustis &
durae (Robilis, vix apud & bulbosi
gemmae omnia cum strachamia conjunct
et M. macrophylla vixit. ^{gemmae} ~~gemmae~~ ^{gemmae} ~~gemmae~~
suspensa ~~habet~~ ^{habet} ~~habet~~ ^{habet} in M. h. N. S. p. 151.

Cemento doli Algerini per le cisterne
terrazzi.

Parte epale di molli plumiggiati, color
e cenere: si mescolano con stes
concreta e si usano per cemento, che
indurisce subito all'aria, e non si
fonde sotto acqua.

Altre cemente: il seguente. Due parti d'ossido di zinco, ed una di calce. Il mescolame bene ingiunto, si batte il tutto con martelli d'lega per 72 ore, preso a lui il cement attig per gran compressione appresso si lega alga ed lio per ricomporre il masonry.

Levy ^{anywhere} Booth
Dutty

[Manuscript - cat. pt. h. middle - sup. 1
p. 22. 1844 p. 22.

^{Amos}
L'union polypolij unit et conserve les cellules ensembles, p^ris
lancetats, accousses, mueronatis, en petits attentez, gl^s
by ozy, ^{integ.} ^{vaccin} ^{florid} ^{tance} ^{unipolij}, ^{punctat}, ^{parula} ^{tame} ^{nid}

6. Caudle
8 - Caudle
14 Peter's
Daryl
Daryl
Norton
Cate Rice
Bieber
do
100 to

Calamagrostis Fuglia Virg.

C. *puberula* ascending pub. tenuis rubescens, filij
 petiolatis oris. Strobis sublong. subseris, floralibus decem
 libis. racemis filiosis laxis, calicibus ignis pedunculatis 3-5
 calicibus. in nervis dubis oris-acuminatis

Salvia filiculis host. late oris-acuminatis
 caulis ~~trifloris~~ ^{trifloris} bracteis decoloratis caducis
 lobis oppositis lobis vix echinatis (canis) antheris
 foliis cordatis, vix ex herbis non cordatis, corollis lobis pinnatis
 infimis subquadratis

Salvia pseudovina (canis) ~~late~~ ^{late} lanceolatis acuminatis
 caulis pubescentibus, bracteis ovatis profusis, lobis
 infimis lobis vix glaucis aut marginibus reflexis

sublong. subseris
 filij pinnatis maculae sagittatae pyramidalis utrobique

Calamiotha Fungii Vif.

C. *fruticulosa* ascendens pub. tenuem rubescens, filij
 petiolatis ovato-*rhombicis* sublongis subseriatis, floralibus decem-
 latis, viximus filiosis latiusculis, ignis pedunculatis 3-*5*-*7*-*8*-*9*-*10*-*11*-*12*-*13*-*14*-*15*-*16*-*17*-*18*-*19*-*20*-*21*-*22*-*23*-*24*-*25*-*26*-*27*-*28*-*29*-*30*-*31*-*32*-*33*-*34*-*35*-*36*-*37*-*38*-*39*-*40*-*41*-*42*-*43*-*44*-*45*-*46*-*47*-*48*-*49*-*50*-*51*-*52*-*53*-*54*-*55*-*56*-*57*-*58*-*59*-*60*-*61*-*62*-*63*-*64*-*65*-*66*-*67*-*68*-*69*-*70*-*71*-*72*-*73*-*74*-*75*-*76*-*77*-*78*-*79*-*80*-*81*-*82*-*83*-*84*-*85*-*86*-*87*-*88*-*89*-*90*-*91*-*92*-*93*-*94*-*95*-*96*-*97*-*98*-*99*-*100*-*101*-*102*-*103*-*104*-*105*-*106*-*107*-*108*-*109*-*110*-*111*-*112*-*113*-*114*-*115*-*116*-*117*-*118*-*119*-*120*-*121*-*122*-*123*-*124*-*125*-*126*-*127*-*128*-*129*-*130*-*131*-*132*-*133*-*134*-*135*-*136*-*137*-*138*-*139*-*140*-*141*-*142*-*143*-*144*-*145*-*146*-*147*-*148*-*149*-*150*-*151*-*152*-*153*-*154*-*155*-*156*-*157*-*158*-*159*-*160*-*161*-*162*-*163*-*164*-*165*-*166*-*167*-*168*-*169*-*170*-*171*-*172*-*173*-*174*-*175*-*176*-*177*-*178*-*179*-*180*-*181*-*182*-*183*-*184*-*185*-*186*-*187*-*188*-*189*-*190*-*191*-*192*-*193*-*194*-*195*-*196*-*197*-*198*-*199*-*200*-*201*-*202*-*203*-*204*-*205*-*206*-*207*-*208*-*209*-*210*-*211*-*212*-*213*-*214*-*215*-*216*-*217*-*218*-*219*-*220*-*221*-*222*-*223*-*224*-*225*-*226*-*227*-*228*-*229*-*230*-*231*-*232*-*233*-*234*-*235*-*236*-*237*-*238*-*239*-*240*-*241*-*242*-*243*-*244*-*245*-*246*-*247*-*248*-*249*-*250*-*251*-*252*-*253*-*254*-*255*-*256*-*257*-*258*-*259*-*260*-*261*-*262*-*263*-*264*-*265*-*266*-*267*-*268*-*269*-*270*-*271*-*272*-*273*-*274*-*275*-*276*-*277*-*278*-*279*-*280*-*281*-*282*-*283*-*284*-*285*-*286*-*287*-*288*-*289*-*290*-*291*-*292*-*293*-*294*-*295*-*296*-*297*-*298*-*299*-*300*-*301*-*302*-*303*-*304*-*305*-*306*-*307*-*308*-*309*-*310*-*311*-*312*-*313*-*314*-*315*-*316*-*317*-*318*-*319*-*320*-*321*-*322*-*323*-*324*-*325*-*326*-*327*-*328*-*329*-*330*-*331*-*332*-*333*-*334*-*335*-*336*-*337*-*338*-*339*-*340*-*341*-*342*-*343*-*344*-*345*-*346*-*347*-*348*-*349*-*350*-*351*-*352*-*353*-*354*-*355*-*356*-*357*-*358*-*359*-*360*-*361*-*362*-*363*-*364*-*365*-*366*-*367*-*368*-*369*-*370*-*371*-*372*-*373*-*374*-*375*-*376*-*377*-*378*-*379*-*380*-*381*-*382*-*383*-*384*-*385*-*386*-*387*-*388*-*389*-*390*-*391*-*392*-*393*-*394*-*395*-*396*-*397*-*398*-*399*-*400*-*401*-*402*-*403*-*404*-*405*-*406*-*407*-*408*-*409*-*410*-*411*-*412*-*413*-*414*-*415*-*416*-*417*-*418*-*419*-*420*-*421*-*422*-*423*-*424*-*425*-*426*-*427*-*428*-*429*-*430*-*431*-*432*-*433*-*434*-*435*-*436*-*437*-*438*-*439*-*440*-*441*-*442*-*443*-*444*-*445*-*446*-*447*-*448*-*449*-*450*-*451*-*452*-*453*-*454*-*455*-*456*-*457*-*458*-*459*-*460*-*461*-*462*-*463*-*464*-*465*-*466*-*467*-*468*-*469*-*470*-*471*-*472*-*473*-*474*-*475*-*476*-*477*-*478*-*479*-*480*-*481*-*482*-*483*-*484*-*485*-*486*-*487*-*488*-*489*-*490*-*491*-*492*-*493*-*494*-*495*-*496*-*497*-*498*-*499*-*500*-*501*-*502*-*503*-*504*-*505*-*506*-*507*-*508*-*509*-*510*-*511*-*512*-*513*-*514*-*515*-*516*-*517*-*518*-*519*-*520*-*521*-*522*-*523*-*524*-*525*-*526*-*527*-*528*-*529*-*530*-*531*-*532*-*533*-*534*-*535*-*536*-*537*-*538*-*539*-*540*-*541*-*542*-*543*-*544*-*545*-*546*-*547*-*548*-*549*-*550*-*551*-*552*-*553*-*554*-*555*-*556*-*557*-*558*-*559*-*560*-*561*-*562*-*563*-*564*-*565*-*566*-*567*-*568*-*569*-*570*-*571*-*572*-*573*-*574*-*575*-*576*-*577*-*578*-*579*-*580*-*581*-*582*-*583*-*584*-*585*-*586*-*587*-*588*-*589*-*590*-*591*-*592*-*593*-*594*-*595*-*596*-*597*-*598*-*599*-*600*-*601*-*602*-*603*-*604*-*605*-*606*-*607*-*608*-*609*-*610*-*611*-*612*-*613*-*614*-*615*-*616*-*617*-*618*-*619*-*620*-*621*-*622*-*623*-*624*-*625*-*626*-*627*-*628*-*629*-*630*-*631*-*632*-*633*-*634*-*635*-*636*-*637*-*638*-*639*-*640*-*641*-*642*-*643*-*644*-*645*-*646*-*647*-*648*-*649*-*650*-*651*-*652*-*653*-*654*-*655*-*656*-*657*-*658*-*659*-*660*-*661*-*662*-*663*-*664*-*665*-*666*-*667*-*668*-*669*-*670*-*671*-*672*-*673*-*674*-*675*-*676*-*677*-*678*-*679*-*680*-*681*-*682*-*683*-*684*-*685*-*686*-*687*-*688*-*689*-*690*-*691*-*692*-*693*-*694*-*695*-*696*-*697*-*698*-*699*-*700*-*701*-*702*-*703*-*704*-*705*-*706*-*707*-*708*-*709*-*710*-*711*-*712*-*713*-*714*-*715*-*716*-*717*-*718*-*719*-*720*-*721*-*722*-*723*-*724*-*725*-*726*-*727*-*728*-*729*-*730*-*731*-*732*-*733*-*734*-*735*-*736*-*737*-*738*-*739*-*740*-*741*-*742*-*743*-*744*-*745*-*746*-*747*-*748*-*749*-*750*-*751*-*752*-*753*-*754*-*755*-*756*-*757*-*758*-*759*-*760*-*761*-*762*-*763*-*764*-*765*-*766*-*767*-*768*-*769*-*770*-*771*-*772*-*773*-*774*-*775*-*776*-*777*-*778*-*779*-*780*-*781*-*782*-*783*-*784*-*785*-*786*-*787*-*788*-*789*-*790*-*791*-*792*-*793*-*794*-*795*-*796*-*797*-*798*-*799*-*800*-*801*-*802*-*803*-*804*-*805*-*806*-*807*-*808*-*809*-*810*-*811*-*812*-*813*-*814*-*815*-*816*-*817*-*818*-*819*-*820*-*821*-*822*-*823*-*824*-*825*-*826*-*827*-*828*-*829*-*830*-*831*-*832*-*833*-*834*-*835*-*836*-*837*-*838*-*839*-*840*-*841*-*842*-*843*-*844*-*845*-*846*-*847*-*848*-*849*-*850*-*851*-*852*-*853*-*854*-*855*-*856*-*857*-*858*-*859*-*860*-*861*-*862*-*863*-*864*-*865*-*866*-*867*-*868*-*869*-*870*-*871*-*872*-*873*-*874*-*875*-*876*-*877*-*878*-*879*-*880*-*881*-*882*-*883*-*884*-*885*-*886*-*887*-*888*-*889*-*890*-*891*-*892*-*893*-*894*-*895*-*896*-*897*-*898*-*899*-*900*-*901*-*902*-*903*-*904*-*905*-*906*-*907*-*908*-*909*-*910*-*911*-*912*-*913*-*914*-*915*-*916*-*917*-*918*-*919*-*920*-*921*-*922*-*923*-*924*-*925*-*926*-*927*-*928*-*929*-*930*-*931*-*932*-*933*-*934*-*935*-*936*-*937*-*938*-*939*-*940*-*941*-*942*-*943*-*944*-*945*-*946*-*947*-*948*-*949*-*950*-*951*-*952*-*953*-*954*-*955*-*956*-*957*-*958*-*959*-*960*-*961*-*962*-*963*-*964*-*965*-*966*-*967*-*968*-*969*-*970*-*971*-*972*-*973*-*974*-*975*-*976*-*977*-*978*-*979*-*980*-*981*-*982*-*983*-*984*-*985*-*986*-*987*-*988*-*989*-*990*-*991*-*992*-*993*-*994*-*995*-*996*-*997*-*998*-*999*-*1000*-*1001*-*1002*-*1003*-*1004*-*1005*-*1006*-*1007*-*1008*-*1009*-*1010*-*1011*-*1012*-*1013*-*1014*-*1015*-*1016*-*1017*-*1018*-*1019*-*1020*-*1021*-*1022*-*1023*-*1024*-*1025*-*1026*-*1027*-*1028*-*1029*-*1030*-*1031*-*1032*-*1033*-*1034*-*1035*-*1036*-*1037*-*1038*-*1039*-*1040*-*1041*-*1042*-*1043*-*1044*-*1045*-*1046*-*1047*-*1048*-*1049*-*1050*-*1051*-*1052*-*1053*-*1054*-*1055*-*1056*-*1057*-*1058*-*1059*-*1060*-*1061*-*1062*-*1063*-*1064*-*1065*-*1066*-*1067*-*1068*-*1069*-*1070*-*1071*-*1072*-*1073*-*1074*-*1075*-*1076*-*1077*-*1078*-*1079*-*1080*-*1081*-*1082*-*1083*-*1084*-*1085*-*1086*-*1087*-*1088*-*1089*-*1090*-*1091*-*1092*-*1093*-*1094*-*1095*-*1096*-*1097*-*1098*-*1099*-*1100*-*1101*-*1102*-*1103*-*1104*-*1105*-*1106*-*1107*-*1108*-*1109*-*1110*-*1111*-*1112*-*1113*-*1114*-*1115*-*1116*-*1117*-*1118*-*1119*-*1120*-*1121*-*1122*-*1123*-*1124*-*1125*-*1126*-*1127*-*1128*-*1129*-*1130*-*1131*-*1132*-*1133*-*1134*-*1135*-*1136*-*1137*-*1138*-*1139*-*1140*-*1141*-*1142*-*1143*-*1144*-*1145*-*1146*-*1147*-*1148*-*1149*-*1150*-*1151*-*1152*-*1153*-*1154*-*1155*-*1156*-*1157*-*1158*-*1159*-*1160*-*1161*-*1162*-*1163*-*1164*-*1165*-*1166*-*1167*-*1168*-*1169*-*1170*-*1171*-*1172*-*1173*-*1174*-*1175*-*1176*-*1177*-*1178*-*1179*-*1180*-*1181*-*1182*-*1183*-*1184*-*1185*-*1186*-*1187*-*1188*-*1189*-*1190*-*1191*-*1192*-*1193*-*1194*-*1195*-*1196*-*1197*-*1198*-*1199*-*1200*-*1201*-*1202*-*1203*-*1204*-*1205*-*1206*-*1207*-*1208*-*1209*-*1210*-*1211*-*1212*-*1213*-*1214*-*1215*-*1216*-*1217*-*1218*-*1219*-*1220*-*1221*-*1222*-*1223*-*1224*-*1225*-*1226*-*1227*-*1228*-*1229*-*1230*-*1231*-*1232*-*1233*-*1234*-*1235*-*1236*-*1237*-*1238*-*1239*-*1240*-*1241*-*1242*-*1243*-*1244*-*1245*-*1246*-*1247*-*1248*-*1249*-*1250*-*1251*-*1252*-*1253*-*1254*-*1255*-*1256*-*1257*-*1258*-*1259*-*1260*-*1261*-*1262*-*1263*-*1264*-*1265*-*1266*-*1267*-*1268*-*1269*-*1270*-*1271*-*1272*-*1273*-*1274*-*1275*-*1276*-*1277*-*1278*-*1279*-*1280*-*1281*-*1282*-*1283*-*1284*-*1285*-*1286*-*1287*-*1288*-*1289*-*1290*-*1291*-*1292*-*1293*-*1294*-*1295*-*1296*-*1297*-*1298*-*1299*-*1300*-*1301*-*1302*-*1303*-*1304*-*1305*-*1306*-*1307*-*1308*-*1309*-*1310*-*1311*-*1312*-*1313*-*1314*-*1315*-*1316*-*1317*-*1318*-*1319*-*1320*-*1321*-*1322*-*1323*-*1324*-*1325*-*1326*-*1327*-*1328*-*1329*-*1330*-*1331*-*1332*-*1333*-*1334*-*1335*-*1336*-*133*

Sub nomine *Amorpha puberula* a hincenis acquisita exstat
in huta planta pubescenti, foliis oblongo-ellipticis integris, et nervis
equis in axilla folii ejusdem apparet flori pedunculatis, erectis
superioribus ovatis, inferioribus pubescentibus, albis decemcostatis, valle
nulla inter costas exsertis, endyse collinis, costis repandis.
ovoidibus calyce undique tecto, ejusdem laciniis quinque
laciniatis elongatis aequis, lobis exsertis pubescentibus, inter
ambrosios foliorum ^{puberulis} ~~undique~~ junctis hincenis bryonibus
quae accumbunt nervis alternatis, repandis. In fovea
hanc laciniis adf. obliquis luteis repandis, nervis
lobis umbellatis undique. Nalla videtur staminum
nec styli nec signum - Calyx ovum acutis transverse
lobis quadrilobis, ovibus planis aequis. ~~lobis~~
nervis lobis ^{invenit} ~~puberulis~~ bryonibus suffragis.

Ornithogalum thyrsoides

[illegible][illegible][illegible]

O. thecarpus? Sect. *Mythysani*? H. X. 595.

Differs ab. 1. greater tendency to give ~~to~~ corda triple & venous
in subquadrately

— 26 O. floribunda. This species is generally common in the wet places, but is not present in the dry places, where it is only occasionally found in the wet places.

— ab. *O. crinita* spec. rug. corolla acuminat. lobis unguibus
staminibus inclusis.

[illegible]

Differs ab hoc & non obstante, pili ^{marginis} apice ~~longior~~, utrinque calypis longioribus, sensim
by margini recurvulis. ^{his} ^{locis} ^{obtusius} ^{glomeratis} ^{pilis} ^{longioribus}

— a. *Thunbergia* fls. *obovatis*, *obtusis*, *glomeratis* *pubes* *longioribus*
spicatis, *reticulatis* *negatis*, *marginis* *acutis*
fls. *obovatis* *reticulatis* *negatis*, *marginis* *acutis*.

— a. *Mikura folia* rugis, utriculis rugis, pinnatif. marginis acuta.

Simulif
Althor A. phyllonix W. amarant. t. vi. f. x. b. p. 11. 1d. abradely
in ill. ex Alth. 1and. certa indubie (V. DC. prod. XIII. part. II. p. 20.
foliis nervis, calyx brevissimus 5-fidus ^{obtus} brevissimus, fructu
calyx incluso, pila emarginata obliqua, nervis in pinnatibus.

Gasmanian Nautifera

In D. Lind VIII p. 381. Sect. 7. Uryskat
Wapiliskif Suppletorya

[illegible]

Hemeris viridis tubis infusis, flammis; anthem ^{strobilus} ^{involucris} ^{multis}. Spikes
exsertum - spicula cordata longioribus stipulato cuneatis,
lobis striatis. Fl. fragrantissima et virens, alba. H. hemer.

Crataegus grandiflora hort.

Celastrus luscitaneus hort.

Ligustrum parviflorum W.

Obt. in Lycop. Kellenura rari floriferi dum accrescit
Eumyrum oppositifolium (namq. Hort. non Hort.)

Eumyrum oppositifolium (Lycop. Hort.)
E. foliis oppositis, rari ~~lanceolatis~~ angulatis, subtriangulis, foliis ^{concrevis} sparsis
alternis, brevibus apiculatis acutis, marginibus ^{spinulosis} ~~reclatis~~ serrulatis
integris, albis cespitibus, utrinque cernitis,

Ambleton 9. / Hadrachia Zyg. 853. 11. 12. 1. /
Hadrachia, alba.
Hadrachia, alba.

[illegible][illegible][illegible]

Alchemilla subalpina Donnet & Stricker. *Alchemilla pinnatifida* Villard
~~inter alia~~ *Alchemilla pinnatifida* Villard *Alchemilla pinnatifida* Villard
 et al. *Alchemilla pinnatifida* Villard *Alchemilla pinnatifida* Villard

Louisa Amerini hort.

[illegible]

Lawsonia alba Vj (flower best used long)

[illegible]

Agrimonia *leucantha* ^{hence} ~~that~~ St Pat New York H. & B.

[illegible]

Caulis nriso, phytolacca, filius rubus ut galodmily nec decano - truncto ^{plade} ¹⁰⁹
in lyxto, hie conatit nec gharf conuenit, et floris albiy uoluit ab e. lyp-
ten d'emp.

Clea repens H. Gracilli non L. Non Clea an *Hyssopus*?

aff. C. ~~laurea~~ quere fol. Sp. fl. terminalis cymos

O. ~~laucera~~ quere fol. - Spert. fl. - ~~laucera~~
O. laucera Lam quere fol. form. sed in nostris orae virentes, virentes,
etiam in virentes, folia minus accensum, marginem undulat. florum
in cymis scutis paucis - subopacis, parvulis, fructum cespitosi
et superantibus. Plia supra virentes, rathus pallidior, integris - flami
tunc virentes. Ductus ovali - subobtusis utrinque obtusis, basi tubis
ulteriori seu colliculi, apice setas style perstante longe superant
signati capitato, foliis perma -

an L. Bravin bot. mag. v. D-1er. II. tab. 1133?

Lonicera rubilang (sub filio nom. f. *(Rubra) Ledeb.* in h. inter.)

[illegible]

glebe

Salvia acaulis ex H. Br. by

Salvia oblonga aut *obovata* lvs. cuneatis, serratis crenatis, nervis, nervis

Corolla 10-lm, ^{longa} tubo lacini dimidio amplius, lobis 5, extus pubescentibus, lacini
brevi subquadrate emarginato-lobis oblique explanatis, reflexis 4-lm *pygmaea* longior
dentibus cuneatis, oblongis, nervis, nervis dimidio lobis, lobis nervis
integris: stamina duo aequalia breviora, locis reflexis, nervis
filamentis oblongis brevioribus. Stylus erectus filiformis, laciniis valde inaequalibus,
superioris duplo brevioris

Plantae rubiae Dec. III

Picridium macrophyllum

P. perenne glaucum ^{erecto} glabrum, caule ^{simplex} subfleglo bipid, foliis ^{longe} cordato-angulatis, oblongo-obovatis apice ^{longe} retundatis, denatis subtentibus apice ^{longe} incurvatis, tuberosis, squamis ^{longe} laxis.

Hab. in rupibus ad Mokymon lat. aud. Fl. Junio. 2.

Deser. *Picridium* ^{longe} ~~capitulum~~ ^{longe} ~~perenne~~ ^{longe} ~~herbo~~ ^{longe} ~~glabrum~~ ^{longe} ~~glaucum~~, cent. 30-40 long. Folia inferiora oblongo-obovata ^{longe} basi ^{longe} attenuata, ^{longe} ~~marginata~~ ^{longe} ~~laevia~~ ^{longe} ~~venosa~~ ^{longe} ~~pinulosa~~ ^{longe} ~~obovata~~ ^{longe} ~~apice~~ ^{longe} ~~retunda~~ ^{longe} ~~caulibus~~ ^{longe} ~~similia~~ ^{longe} ~~sed~~ ^{longe} ~~basi~~ ^{longe} ~~latiora~~ ^{longe} ~~et~~ ^{longe} ~~cordata~~ ^{longe} ~~angulata~~ ^{longe} ~~15-18~~ ^{longe} ~~cent.~~ ^{longe} ~~longa~~ ^{longe} ~~5~~ ^{longe} ~~cent.~~ ^{longe} ~~lata~~ ^{longe} ~~sinuata~~ ^{longe} ~~lacunae~~ ^{longe} ~~latifoliae~~ ^{longe} ~~marginis~~ ^{longe} ~~et~~ ^{longe} ~~apice~~ ^{longe} ~~perforatis~~ ^{longe} ~~caulis~~ ^{longe} ~~erectis~~ ^{longe} ~~inferius~~ ^{longe} ~~foliatis~~ ^{longe} ~~superius~~ ^{longe} ~~agly~~ ^{longe} ~~3~~ ^{longe} ~~simplex~~ ^{longe} ~~vel~~ ^{longe} ~~rarius~~ ^{longe} ~~bifidus~~ ^{longe} ~~pedunculis~~ ^{longe} ~~clongatis~~ ^{longe} ~~caespitibus~~ ^{longe} ~~simplex~~ ^{longe} ~~foliis~~ ^{longe} ~~dentatis~~ ^{longe} ~~apice~~ ^{longe} ~~angulatis~~ ^{longe} ~~retundis~~ ^{longe} ~~subulatis~~ ^{longe} ~~basi~~ ^{longe} ~~equantibus~~ ^{longe} ~~lanuolatis~~ ^{longe} ~~attenuatis~~ ^{longe} ~~angulatis~~ ^{longe} ~~venosis~~ ^{longe} ~~perditis~~ ^{longe} ~~apice~~ ^{longe} ~~extima~~ ^{longe} ~~incurvatis~~ ^{longe} ~~floris~~ ^{longe} ~~auris~~ ^{longe} ~~P. vulgaris~~ ^{longe} ~~majoris~~ ^{longe} ~~capitulis~~ ^{longe} ~~capitulatis~~ ^{longe} ~~involucris~~ ^{longe} ~~inferius~~ ^{longe} ~~equantibus~~ ^{longe} ~~ovatis~~ ^{longe} ~~auris~~ ^{longe} ~~apicibus~~ ^{longe} ~~marginibus~~ ^{longe} ~~late~~ ^{longe} ~~albo~~ ^{longe} ~~membranaceis~~ ^{longe} ~~laxis~~ ^{longe} ~~effertis~~ ^{longe} ~~lanuolatis~~ ^{longe} ~~linearibus~~ ^{longe} ~~triplo~~ ^{longe} ~~longioribus~~ ^{longe} ~~corolla~~ ^{longe} ~~nullo~~ ^{longe} ~~bracteatis~~ ^{longe} ~~Corolla~~ ^{longe} ~~tubo~~ ^{longe} ~~filiformi~~ ^{longe} ~~villosa~~ ^{longe} ~~albida~~ ^{longe} ~~limbo~~ ^{longe} ~~5-partito~~ ^{longe} ~~laciniis~~ ^{longe} ~~linearibus~~ ^{longe} ~~Alconium~~ ^{longe} ~~lineare~~ ^{longe} ~~oblongum~~ ^{longe} ~~tetragonum~~ ^{longe} ~~costis~~ ^{longe} ~~obtusis~~ ^{longe} ~~transversis~~ ^{longe} ~~tuberculatis~~ ^{longe} ~~rufis~~ ^{longe} ~~perinde~~ ^{longe} ~~driftis~~ ^{longe} ~~pappo~~ ^{longe} ~~nigro~~ ^{longe} ~~multifloro~~ ^{longe} ~~simplex~~ ^{longe} ~~sech~~ ^{longe} ~~basi~~ ^{longe} ~~in~~ ^{longe} ~~annulis~~ ^{longe} ~~junctis~~ ^{longe} ~~et~~ ^{longe} ~~cum~~ ^{longe} ~~ipso~~ ^{longe} ~~duriis~~ ^{longe}.

Chr. affinis *P. didymum* Rich. et Mey. a quo praecipue differt caule subfleglo nec lingua didyma, pedunculis conspicuis incurvatis squamis involucri laxis, costis longioribus.

Expl. icon.

Senecio macrocephalus

caulis
{ pilosus, decumbens, foliis ovatis-lanceolatis,
etrogis.

Melgedium sonchifolium

M. caule erecto striato villosulo, foliis ^{super} glabris ^{petiolo} nervis
 hirsutis, ruminato-pinnatifidis, basi cordato-^{renatis} ^{sub}auriculatis amplexicaulis, lanugine
 serrato-dentatis, auris ovatis ^{lanugine} ^{terminali} cordato-tri-
 angulari maxime type confluentibus, ^{glabris} ^{petiolo} ^{caule} ^{terminali} ^{apice}
 subumbellatis ^{glabris}, pedunculatis, subnatis, squamulosis, involucri
 dupli ^{glabris} ^{acheniis} ^{lanugine} ^{obtusis} ^{compressis} in rostrum ^{caule}
 concoloribus apice in caputulum ^{articulatis} ^{expansum} ^{attenuatis}
 pappi singulis ^{seatro} ^{candidis}

Syn. Lactuca sonchifolia Lami. Verz. der in Herb. wildw. Phanerog. p. 85

non W.

Lion. abietinis in Crnarehensis
 Hab in saxis sylvestribus Montibus Klau, ⁱⁿ ^{abietinis} ⁱⁿ ^{Crnarehensis}
 in con-Alexinae M. Ples. ⁱⁿ ^{abietinis} ⁱⁿ ^{Crnarehensis}
 Stanica prope Majdanpek, et in ^{abietinis} ⁱⁿ ^{Crnarehensis}
 Lili. ⁱⁿ ^{abietinis} ⁱⁿ ^{Crnarehensis}

Obs. Cl. L. H. Schultz bipentum super hanc plantam a prof. Lamine
 acceptam et quam prius *Melgedium* annum vocavit, in litteris
 eidem ^{mittis} ^{hanc} ^{genus} ^{instituit}, et cum alijs *Melgedi* ^{et} ^{Lactuce} ^{specibus}
 in schedis ineditis eui illa preest -

Eryngium palmatum

E. foliis radicalibus et inferioribus longe petiolatis orbiculatis palmatisve, lacinis dentatis spinulosis, apice trifidis, caulibus sessilibus confertis, capitulis
involucris lanatis, aluminatis, capitulo longioribus, paleis triuncipitatis calycis sagittatis,
stylis divaricatis.

Syn. *E. triuncipitatum* Lam. Ver. in d. Verb. Wildw. Manory p. 46 non L.
 Leon

Hab. in saxonia calcanis prope Narvica, 160. Petka in cor. Lugna,
 Baja in Ukraina, Ulyanov in cor. Kengulgero, et M. Ozydenek
 Verby merid. Ital. ~~Thalia~~ Capitula viridantia, petalis albis linea
 rubra carinatis.

Descr. Radix perpendicularis crassa nigrescens, perennans. Herba omnes rigida
 pallide viridis a 50 ad 70 cent. longa. Caulis solitarius erectus teres simplex.
 Foliorum superiorum petiolis brevibus, basi vaginae angustis subulatis ampliusculis, cent.
 10 longis. Laciniae foliorum quinque vix saepe, ovatae aut oblongae, apice trifidis
 3-5 sectae, dentate-serratae, rubris et apice spinulosae. Caulis apice triuncipitatus
 latus, capitulis superioribus oppositis pedunculatis, foliis caulium confertis sessilibus
 stipulatis. Capitulum ovato-subhemisphaericum cent. 15 longum, involucri phyllis
 foliaceis planiusculis 20-40 null. longis, 3-4 null. latibus. Paleae breviter
 latiusculae superne lanatae apice spinosae triuncipitatae, caudibus paleae dimidiis
 brevioribus. Calyx glaber, laciniae in longitudo dimidiis brevioribus. Petala alba
 linearia-obovata, calyce breviora. Styli divaricati.

Obs. ~~at~~ *E. triuncipitatum* differt, foliis radicalibus cordatis indivisis, capitulis ~~longis~~ minoribus,
 involucris compressis, demum ~~impunctatis~~ ~~impunctatis~~.

Granthus flavus macrinus V.

[illegible][illegible]

Ch. Affinis *D. pinifolia* Sm., a quo differt caule tereti, foliis setaceis rigidis, humulo humilis - In horto palatino cultus faciem et characteris servavit.

[illegible]

Flor. Feb. ^{Mar} 1872. H. Put.

aceto extante medius in spinas pungentes prodest. Alburnum
nitidum-laeve sabuliferae lineae 5. oblongum notatum, lapi. inter
lucis irregulariter striatum. Necturium capituliformes pan-
non depressum
latum oblique pentagonum.
conicum nec sine angulif

non paginatum
calum oblique pinnatifidum.
achonium non pinnatifidum nec sine angulis
nec squamis ovatis ut in *C. crispis* form. *multifloris*
Sed. *Sp. Pich. f. 100* nec pyramidata *rectius angustior*
qui infusis *Sp. Pich. f. 100* minoribus aggregatis et
acutatis *Sp. Pich. f. 100* ex *Saed. fl. Tab. V. p. 166*. Simile *rectius*
Est. *Sp. Pich. f. 100* *Sp. Pich. f. 100* in herbis floribus a fine
Aprilis ad Majum, caulibus curvatis vix, latiusculis
a basi apiculatis crispis, ex ovatis florum axillis
univariis et prope in eorum acutatis apicibus
caulium plane castris, florum capitatis verticillis
solito minoribus oblongis. *Sp. Pich. f. 100* tempore florum
caulis castris. *Sp. Pich. f. 100* 1-2 pedum. *Sp. Pich. f. 100* planta
vix *Sp. Pich. f. 100* *Sp. Pich. f. 100* *Sp. Pich. f. 100* *Sp. Pich. f. 100*
multa *Sp. Pich. f. 100* *Sp. Pich. f. 100* *Sp. Pich. f. 100* *Sp. Pich. f. 100*
tunc *Sp. Pich. f. 100*

Centaurea calverleyi

[illegible][illegible][illegible]

Parietaria cordifolia R. & S.

[illegible]

lucida ^{lucida}
Syn. *P. lucida* Panc. in litt. non L.

Hab. in rugosities ad. lentic in lenticulis. H. iridat.

H. Linn. 6

[illegible]

Hab. in rupesibus et glaucis latearis alvei Fauce Laron
Sed. auct. H. rugos. fl. flav. E.

Obt. Tomento albo-florum, caule simpliciter,

[illegible]

Taeguina maragdina H. P.

[illegible]

In hac botanica multa ab hinc annis culta
sub signis et nomine / quod in multis operibus
inveniri contingit. — 18 Junio 1878.

Saurumatum guttatum Schott.

Melitem. v. 2. p. 17.

Questa curiosa Aroides scoperta dal Dr. Wallich
nel Nepal e da Blume in Java venne figurata
la prima volta nel Cart. Bot. Mus. tab. 4665
da un bulbo che fiorì nel 1849 ^{nel giardino di Kew poco andr.} e che era stato mandato
l'anno addietro dal Sig. Low di Sanna del (Bombay.)
al Sproffetto Hooker. ^{fu portato nella}
flore del botan. Vol. XIII ^{F. 1334. Schott}
la figurò nel 1850, nel suo *Generi Ardicarum*
V. II. Tab. 11 ^{ma questa figura} ^{non è bene quella}
spata, ^{essendovi} ^{forse} ^{invece} ^{34 figure delle altre}
parti. ^{l'anno} ^{per la prima volta}
in quest' Otto Botanico. ^{Del bulbo nasce il}
fiore prima dello spuntare delle foglie. Esso spata
alla base ha due a tre brattee membranacee bianche
con macchie nerastre, circa un pollice ^{spazio} ^{tra} ^{quattro}
con macchie ^{nerastre} ^{tra} ^{quattro}
spata ^{che} ^{tubulosa} ^{alla} ^{bise} ^{si} ^{apre}
aperta ^{ad} ^{all'} ^{atterza} ^{degli} ^{stami} ⁱⁿ ^{una}
lunga ^{spianzione} ^{lanceolata} ^{irregolarmente} ^{ornata}.
e d'un colore giallognolo con grandi e piccole macchie
rosso-viole e cadendo lascia a nudo la parte
superiore sterile dello spadice. ^{Questo} ^è ^{formata} ^{dalla}
base degli organi femminili sopra ai quali stanno
alcuni capi ^{avanti} ^{gialli} ^{per} ^{ultimo} ^{gli} ^{stami}.
Il Dr. Wallich osservò che queste pianta ha

^{proprio} l'istota d'un fenomeno curioso. Io dice che nel
^{foco} della guta al momento della fioritura.
si sente un calore considerevole. Da ^{andò} nel nostro Exemplar
avvenne il fenomeno ^{in luogo di Nervi} che si accende come la parte medietale
della guida ^{che disse l'abate si può intendere facilmente in questi} che si calda che accendeva un termometro
(il quale segnava la temperatura ^{a centigradi} dell'ambiente)
salì fino a 25° permanendo in tali condizioni ~~per~~
dalle 9 del mattino fino alla 1½ dopo mezzogiorno.
^{Certo senza dubbio} ~~essendo in tale stato~~ dove accompagnato da un
^{che così col abito e delle pupille} forte odore cadaverico ~~la notte ora~~
^{maggiormente quando furono} ~~alla calce co adde sta~~ gli stami erano ancor
chiusi; solo questa mattina ^{dopo} essi avevano emesso
il loro polline che cadeva ^{intorno} nella base della guta
e in seguito si potrà osservare se la seconda serie
^{abbia anche} ~~sia avvenuta~~. Lungo.

Belyob 11 decro 1874

Stimabilissimo amico!

Dalla sua casa il q. d'haro intervi con gran
piacere ch' l' lla sia occupata a preparar la IV drea,
o alle molte piante selbe.

Or mentre alcune specie de lei proposte nel
più basso le dirò il mio parere, m' accordo con lei
che queste entrino nel IV drea:

Stachys binnata - Selbe m.

Eryngium comatum,

Carex laurica calycina,

Oxycodon composita - Selbe m.

Verbascum heteropogon - heteromallon m. dlin.

In queste altre 4 altre de lei proposte con le
i miei dubii:

Il *Fragopogon panicin* l'ho coltivato nell'orto
e finilo non l'ho potuto distinguere dal *F. composita*.
l'm; se davvero è nuovo e diverso dal *F. composita*.
l'm; la prego di dargli un altro nome.

Il *Dactylis cespitosa* mi pare d'approppio un
esemplare avuto da de Volz di Chetovoy in Fran.
cia la stessa pianta che il Jordan disse *F. communis*.
latum m.

proprio
dotata d'un fenomeno unico. Io direi che nel
L'epoca della spata al momento della fioritura
si presenta un calore considerevole. Da nel nostro Exemplar
avanzare ^{permanente} ^{non} ^{esso} ^{che}
~~fenomeno~~

della radice
(il quale segre-
tati fino a
dalle g del
~~caule~~ ^{caule} ^{involto}
forte odor
caldo calce
chiusi; solo
il loro pol-
e in sequa
altre auto
~~tra~~ ~~involto~~

Il Danting Jethrus e sotto una pianta nuova
ne sono d'accordo il Griebach e il Briffid - ma a me
pare che di molto al D. pinifolius L. e D. libanum
briffid, ed anzi che si separato come specie nuove, di so-
tra piuttosto teneri e a fondo in una le due forme esse
ne il pinifolius ed il libanum.

La d'agosto, Jethrus ha coltivato l'anno passato
nel orto unitamente alla dr. Simla di Nladon ed
ho finito col persuadermi che la pianta del Stel non
e altro che il dr. corpicula Schult - linguale L.

In vece di queste piante che tengo dinno contro
verre io le propongo le seguenti:

1° Coronicla elegans di Debye. Il Briffid
e l'Hechtich, le danno specie bellissime. Il Griebach
mi disse esser esse quella che egli pubblicò nel
suo Spitzgum sotto il nome di C. vera var. pen-
cistura, ma convengo che alquanto ne differisca.

2° Ramonda Sabia. Heres, Hechtich, Lape,
dono veramente nuova. Il Griebach mi disse, di
aver studiato mi divenne la L. typica che ap-
parecchio cresce mi biliviale (micarhisto) e convengo
che la nostra pianta che cresce sempre sulla al-
cassa ne sia diversa - ha corolla longiore,
antheris multius, filis magis parvis, stamine di-
missiori et tempore floridis pateriore.

Dell'altissima Jethrus che io dapprima aveva
creduto dr. bicolor briffid. ma che il Briffid mi
disse esser diversa da dr. bicolor e dr. gracile.

Forse potro nell'opale uguale procacciarmi dei fructi
cungli di queste piante e se non che manderò i Minimi
che ho nella mia collezione.

5. *Centauria melanocephala* - floribus albis - del dr. Höl
che nel mio Reichbachi'ss. Hst. è conosciuta, ma che ora
non è di sopra. Ella trovata la pianta nel stesso giardino
in cui ho avuto da me la *Centauria calverleyi*.

5. *Centauria austriaca* Druce. Specie giovane dell'esp.
La delle pamiculata. Il Reimel l'ha annoverata come
nuova fra le sue piante dell'ingheria ove dice che
è rara, nella Serbia e delle più volgari.

6. *Fin Reichbachii* Hoff - L. Serbia Druce. L'
ho veduta fra le altre piante del Herbarium nell'es-
tuario del botanico Hagnel. La pianta merita d'
esser illustrata, perchè è assai poco conosciuta, essendo
rara nell'ingheria - solamente nel Donaugeth vi-
no a Mehadia. Nella mia Serbia ella è affai com-
une.

7. *Genista subcapitata* = *sericea* Druce. Ver-
na Hoff. che credo ella ha dovuta da me del dr.
Reimel. Il Hoffus la disse propria alla *G.*
capitata Spach e molto diversa dalla *sericea*.

8. *Destinac histula* Druce flora pom. Serbia
stempala = *D. propinqua* Druce. Ver.

Le altre nuove o dubie potranno restar per la
Druce V. ove guarderò questo anno a fornirle
il materiale. *Destinac lescuriana*, non ho potuto aver-
la ancora fin. Hoffus e Reichbach la dicono necessa-
rissima. - brebanche Vato ho cercato avanti due



