Flores exasperati. Quantum pedunculus extra squamas pedunculum ipsum longus, hirsutus, rubicundus, apice quinq; rubris lineolis antis planitis ore coronatus.

Covellia exasperata vis.
- Stylus latitudine in stigma obliquum incrassatum desinit - inaequalem.
- Stigmata interdum subbifida.
- 3-stamina sessilia 3-stamina pedicellata
- Seriegenus ~~exasperatum~~ hinc gibbum, pedicellatum.

Flores lutescentes - Quantum pedunculus, glabrum, basi tri-stamina, plerisq; latissima ovata-obtusa, ore quinq; incisuris convexis clausus, antrorsum, versus receptaculum pilis rubris. Pl. rarissime superiorem pedunculum obtusum, quinq; bi-stamina, plerisq; ovata rubra, stamina 2. planiusculis, cylindrica, antheris fuscis, obtusis, compressis, interdum stamina obliqua, interdum extra corollam angusta: ~~interdum~~ Stigmata in vertice, ~~obtusa~~. Pollinis ~~Flores ... pedicellus ovatus clausus ... apice ... stigmata ... pilis ... albus ... corolla~~ granula elliptica.

bractiis clausis carnosis rubris apice pilis crassis obtusis, vel subtilissime amplexantibus

Flores fructuosi sessiles clausi + ovari sessili umbilicuto, stylo ~~stigmata ... tecto~~ declivibus carnosis, ~~+~~ stylo ~~stigmata ... tecto~~

gregatim non simplex ulcerata apice in tubum contracta ore aperto denticulato-lacero

Flores aurantiaci

Flores fructuosi sessiles bractiis binis bryaliisq; ovali-rotundis, ovario rubrobrunde hirsuto gibbo, stylo latiusculo tenui, stigmate obtuso-compresso, receptaculo gossypio gibbo.

Flores racemosi

Flores fructuosi sessiles bractiis ovario rubrobrunde hirsuto gibbo, stylo latiusculo tenui, stigmate

Clematis - Anthotheca pedunculata, basi involucro triphyllo cincta, ore extra squamis planis clausa, Flores unisexuales, intra squamas, intra stamina, ore quinq; planis obtusis, ovario subquadrato alii sessiles bractiis et foliolis nudi vel bractiis paucis lanceolatis disciformibus ~~ovario~~ ~~subquadrato~~ by circiter, stylo ~~clavato~~ perpetuo latiusculo stigmate tubaeformi ore denticulato; alii pedicellati bractiis majoribus ovario stylo longiusculo conniventibus coronatis, stylo et stigmate compressis; alii longius pedicellati, bractiis etiam majoribus in pergamenis magnitudine speciem coronatis, stylo apice contorto. — Dies in hortum Bot. Reg. Clematis flam. Linn. et H. Bot. pat. adjacent; nutrique in hiatus aliquos stamina disposita radicis delineatione signantur.

Menzelius

Angulus illi basi insertus triplicis ipsamq concavitatem circulum, ac ipsamet clausam, pecunia
spatio ullum, et ipsis ipsamq vacuq instructum. Hoc multiplex unitas = plurium alter illi
bi-tubatus, brachij ovali-rotundij concavij, stylo laterali a medio ad apicem in stylum
linearis-elongatum pagellas rectum ut prostatorum productus: alii ~~multiplex~~ plurimi-tubatus. stylo minus
extentius stigmate subrotundo notatus pagellas, omnis pedicellatus: alii abortivus neutri
brachij stylo ~~phasinij~~ plurimij. — Dico in Lavam cl. ~~Pfaffij~~ Prof. Sol. Menzelius
~~[illegible]~~ de ~~[illegible]~~ plantarum anatome et algologia
~~[illegible]~~ eximia ~~[illegible]~~ meriti.

M. annotabam