

Fig 1^a fior fem. lungamente pedicellato, colle bratte perigoniali ancor più sviluppate che stilo & ovulato —

NB. Tanto in questa specie che nella precedente il cuano cuano che sviluppa il perigono decrepita lo sviluppo dell'ovario; l'ovulo è appena visibile e lo stilo è lo stesso per essere perfetti, o quest'ultimo cuano — hanno costanti & assai variabili alcuni in queste piante coltivate —

Ficus crassifolia —

Fig 7^a sezione verticale del fior fem. dall'apice ove si vedono le spume fogliacee assai larghe che chiudono l'orificio —

Fig 2^a fior fem. ^{semplice} nudo collo stilo laterale ma non assai flesso, tico come nel fior raccorfo e più grosso, e rigato, più corto — Lo stigma è infundibuliforme —

Fig 3^a fior fem. con due o più spume lanceolate e più o meno dilatate ^{o a guaina} ~~o a guaina~~ —

Fig 4^a fior fem. tutto avvolto entro spume perigoniali e infundibuliformi —

Fig 5^a fior fem. ancor più picciolato, col perigono quasi uncinifolito, sviluppatissimo, e coll'ovario abortito —

NB. Anche in questa specie vedesi la medesima prodigiosa incisa fra lo sviluppo del pistillo e quello del perigono —