Wróblewski & Gasparini w 22 Feb. 1825

Gasparinia — Erythrozyne

Coenanthium longe pedunculatum, glebrum laeve, basi involucrum, postrio terniq ovato-rhombeis, ore squamis imbricatis conniventis clausum, androgynum. Flores maculi superiores pedicellati ebracteati, perianthio monophyllo infundibuliformi, limbo tripartito vero bifarito laciniis ovatis acutiusculis, staminibus deibus filamentis cylindricis, antheris subrotundis utrique emarginatis, interstitis, locellis antherarum ~~oblongis~~ extra connectivo in ~~plenum~~ stam dorsum ~~centrum~~ amplexo conjunctis ~~[illegible]~~. Flores foeminei ~~sed pedicellati~~, perianthii lobis bracteis 2-3. oblongo-clavatis carnosis rubris, postrio crassis obtusis inferioribus ~~carnosis~~ penicillatis, ovario breviusculo pedicellato unilaculari ob gibbositatem ovii latentem, stigmate infundibuliformi carnoso subrotundo hinc gibbo, stylo tenui ~~latente~~, ore angusto membranaceo extra vel lacero, hinc in rostrum unilaculare producto.

Erythrozyne luteiflora

G. luteiflora Vij — Vivy luteiflora Desf. cat. h. par. 1829.