

Erythrogyna V. J.

Amphanthem longe pedunculatum glabrum laeve basi involucreto foliolis longis ovato-rhombicis, ore squamis imbricatis concavis clausum. Intus sparse villisum androgynum. Flores masculini superiores pedicellati clavicati, perianthio macrophyllis infundibuliformi, limbo bipartito, raro bipartito, laciniis ovatis acutiusculis; staminibus duobus, filamentis cylindricis, supra basin antherae apicis, bilobis, antheris subrotundis utrinque emarginatis semi-exsertis, quadrilocularibus, lobulis geminatis, et antennis sulco breviter, ceteris connectivo in duas totius antherae domum obsestantem ampliato conjunctis, pollinis granis oblongis longioribus utrinque extremitate tubulum emittentibus. — Flores foeminei inferiores sepius, perianthio loco bracteis 2-3 oblongis clavatis carinis rubris, apice pilis crispis obtusis undulatis periclytatis, suffulti; ovario brevissime pedicellato umbellari subrotundo limbo gibbo, stylo brevi ob ovario gibbositatem sublaterali, stigmate cavo, ore ampliato membranaceo eroso, vel lacero hinc in rostrum canaliculatum producto. — Nomen a colore rubro floris foemineorum.

Spec. Erythrogyna lutescens V. J. — Syn. Ficus lutescens Desf. cat. pl. h. par. 1829. p. 413. Ficus biflorulosa Colla? nec alius?

Expl. icon. I. f. 1: 2: 3. Flores foeminei bracteis denudati — f. 4. floris foemineis cum bracteis — f. 5. ovarium sub vitro compressum, ut ejusdem locutione ovatus conjunctus — f. 6. floris masculis, perianthio bipartito — f. 7. id. perianthio bipartito quod proprium. f. 8. Nomen posteriorum, anthera connectivo digressum obducta — f. 9. staminum anteriorum unum — f. 10. granula pollinis bi-tubulifera — f. 11. Anthera 4-lobulari sectio transversa

W. II.

Covellia aromata V. J. — Syn. Ficus aromata Syn. cat. h. Schaff. bot. co. Coll. hort. vique tab. viii) f. — (Caracteres generis exacte ut in Covellia Gayparr.

Specimen hunc Ficus exagregata Vahl auersunt. Sprengelii, J. subsp. h. Lam. Desfontainii differt vero a descriptione Vahl (En. plant. 2. p. 196.) ramis villosis foliis basi oblique cordatis nec acutis, et propeque pedunculis solitariis nec geminis, et fructu undique squamoso et majore. ab illa Lamarckii fructu squamoso. Planta Lamarckii autem ex ipso Desf. in cat. h. par. 1829. p. 346 est species distincta. Hinc nomen proprium a Specie imperitum, ut reliquis ceteris, omnibus anteposendum

III. Clementia W.

Amphanthum pedunculatum, basi involucrio rufis cinctum, ore extus squamis pluribus clausum foemineum, intus glabrum, et ex versis squamis variis foliaceis oblitum. Flores multiformes mixti: alii sessiles nudi, vel bracteati numero variis lanceolatis breviter ovano subaequalibus aucti, stylo perfetto laterali, stigmatibus triplicibus ore denticulato: alii pedicellati bracteati ovano duplo longioribus connatisque coalitisque, stigmatibus styloque conformi: alii longius pedicellati bracteati etiam majoribus in perianthio monophyllo speciosa connatis, stylo apice castrato — Erro in honore doct. Josephi Clementi, olim Scholae et Horti putanensis adiuncti, mihi in huius alijque observationibus instituentis solati dulcissimo sagacissimo.

1. Clementia crassineria W. Syn. Frus crassineria Desf. cat. h. par. 209. W. p. pl. 3. p. 1138. — Den. 4.

2. Clementia ²racemosa W. Syn. Frus racemosa L. sept. d. 7. p. 1515 (end. Syn. Kumph. —) — Den. 3.

Hae differunt quodquam a genere precedenti, succo aurantiaco nec albo, fructibus viliis, stylo breviorre ad latus rufis nec ex orbeo lateris ovano exsertente, stigmatibus cavo infundibuliformi seu conico, nec cylindrico ut in illa. Attamen hij in plantis, ubi ruti generis yvarum deficiunt separare non audent, notis caeteris sat congruentibus.

Expl. icon. Clementia crassineria. IV. f. 1. Sectio transversa amphanthii ut videantur superius squamis foliaceis variis, dein flores multiformes mixti. — f. 2. Flos foemineus sessilis nudus — f. 3. Flos foemineus bracteatus binis pluribusque late lanceolatis, ovano pedicellato — f. 4. idem longius pedicellatus et squamis in perianthio connatis inclusus — f. 5. Flos sterilis ovano abortivo longe pedicellato, stylo castrato, perianthio vesiculari monophyllo.

Expl. icon. Cl. ²racemosa. III. f. 1. Sectio transversa amphanthii ut conspiciantur superius squamis lanceolatis variis, dein flores multiformes mixti. — f. 2. Flos foemineus sessilis bi-bracteatus, datus etiam nudus, vel pluri-bracteatus, bracteati ovano appressi vel remoti — f. 3. Flos idem pedicellatus, bracteati ovano duplo longioribus in perianthio speciosa coalitis — f. 4. Flos longe pedicellatus sterilis, ovano abortivo, stylo castrato, perianthio vesiculari monophyllo. — In hac specie superficies interna amphanthii fere stellata videtur ob formam stellato-pentagonalam stigmatum micem adhyrentium — Huius plantae perfectae non pertinet icon Kumph. amb. 3. tab. 82. 88 a Linneo data, sed eam bene refert Rheed. hort. malab. 1. p. 28, in qua etiam amphanthum pedunculatum nec simile ut habet Spr. syst. veg. 3. p. 780. Planta Kumphii certe diversa. —

V. Meneghinia V. nec Endlich.

Amphanthum sempe verrucosum basi squamij tribus concretis involutatum, ore squamulis
 clausum, foemineum, intus villisum, et ex veris squamij variis instructum. Flores mult
 formes mixti: plurimi semites bi-tribracteati, bracteis ovali-obtusatis concavis, stylo latera
 li a medio ad apicem in stigma lineare elongatum papillosum productis. alii bracteis plu
 ribus, stylis minus excentricis, stigmate subrotundo rubro papilloso, ovario pedicellato: alii
 abortientes neutri, bracteis pluribus stipitatis majoribus — dico in honorem et prof. Josephi
 Meneghini scriptis identidem editis de plantarum anatome, et de Algologia universa
 popularissime meriti. — Meneghinia Endl. est Cornubijs sp. Jorsk. et H.

sp. Meneghinia aurantiaca V. — Syn. Ficus caroliniana Herb. an Wall?

Exempl. icon. V. Meneghinia — f. 1. Sectio transversa amphanthi ut congeriantur in parte su
 periore, sectionem squamij variis dein flores variformes mixti, quos intus pilis sparsis — f. 2.
 Floz foemineus semites bi-tribracteatus stylo laterali, stigmate nunc recto, nunc (in icone)
 fructiflexo — f. 3. — Floz foemineus multibracteatus, ovario pedicellato, stylo subterminali
 crassiusculo, stigmate subrotundo — f. 4. Floz neuter gemmiformis e bracteis subrotatis plurimis