

Adnotationes ex flor. Graecae Sibthorpiae et Smithianae

Cent. I. seu Volumen I.

Veronica agrestis var. *byzantina* tab. 8. *capus* variegatus. β . est

Veronica Buxb. Cent. I. tab. 40 f. 2. videtur *Veronica*

Buxbaumii Pers.

Alapenurus angustifolius tab. 64 an idem ac *Phleum acutatum*
Host? *capus* habitum refert. *Pharis* fl. gr. est: *A. spica ovata*

floribus retusis *ovatis* *angulatis* *villosis* *capis* *rugulis* *bracteis* *floribus* *ovatis*
retusis *angustifolius* *Phl. Graec. Sibth. Mus. non All. in Glycypharm.*

Caulis (exicium) *basi* *rigentis* *et* *radicantis* *floribus* *non* *retusis*

Lesleria alba tab. 72 videtur *S. elongata* *speculis* *bracteis* *non* *angulatis*

Cent. II

Salsola *Sibthorpiana* tab. 110. *in* *typo*. θ "Pseudanthus" (*S. bracteata*)

maxime *affinis* *des* *et* *potius* *variata* *diversa*. *Differt* *non* *caule* *non*

minor *floribus* *non* *ovatis* *basi* *pinnatifidis* *typis* *floribus* *majoribus*

et *prope* *floribus* *indis* *integerrimis*. *Botanici* *nullos* *pro* *Sibthorp*

hanc *plantam* *observant* "Eadem est ac nostra *S. multiflora*"

Catagolus *seminis* *inferior* ^{tab. lib. 2} *major* *est* *quam* *in* *nostra*. *Vide* *nunc* *in* *hac*

adnotat. *seminis* *inferior* *interior* *seminis*. *Eadem* *est* *videtur* *ac* *S.*

bracteata *fl. gr. tab. 109* *vive* *Kraussia* *palestina* θ , *non* *folia* *quod*

diversum *variant*, *ut* *videtur* *est* *in* *specimine* *inter* *Salsola* *nostra*

quod *folia* *florum* *integra* *praesent*

Galium *apiculatum* tab. 129. θ *floribus* *seminis* *lanunculatis* *subtripartitis* *und*
incanis (exicium *pulcherrimum*) *pedunculatis* *trichotomis* *floribus* *ovatis* *apiculatis*

Caulis *basi* *fortiter* *et* *radice* *typis*. *Non* *purgans* *viscosus* *tristis*

An *species* *illa* *quam* *pro* *S. aristata* *habui* *ex* *ap. Libanensis*?

Hyoscyami albi var. β . Lin. *ger* *H. albus* Bull. Herb. t. 99. *H. albus vulgaris*
Cus. Hoff. v. 2. 84. *H. albus minor* Baub. Pin. 169. Ger. Em. 354 floribus
omnibus sed sepibus in speciem foliosam substantantem digestis, flibus
floribus minoribus oblongis acutis ut in his dissepit, et forte dicitur
sa species est. p. 25.

Tordylium officinale tab. 267 p. 60-61 omnino idem ac nostrum; in
icone tantum pinnula terminalis florum superiorum brevis est quam
in nostris specimenibus, et in icone Waldeniana.

"*T. apulum* L. ^{Ray:} *cujus* synonymon valde dubium est *T. apulum* mini-
mum Column. Eglis.; ab hac specie certe certis digniscentibus peltis
radiantibus in singulis floribus solitariis, equalibus bilobis (dum in *T. officinale*
duo exstant peltis radiantibus inaequalibus). Huc spectat *T. humile* Desf. "

Optime conveniunt cum specimenibus Dalmaticis icones ~~et~~ *Scandinavicae* auctoris
in tab. 285 et *Statis* *variis* tab. 298 p. 90

Cent. IV.

Nem dicendum de icone *Allii Angelicis* in tab. 312, *A. subhiptis*
in tab. 313, *A. rosei* tab. 314.

Allium ambiguum tab. 327 p. 23 est *A. roseum* β . bulbiferum
Bivon. Sic. Cent. I p. 13. Savi Strusc. Nec in Curtij Meyer.

t. 978. *A. carneum* Santi. *Moly sergentinum* Jac. Lob. Delic.

Postea videtur *A. rosei* a qua differt tantum umbellae pauciflorae laxior,
bulbulis numerosis ovatis acuminatis rubicundis stigmatibus. Ita herbaria
Dalmatica adest sub nomine *A. rosei* var. *bulbiferum*, nec certe differt affinis.

Oenithozalum nanum tab. 333 p. 28 Buxb. Cent. II t. 37 f. 1. videtur *O.*
exserpens Tenore, *refractum* Lit. Vide nam Tenore ubi Buxbaumium.

Quercus chalcopneus tab. 268 p. 61-2 pubis exhibit pindich. ciliat. lobis
litorum subquibus, quorum tamen terminalis aliquantisper longior non latior.

Quercus petraea tab. 269 pubis exhibitus itaque non est *Q. petraea*
L. sed *Picea* quae *Q. hispanica*? DC.

Gypsophila rigida L. W. tab. 382 p. 85 videtur ea quam hactenus ha-
bui pro *G. saxifraga* Salomatia. "*G. folij linearibus planis, calyce bracteato,*
bracteis quaternis aequalibus, caulibus subramosis, petalis emarginatis."
saxifraga L. discrepat bracteis lanceolatis inaequalibus, necnon radice
caerulea, caulibus solitariis ramosisque praecedentibus (ramosis) Speciei
hae paucis bene notis, sed revere distinctissimis. Hae *Tunica minima*
Dalech. 1191 f. 2. "

Biscutella hirsuta Sims Bohn. Mayr. t. 2444. est icon optima ignis
representans nostram *B. dilatata*.

fasc. VII p. 1 tab. 602 bene cum nostra *S. chrysanthemifolia*
Scrophularia bicolor L. fol. bipinnatis angustis, rarem paniculatis, pedun-
 culis multifloris, capsula globosa multica, staminibus exsertis.

ib. p. 4. tab. 605 *Celsia orientalis* optime

ib. p. 5. tab. 606 *Digitalis ferruginea* opt. calyc. margine / ciliis

ib. p. 7. tab. 608 *Oenothera ramosa* opt. sed flores rarij majores

ib. p. 8. tab. 609 *Vitis agnus castus* opt.

ib. p. 9. tab. 610 *Acanthus mollis* p. 9. fol. sinuatis incornibus, caule
 herbaceo erecto. Caul. teris glaber vel tenuiter pubescens. Fol. pinnatifid.
 saturate viridia nitida venosa glaberrima vel margine periculis pube-
 rentia, laciniis subulterioribus acutiusculis, irregulariter incisus aut denti-
 tis, radicalis maxima, cubitalia. Bracteae 3 sub quaque flore, exterior
 ovata concava costata acuta spinosa-dentata floribus aligmentibus hirsuta,
 latioribus duobus linearibus lanceolatis mucronatis spinosis integerrimis calycem
 duplo brevioribus. Calyx subpubescens longitudine corollae, laciniis
 superioribus oblongis apice dentatis, inferioribus cuneatis oblongis apice
 bifidis dentibus spinosis, basi utriusque appendiculis  thomian lobis duplo
 brevioribus p. 9. Videtur differe a nostra longioribus  cui similis, laciniis incisus
 acutis, incisuris ex icone acuminatis Cf. Dory. hyst. 863. Tuck. 52 in fl. p. citatis.

ib. p. 10. f. 611. *A. spinosus* opt. cum illo. Hostii

ib. p. 11. f. 612 *Bunias raphanifolia* Sm. *Megyn orientalis* L. id. nostrum
B. siliculis globosis sulcatis torulosis, glabris, foliis oblongis dentatis
 sinuatis scabris.

ib. p. 15. f. 617 *Lepidium graminifolium* fol. caulibus linearibus integerrimis, cau-
 le ramosisimo floribus hexandris, siliculis ovatis stylo mucronulosis. Sm. ib.
 L. ibi. St. Syst. ex charact. A *Lepida florida* L. p. 9. ed. 1 645 sili-
 culis ovatis tergitis acutis, nec depresso orbiculatis emarginatis, hinc clausis
 Dissectis p. 16. opt. cum nostrum.

ib p. 12 Feb. 69 Californ Conditi. off.

ib. p. 20 hb. 622 *Alyssum campestris* oft. cum ~~arvensi~~. *Poir.*

il. p. 24. hb. 626 *Bosmina olivacea* diff. cauda superioris siliulig olivaceis
subpubescentibus a nigra. b. m. h. h. h.

ib. p. 25 tab. 627 *Vesicaria utriculata* bene cum usque, sed folia ^{occulum} agnoscunt.
etiam ^{omne} pili globi aut pili aliquot ad pili ^{occulum} distinguenda, nec pili stilleti in radi-
culis ut in usque.

il. p. 30 tab. 631 *Cardamine gorcei*. listy pinové, listy petiolaty palomé.
loby obšíř; subguatny. Vidur agna, sed cesty usady vamej
poteny, i my at i maxima Brullie.

cl p. 37 Matthiae nunc h. b. 640 opt.

dp. 38 Anty verna 16. Okt. opt.

8 j 43 Borneo Sumatra no. 691 var. a. silique glabrous pubescent... videtur novum.

Hyosiamus canadensis, *saundersiana*? folij inferioribus cordato-ovatis
 inciso-angularibus pinnatis integris, oblongis; floribus ovatis ellipticis
 subintegris.

Perennis? filifolius. Caulis striatus, teres, pilis albis mollissimis hirsutus
hirsutus. Folia laxa sparsa divaricata solitaria petiolata pilis imbricatis
subtus, pubescentiam canem viridissimam et sublimide translucentem ex
cordatis evadentia ovata, lobulis gradatim obsolescentibus; floribus so-
pilis integerrima acutula, raro gemina, quorum aliorum paulo minorum
subcollocatiter approximationem, namque oppositam. Racemus termi-
natis flexuoso-erectis filifolius, ramis multifloris, alternis distichis;
floris axillaris solitarii erecti, singularem explicandi, brevissime ped-
icellati. Calyx herbaceus luteo-viridis tubuloso-campulatus, multus
pilifolius, segmentis 5 latius patentibus multum longis brevioribus tubo.

Cor. 2. minoribus, subcandida, fixax, stramineo-lutescent, fraccivideae, parum
iniquis, alio latiore calyce; limbo rotato, patente laevius brevibus oblongis
transversis lobis, summi 2 majores. Stamina inclus. distincta. Ger-
men post capsam corollae ex operculo suo indurito umbonato-recurvo
in ore tubi calycini apparet.

Loculis nati 1106 Canarie, introducti recentior. de H. Whitley, Bremen, &
Milne.

The Botanical Register vol III London 1857 p. 180.

videtur ovarium nostrum curvum, sed floris infimis in stigma longius pedicellatis
nec brevissimis, calyx basi trigynus, nec cylindricus vel etiam alipend in eum
attenuatus, villosissimus nec pilosus tantum. Alia ovaria appellata.

Frax natus ib p. 259 12 opt.

Cistis heray H. gr. VI. p. 1. t. 501 similis nostrae albescenti sed floris majores
Delpheum Conkide p. 2. t. 504. opt.

Azara China p. 21. tab. 524 similis nostrae chameaphid. floris majoribus punctatis

— ib p. 22 tab. 525 hinc sed fl. floris

Deurium London p. 23 tab. 532 videtur nostrum = Baccis

— capitatum p. 30 tab. 536 sp. cum foliis rubris asini

Laminia fructum p. 46 tab. 557 videtur L. bifida

Prochys uncinata p. 47 tab. 558 an salicifolia?

— orientalis p. 48 t. 560 nostrae Baccis

Thymus Lygii p. 50 t. 574 diversus = baccosus ^{confertissimus} densius calycibus subulatis elong-
atis, brevibus ex ovis trifloris, filis dispositis angustius subglobulis
— ignavus p. 61 tab. 576 diversus ovarium = stigma longius longius

Anothera amplex p. W. 8 p. 855 Col. Euphr. p. 300 f. 1. M. gr. 47 p. 32
p. 590 an simplex? Calyx plato-viridis in diminutione, globus in ovis.

— platanus p. 32 p. 591. opt.

