

Memoria circa una nuova specie di
Calonyction, ed osservazioni sul fasc. 1.
della 2^a ed. della Flora della Sicilia del 1779.
1802.

La memoria cui si è unita la figura di questa
dalla figura dell'autore Seefeld Billard,
si divide in tre parti.

La prima (primitiva) si fa cenno della
origine della pianta della sua fasc. di Seefeld
della sua coltivazione ec.

La seconda (critica) si parla dei dubbi
sulla sua classificazione adducendone i motivi,
della ragione per cui l'St. caducata di Adonard
il genero Calonyction proposto dal Prof. Billard
distingue nella sua nomenclatura grandibulosa
iniziale, della sua specie di Vincetoxicum (conoscibile
in) come quella quella pianta ha
maggiore affinità, della comunicazione che
ebbe in proposito il St. caducata del St. profuso,
e si concluda potersi deponere
allo stato attuale della ricerca come una
pianta nuova.

La terza (descrittiva) l'St. dicandus
nella più minuta descrizione di tutte le
parti della sua pianta, riferendosi al luogo
e luogo alla sua ascensione figura
ed esamina la mensura della diaspira ed
osservazioni del suo genero e specie. Quanto
al genero l'St. caducata ~~modifica~~
leggera modificazione addotta la definizione
data dal Choriz.

È inteso per la nuova specie Calonyction
macranthum formandone il nome ^{specie} sulla
considerazione della grandezza, e colore del
flore, della quale specie è presentata la seguente

frase

- (fructuorum; glaberrimum; foliis
petiolatis, acuminatis, cordatis lobis rotundatis
discrepantibus; pedunculis subtrifloris, pedicellis
bracteolis 2. caducis suffultis; calycibus corollae
subconnatis, laciniis erectis velicatis-acuminatis;
corollae; corollae maximae tubo cylindrico,
limbi lobis rotundatis, stigmatibus lobis rotundatis
discrepantibus

Segundo con distinción de persepolis: el primer
vulgo se refiere a diffusa (frase) speciosa graciosa
afine del caso de C. grandiflorum choisi, es
Convolvulus grandiflorus Le fil., es la forma distinta
Turca Schlecht., la segunda sul aspectu specioso,
las formas vulgo emendadas choisi persepolis fieri
allos discrepantes actualis de specie
insurgendo de modo del Prof. Choisy, choisi.

1. C. speciosum choisi. = C. laciniis
calycinis erectatis (Ipomaea Bonal Rox. L.)
Hab: Ind: orient.

2. C. aspectum choisi: = C. laciniis calycinis
inequalibus brevis acuminatis (Convolvulus
aspect Walt.) Hab: Ind: orient. Silet.

3. C. trichospermum choisi: = C. laciniis
calycinis inequalibus obtusissimis (Ipomaea
trichosperma Blechn.) Hab: Ind: orient.

4. C. grandiflorum choisi: = C. laciniis
calycinis inequalibus, exterioribus longioribus
acutis, interioribus obtusis (Convolvulus
grandiflorus Sacq.) Hab: in América

5. C. macroanthotheca (Cotta) & C.
laciniis calycini subinaequalibus erectis
spice declinata-accuminatis, corolla maxime
tubo cylindrico, lobis rotundatis & stob. in max. ca.

Species Dubiae

6. C. Rheedii Cotta = C. laciniis calycini
subinaequalibus erectis antennis cuspidatis,
corollae maxime tubo subcylindrico, lobis
cuspidatis (Munda-Valli Rheed. Consolida
grandiflora L. non Jacq. Calonyction specifum
var. pubescens Choisy: in lit. | Hab. Chalcid. Chalcid.
Species forsan excludenda.

7. C. Taba Cotta. C. laciniis calycini
subinaequalibus mucronatis, corolla maxime
tubo cylindrico limbo infundibuliformi,
periclyptis inclusis. an istius alius generis?
(Consolida Taba) Schlecht. Calonyction
grandiflorum var. Choisy: in lit. Tabitans)
Hab. ins. S. Thomas J.

Extrait d'un manuscrit de
M. J. J. J.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]