

Micetologia

sla

Micotologia

o sia

Estratto dell' Opere principali sì antiche che moderne
trattanti dei Funghi.

preceduto da una Biblioteca Micotologica

Padova

1822

Micetologia
ossia

Dottrine relative alla Famiglia dei
Funghi

Padosa
1822.

« Le genre de plantes doit piquer notre curiosité
— par ses singularités, ses caractères particuliers,
et par la promptitude extraordinaire avec laquelle
il végète. Il est d'autant plus intéressant de
savoir bien distinguer les espèces, que plusieurs
sont utiles dans les Arts, et dans la Médecine.
Les autres espèces — sont ou des poisons très-actifs,
ou suspects, quoique agréables à manger. »

Valmont-Bornari.

Unicum signum certum dati veneni est notitia botanica
dati veneni vegetabilis, et interium chemicum dati
veneni mineralis.

Plench. Toxicolog.

Caj. Plinii Secundi historię mundi libri XXXVII. Froben. Basileę

MDXLIX.

p. 269. lin. 48. Galliarum glandiferę, arbores agaricum ferunt. Est autem
fungus candidus, odoratus, antidotis efficax, in summis arboribus ne-
scens, nocte relucens. Signum hoc ejus, quo in tenebris decerpitur.

? p. 309 lin. 54. Olea --- clavum etiam patitur, sive fungem glauci, dicit,
vel patellam. Hęc est solis exustio.

p. 504-25 Salutares (raphani) et contra fungorum aut hyoscyami verum
ęque, ut Nicander tradit.

p. 548. 31. - - vel maximum est aliquid nasci, aut uivere sine ulla radice.
Tubum hęc vocant undique terra circumdata, nullique fibris mixta,
aut saltem capillamentis, nec utique exhiberunt loco in quo gi-
gnuntur, aut vimis agente, neque ipsa terre coherere. Cortices etiam
includuntur ut plane nec terram esse possumus dicere, nec aliquid
quam terre callum. - - Duo eorum genera, harenosa dentibus
inimica, et altera squamata. Distinguuntur et colore, rufis nigres,
et intus candido, laudatissima Africa. Crescant, an ne vitium id
terre (neque enim aliud intelligi potest) ea protinus globetur magni-
tudine, qua futurum est: et vivens, an non, haud facile arbitror
intelligi posse. Putrescenti enim vitiis communis est, ut cum ligno. La-
tis Licinio proterio visum reddunt in Hispania Carthagine, paucis

- his annis sumus audire mordenti tuber, ut depahensuf intus denotius
 primo dentes inflectent. Quo manifestum erit, tunc naturam in se
 globari: quod certum est ex iis que narrantur, et sen non ponunt.
- p. 366-19. (de poma edis) Estur vero et contra fungorum veneni, imposter et
 vulneribus.
- p. 369-36. Apollodorus adversus fungorum veneni veneni aut succum (Bryxi)
 blendum cernit.
- p. 370-20. Semen ejus (Bryxi, glysteri) testem auxiliatur contra serpentes,
 fungorumque veneni, tum sanguinem.
- p. 373-25. Item (contra) fungos (vel viti) live in pota detur five in cibo.
- p. 382-31. (Nigris) fungorum veneni cernit.
- p. 392-40. Lili videtur multum modis florem suum nobilitare contra fogen
 tum i etus ex vino pota, et contra fungorum veneni.
- p. 402-48. (Cuius vivo abradit) magnum contra venenata animalia probat
 auxilium, item adversus fungos.
- p. 406-21. Semen ejus (urbi) citius cernitur esse. Nauder affirmat. Item
 fungis.
- p. 414-4. (Mell) et contra veneni fungorum.
- p. 423-28. Merum quidem remedium est contra - fungos.
- p. 430-12. Ispa (pura) adversatur boletis atque fungis, pelluntque podore, et
 fragante juce.
- 15. Bironum ligni cinis contra fungos etiamnum efficacius proficit.
- p. 434-22. Semen ejus (Myrti, etus) ... contra fungos in vino potum.
- 35. Folii ipsa (Myrti, etus) fungis adversatur trita ac vino.
- p. 463-4. Chironium. Hoc et contra fungos.
- p. 489-10. (Abinthium) adversatur fungis ex aceto

- p. 533-47. Gallinorum firmum ventosum calidum, in hygroscitum,
 aut multo, veneni fungorum boletorumque adversatur.
- p. 563-36. Succum (viti) et veneni fungorum ex pota potum, aut
 si hypresit pota fit, ex aqua: vomitioneque cernit.
- p. 412-37. Fungorum lentior natura et venenosa generis, sed origo non nisi
 ex spiritibus arborum. Ditiissimi qui rubent callo, minus dilecti rubore
 quam boletis. Nunc candidi velut apices flammis insignibus pediculis.
 Tertium genus scilli, veneni accommodatissimum. Familias nuper
 intervenit, et tota cernitur, Annecum Serenum profectionem Ne
 voris vigilum et tribunus, et centuriones. Quae voluptas tantis
 anapitibus cernit? Quidam si forem arborum generibus, fice, fenile,
 et g unni ferantibus: nos, item fego, aut vitan, aut cyprose ...
- Sed ista quis spondet in venalibus? Omnium colos lividus. Hic adven
 veneni argumentum, quo similiter fuerit arborum fice ... Item
 cis stomacho utiles sunt boletis. Siccatum pendentes scilli
 junce transfixi, qualis et Bithynia veniunt. Hi fluxionibus ali
 quos rheumatismis locant medentur, exarsuendibusque in fide
 cernitur: minuit enim eas, et tempore asperunt. Item len
 tignus, et mulionum viti in facie. Lavatur etiam ut flammam
 in oculorum medicamentum. Sordidus ulceribus, et capitis erythrosis
 carum moribus ex aqua illinuntur. Libet et coquendi den
 aliquos communis in omni eo genere observamus, quando ipse

seis manibus delicias porrigunt hunc cibum solum, et cogitatione autem
 insistent, succinae varuulæ, aut argenteæ apparentes conitantes. No:
 xii erunt fungi, qui in coquendo denarij fiunt: immo undecim qui inter
 addito coquantur, si utique persequantur. Ditiones fiunt cum carne coctæ,
 aut cum pediculo piri. Pro sunt et piri confestim sumpti. Debellat
 coq et aceti natura contraria. lib. 6.

p. 412. 17. Inter ea quæ tenere manducantur, boletos merito posuerim, qui
 mi quidem hoc cibi, sed immenso exergulo in crimen adducto, veni-
 re Tiburio Claudio principi per hanc occasum a conjuge Agrippina
 dato: quæ facta illa temis venenorum alterum, idemque ante omnia
 Neronem suum dedit. Quorumdam ex his facile nomen
 veneni, dilute rubore, rancido aspectu, livido intus colore, rimosa
 stria, pallide per ambitum labo. Non sunt hæc in quibusdam
 siuigui et nitri similes, veluti guttas in vertice albi ex tunica
 sua gerunt. Volvam enim terra ab hac prius gignit, ipsam
 postea in voluere cum in ovo est luteum. Nec tenuis minorque
 in cibo infantij bolus. Quæpietur hoc primo nascente,
 mox in pediculo corpus assumitur, varoque inquam genio ex
 uno pede. Origo prima causaque ex limo, et aërente puer
 madentis terræ, aut indiciis fœcis glandifera; iniquis spum-
 lentis, dein corpus membranis simile, mox partes. Ut diximus,

illo perniciosa potus improbanda. Si enim caligariis clavis fenore ali-
 qua rubigo, aut pauci mares affuerint rapti, omnem illic pecuniam
 alienum sagorumque in venenum coniecit: repandendique nisi
 opus est posunt, aliqui qui colligunt. Dicunt ipsi alia vitæ nunc
 quidem si videri caveona justis fuerit, si patensque primo et huius
 vint, capax venenorum cogitatione d'rim accipiendum. Itaque
 cavere conveniet, prius quam se condant serpentes. Agnoscere ho-
 lile, tot ab omni fortissimum, ab omni enim eorum ad latibulum usque
 venantur: et vel fœcini tantum folia, nec postea nascentia, nec ante
 deidentia. Et bolus quidem ostis occasione omni inter dies
 septem est. l. 35.

p. 269. 38. ... penitus vobis ... et bolus sicutique gub. nuptiis imi-
 menta quæ una dies gignuntur. Quævis probatissime, robore autem,
 et cyprosus, et pinguis, vixis

p. 462. 34. Agnoscere ut fungus nasitur in arbore circa Paphlagoniam, colore
 re candido. Datur oboli quatuor contitum cum binis cyathis nec
 multo. Id quod in Gallia nasitur infirmis habetur. Proterea my-
 spisios amarique. Hæc et cepiis vobis fuit. Fœmina solutis,
 initio gustu dulcis, mox in amaritudinem transibit. l. 38.

p. 412. 19. vitæ (Stomachi) anast... agnoscere manducatum sicutum, ut
 ex interalle morum solbeat.

— 24. — Stomacho et dyspepsia videtur... Aristoteles in agnoscere, oboli tenuis
 ex aqua calida, aut lacte asini pota.

p. 472. 27. Sanguinem quoque exuentibus subuenit agarium, utroque
podere triplum, et in mulsi V cyathis satum.

— 44. Venibus potest ... agarium potum, ut in tussi.

p. 473. 14. Ichthyas dolores, et pene leues agarium potum, ut in tussi.

p. 475. 9. Agarium potum oboli tribus in vini veteris cyathis uno, leni melle.

p. — 21. Agarium cum farina frugosae, vesicae malis, contropae calidulis, gro-
visumis emunctibus, ut diximus, auxilium est. Ptolemaei ex uno potu. I.
ten agarium.

p. 477. 21. genitalibus melleis ... agarium oboli tribus in vini veteris cyathis
uno.

— 24. Agario quidem et nervus qui platys appellatur, et humerorum dolor
sanatur, oboli tribus in vini veteris cyathis uno potu.

p. 479. 22. Satus ... phthisis ... agarium potum duobus obolis in posco.

33. Comitiales sanant ... agarium oboli tribus.

42. Febres frigidas leviores facit agarium potum in calida aqua.

p. 480. 10. hydropicos sanat ... agarium.

38. Morbus vesicae ... inguatur ... agarii oboli tribus ex vini veteris cyathis.

p. 481. 49. Nephritis convulsisque ex alto defectu ... agarium. Item cataplasma et coctum
potum duobus obolis in mulsi cyathis tribus, aut si febris sit, in aqua multa.

p. 483. 30. Strangulatum ... mensuramque difficultatem agarium tribus obolis in vini
veteris cyathis potum emendat.

48. Menes liet ... agarium ex aqua multa.

(40)
Theophrasti Eresii Graecae et Latinae opera omnia. Daniel Heinsius.
Lugduni Batavorum ex Typographia Henr. ab Heslen
- 1613.

Cap. IX. Lt. radice penitus caret. - tuber, fungus, omnium.

Lib. IV. Cap. VIII. Cum autem aquae plures inceperint, fungi iuxta morem
quodam in locis erumpunt, qui sole tacti in lapidibus commutantur.
2d. - Cap. XVI. Plea... clareum patitur. Quidam fungum appellant, alii
tam hoc est veluti stis causti.

L. III. Cap. IX. Fungi... e radicibus (roborem) et iuxta radices erumpunt:
communes... eos uero estis habent arboribus.

L. IX. Cap. X. Fungus terre radice ad exhalationis inflammationem uelut,
et ad menstruum, et ad ulcra ex melle. Vnus ad caput per
gradum illius, et ad ebrietatem, si ferum in vino potui
des. Radix etiam ad postum celebrationis agens brevis
est, et ad amorem. Cum eam suffecerint, vires deinde sub
gunt, inque pusillus digerunt, sicut feris vini, quae ma
culae abstergentur.

(41)
Dei dyconsi di M. Pietro Andrea Mattioli ce nelli sei libri di Pedaccio
Dioscoride Anazarbeo della Materia Medica. In Venezia 1604
apud Bartholomaeum de gli Alberti.

Lib. IV. Cap. LXXXV. Sono i funghi di due specie, cioè buoni da mangiarli, e
mortiferi. Le cause perche nascono uelenosi sono molte, cioè quando nascono
ove sono sotto chiavi di ferro rugginosi, o panni freidi, o che sieno appresso
qualche auerua di serpenti, o in sugli alberi, che producono i frutti loro ueleni
uoli e mortiferi. Quelli che sono tali, hanno sopra d'loro una carta infusa
mellichiosa, e subito, che sono risolti di terra, si putrefanno, e s'infreddano
no. Quelli che non sono uelenosi, sono nel cibo aggradeuoli e soaci, come
che mangiati copiosamente uociano, e strangolino, quando non si usano
digerire, e generano qual morbo che si chiama cholera. Al che si rimedia
beuendo del uino, ouero della liscia con salammia austera, ouero della de
cozione di fatureia, ouero d'origano, spague parimente il lor ueleno lo
sterno del gallo beuuto con aceto, ouero lambendolo incorporato con mel
to melle. Nutrifano, ma malegeramente si digeriscono, ed impero per la
piu parte se n'essono interi per di sotto, insieme coll'altre superfluita
dei cibi. Digli. trad.

Lib. VI. Cap. XXIII. Nuociono i funghi o per esser naturalmente uelenosi, oueramente
per mangiarne troppi, uandano tutti strangolano ferendo il fegato, come fo
golano i laui gli appiccati. Al che si dee comunemente gouernare, e per uome
tarsi i pazienti con dar loro a bere dell'olio, ouero della liscia fatta con
uino di formica di uiti, ouero di uino di peso salustico con sale aceto
ineguale uino. Leuano in tutte le malignita, che hanno i funghi d'fegato
gloro, la peso salustico, e parimente le fonde dell'albero loro cotte insieme
con olio, e l'indifano fanno lo stesso per scorbuto mangiato nei cibi

insieme con essi loro. Giovanni la uera della gallina, bevuta con aceto inaequale
insieme con una dramma d'anisolechia nitida, l'aspenza mescolata col vino, e
col mele, e bevuta col'acqua, la melissa col vino, la radice della panacea be-
vuta con vino, la fecia del vino abbruciata posta con l'acqua, il vch'ole be-
to col'aceto, e le radici, o la senape, o il nasfrugo nei cibi. Dicoe trad.

Lib. III. Cap. I. Lo Agnisco si dice esser una radice simile al laseris, ma nelle parti
sue superficiali più solide più rare, e per tutto fungosa. Ritrouuasi di due
specie, maschio cioè, e femmina. prece di bontà la femmina, che ha den-
tro di se le vene dritte. Il maschio è tutto involto in se stesso, nitido, e
seruato. Amendue nel primo gusto son dolci, ma amari come si spargono
per la bocca. Nasce in quella regione di Samaria, che si chiama Agnisco.
Dicoe alcuni esser l'agnisco radice d'una pianta, ed altri generarsi d'essa
putredine nei tronchi degli alberi nel modo che vi si generano i funghi.
Nasce in Galatia d'Asia, ed in Cilicia nei monti, ma fragile e senza forma.
Ha l'agnisco uirtù cōseruatiua e calida. È buono ai dolori della bontà,
agli umori crudi, ai rotti, e al loro, che causano dall'alto. Dassi nella
febra con acqua melata, e non non sia febbrile con vino melato al peso
di due oboli. Dapene utilmente una dramma ai fegatisti, agli infetti
di petto, a tribocco di fiele, a mal di reni, alla distentia, e a prouocar
l'urina ritenuta, uale ancora alla profocazione della medina, e a coloro
che sono schoriti e pallidi. Dassi ai tifici con vino pesto, e a' distetti di
miglior con aceto melato. Dassi cōseruato sopra l'altro liquore a chi vomita il
silo più debilita di stomaco, e agli acidi rotti. Bevuto con acqua al peso
di tre oboli respinge gli spiriti di sangue. Datto con aceto melato al male.

uno peso conferisua alle sciortiche, al mal caduce, e a' dolori di giuntura,
prouoca i mestrua, e uale alla ventosità della medina, leua dato il tremore,
e il freddo, che viene nel principio delle febbrili. Beuuto il peso d'una
dramma, ouero di due con acqua melata, purga il corpo, tollera una donna
con vino inaequale conferisce ai ueleni. Souuon grandemente al morso, e
allo punctura di' serpenti bevuto con vino al peso di tre oboli. La forma
è conueniente l'agnisco a tutti i mali della interior, dato secondo l'età,
e la forza degli uomini a chi con acqua, a chi con vino, a chi con aceto
melato, a chi con acqua melata. Dicoe trad.

Lib. VI. Cap. XXXIII. L'agnisco nero ... non solo alle volte franghi i pagient, ma lo
purga il corpo molto più del diuino. So com'è adunque uale frangere loro, che
alle volte sia con tutta quella cosa, che si conuengono ai funghi melafichici,
e quando superfluo purga in si risona con quella medina, che ristagna
il corpo. Dicoe trad.

(65)
 Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle par M.
 Valmont-Bomare. A Lyon chez Bruyset Ferey. 1791.

^{D. S. Lichen Charignon}
 Il genere di piante con cui i funghi hanno più rassomiglianza sono
 secondo le osservazioni di Sofficius quei licheni, d' cui s' ha un fusto
 che cresce nelle Canarie, e ne' paesi del Nord, e d' cui s' ha un fusto
 alto nella tundra sotto il nome di Oricello (Oricella) (Lichen
 genus polygordis, Rhetony, saccat. L. Tournef. Car. 40, spina fust. brev.
 mesius tondus L. Baub. et Tournef. Guss. R. L. Herb.) Sono raso-
 mifera ancora per esser più di rami, tronchi, radici, e fogli, per un
 suo e multiplo sopra tronchi d'alberi, e legni impastati &c., per la
 frondezza con cui crescono, e per la piccolezza che la maggior parte di
 essi ha a d' esser così, e a riguardar poi la loro forma naturale sopra
 chi s'iene immessi nell'acqua. Rinalmente fra gli uni e gli altri
 s' ha anche un uniforme nel governo i loro fusti, e questa anche
 somma è una prova d' una della natura vegetabile loro contrapposta a
 questi esseri. Micheli nel 1729 ne separa i fusti e i rami, e ciò
 imparò sopra Gleditsch nel 1753, e Batem nel 1755. Desf.
 può crederci che ciò che Micheli prende per fusti sembra ora
 esser che germogli sotto forma d' glomeri, specialmente nei Licheni.
 Si possono dividere in 2. classi, alcuni nella prima quelli che sono fusti.

più pieno de' suoi vasi hauri, e che al contrario s'ha pernicioli più
 li ha troppo sottili sopra terra, che s'ha di viti bianchi, nerofri, o rossi
 e il di cui spirito è spissato; il cui gualtore più d'acqua, e
 la sua ad'aria cambia che di tratto in tratto, il qual che
 per lo più appare o più languido o più inteso.

Si veda che l'aden d'aluni funghi abbia prodotta una specie di
 cystopii, e che una femmina sia caduta in una malattia, che de-
 gnerà in peggio. Sembra che l'offesa dei funghi s'ogni inestinguibile
 prodotta da qualche anni e qualche. Benè d'ogni. L'anno nel
 l'acqua, e meglio nell'aceto. Necker fu di pinguin; bene dei
 alberi inferiori di quindici uggia sopra spogliata della sua pellicola
 spissa, e incalca infuocata i funghi. L'efe di una aguzzata
 o, o un buon viaggiante è nativo il luogo; se l'acqua an-
 cora che il luogo è buono.

Deggiasi evitare le Amentis di sego di pesce, sanguigna, lattiginosa,
 rose, molli, glutinosi.

Si vanti' contro tali emolumenti per più gli emetici, e marcanti
 di quelli si sia sopra del sol marino nell'acqua tepida, e ^{de} per la notte,
 giacchè s'ha di sopra in quella maniera il luogo, invita la stanchezza di cuore
 il vomito. Si s'usa i minatori, i sagoraci, gli addolcenti, come il
 latte, e i carbolici emollienti per di più la parte all'effluo.

M. Bourgeois piglia le grandi di vipera di ofio, di testa di indici,
 e semi multigrosi, gelatina di cane di corvo, e d'avorio, stagioni
 di gomma arabica, e digiuna nell'acqua di rosa di p' anacardi.
 gli emetici, e i laxativi d'oli.

M. Neri a visita a l'Hotel-Dieu di pinioli, funghi pieni, e l'ha-
 cisti sopra fusa liquida d'opiente, e applicata ai vanti sotto
 viti. M. Lemery operò la stessa femmina. Si videro anche dei
 funghi c'osari in 24 ore e acquistar la grossezza d'un dito sopra
 fuselli con cui s'andavano legando d'un funicello molle, e
 sopra la quale si strizzavano delle fonde.

M. de Foyeroux comunicò all'Accademia della scienza l'operazione
 d'un fungo che era attaccato ad un altro pel suo capello, e aveva lo spirito
 libero, all'aria che s'andava non esser mai stato attaccato all'altro,
 e ad altri corpi. Ciò ha luogo a credere, che i funghi di funghi
 spesso e spesso a pinioli possono esser facilmente trasportati
 in un corpo, e che nascono in quei luoghi o in buono succo e calore
 adatti a farli svilupparsi. Così l'Al. spiga e il nasco di funghi della
 (rosa, e del l'anno unumum (braga) della viti del l'acqua di pinioli,
 e d'altri funghi degli alberi, viti e tronchi.

La Crina di Phallus palmarum s'usa come epistemon. Il nome si piglia
 nella sua storia, e Neoma lo chiamano abbi degli altri gualtore bianchi.

L'ly. taminifol di Schaeffer, *A. nectas*, *bulbosus*, *serpens*, & *au-*
tumnalis g. sono perniciossissimi, così anche l'*Aconitum napellus*
Pers. & *Bolton* fung. fig. 2^a fig. 4^a, e si piglia l'*ly-*
theigalus & i generi più ficari sono la *Helvella*, *Aurora*,
Hydria, *Boletus*, *Meatilis*, *Agarici*, *Gymnopus*, *Tuber*, *Phol-*
li (o piuttosto *Morchella* di Persoon) i quali si entrano
 ti i funghi di color bianco od opaco (porcini) come soggetti.
 I *Boletus* agli *Agarici* formano il più gran numero delle
 specie noivie; soprattutto nei loro *hymenium*, o *pyli* etc, o più
Lactaria fornite d'un collare (annulatus) o d'una *Ulna*, e
 quelle il d'una sua divisa *Ulna*, o vera *Ulna*, sono felici,
 così per guasta a sapor di pice. I *Ulna* funghi sono più da
 usi che i giovani. I *lactarij* sono venefici, così anche le
 specie di *Morchella*, *Boletus*, *Coprinus*, *Myces*, ed *Boletus*
 di Persoon, finalmente tutte le amanite, soprattutto le
 più striche.

Boletus lanig L. *Agarici hirs.* *Boletus pinguis* Lef.

Cresce in Oria sul *Larix*, e fiabile leggier. Contiene una
 resina portichien d'acore 10/207^{mi}, un acido libero, una

matena fungosa, e dell'essenza, e di *resina* di *potato*, e di *calce* del
 marate di *potato*, una matena animale, dei *fosfori* d'acido, e
 di *ferro*, secondo *Bouillon-Lagrange*. È un fungo drogatico.
 Tutti i funghi sono più o meno sospetti, come alimenti.

Boletus ungulatus Bull. & Decand. *B. ignarius* L. *Ama-*
reus di *frampi*. Diverso, rimarchevole col *botello* sereno per am-
 stam l'immortale. Contiene poco o poco gli *stofi* pinnati del
B. lanig. Indente d'una *soluzione* di *nitro*, e di *peccato* per
 fuoco finalmente. Nel *B. pseudo-ignarius* esiste un acido
 portichien detto *boletico*. Il *Lycopodium brispa* L. che
 suo *polvere* seminale abbondante, e *stipitum* più sereno
 in *Medicina* agli *stofi* usi del *B. ignarius*. I funghi contin-
 gono una *fibra* portichien *opio* le *fungine* secondo *Dracena*,
 soprattutto il *Lycopodium brispa*, e del *fungato* di *potato*.

Peziza auricular L. *Sillen*. Cresce sopra il *Sambucus* cina-
 rius coriacea. S'impiega macinata nel latte, o nell'aceto per
 guerguere nell'argina, e althimali di *gola*. Contiene anche
 della *fungina*, una specie d'*adiposum*, la *pezizadrena* contiene
 un acido fungico.

Lycopodium Tuber L. Che nasce di bianchi d'un *dos* d'*aglio*.
 Sono forse più usati. Alimento a *sporofico*, e *calore*, indi
gola, così gli altri funghi commestibili. Devono un *aroma*

fugax, dell' ammoniac, dell' albumine, del fosforo d' calcare
secondo Boissellon-Lagrange. Ann. chim. t. 46. p. 191. E
sopra il Tuber cibarium Lef. T. galeiforme Bull. Il
T. muschatum, e T. album sono stati trovati nel meff, o d.
della Francia -

po. 457. I Funghi - Benchè molte specie presentino un alimen-
to riccatissimo dagli antilichi - benchè i moderni non
amino meno questi alimenti, pure non vi sono ^{molte} funghi
salubri che fra i generi Phellus, Tuber, e alcuni Heli-
velles, Clavaria, Hydria, Agarici, Monilia, Sclerotia. Gli
è soprattutto l' incenso, ossia le parti seminiferi dei funghi,
che sono le più funeste. I Sclerotia crinici, o secherossi, que-
li il cui stipe porta un chetlo, quelli che hanno un
sapore di pepe, e d' un color rosso rosso o blu sono
pericolosi. I velles sono più da temere che i giovani. Gli
agarici lattiginosi, i coprini le cui foglie d' incenso non
e quasi un' ossa fangosa, e molti altri sono funesti.
come le rotule, le rupule, le omphalici o a capello co-
cavo, le mycetes, le corinziari. Tra gli agarici che sono

da una storia, o le amanite si trovano dei veleni orribili
vicini alla specie più aggradevole come l' orange ^(Ag. coarctatus) passo i falsi
orange coi funghi, o A. muscaria il cui capello d' un rosso bruno
è aperto di felticina bianca, bruni della sua storia, i quali non
s' osservano punto nel vero Orange (V. l'essai sur les propriétés
médicales des plantes par M. Delandelle. Paris 1816 in
8. famiglia 149). Il principio che sembra essere il più funesto
nei funghi è la materia grassa, od oleosa, che vi si trova, secondo
i Alf. Vauquelin, e Broussonet.

Secondo M. Baudet, i funghi che crescono all' ombra, e nei luoghi
paludosi, o umidi, che sono di una tessitura floscia, e come gelata,
con un aspetto nerastro o scurito, che sono lordi, d' un o d' un
nauseante, rosso o bruno spesso rigati come catini. Altri fi-
manifestano una colorazione violacea, e quando si spezzano presen-
tano l' insipida grinzosa di colore, o sono circondati d' una velen-
e sono più rossi da inghiottire, che li hanno abbondanti e tutti
questi indizj sono egualmente sospetti.

Tra le specie più deleterie contansi gli orange acides, bianchi, giallastri,
o verdi di Baudet, quelli che s' hanno nome come di Malta, gli Agarici
hector, crinici, fragili, e le loro varietà androsceus, e amblyopus

(benchi i fungi ne mangino senza picciole, secondo Pliny,
Ugagis tome 1. p. 281) gli A. bulbosus (il verum è anche
maritimus) sanguineus, pyrogalus, aurif, hypogaeus, campestris,
piperatus che molto ama, il volucrius, separatus, pinetis,
rius, campanulatus, lactifluis, strigularis, viridis,
laevis, terminosus, acuminis, il grand montardes, il
blanc d'ivry, la tête de Méduse, il Mercurius Cantabrigiae,
 l'annulatus, petulus & Levillant (V. anche Bullius)
 il phallus impudens a odor fetido.

Molti di questi fungi sono tanto più d'uso che quan-
 to che non cominciano ad agire che dopo circa 12 ore, un
 l'orango verde, la lique, di maniera che essendo pos-
 ti negli intestini, ogni alla seconda digestione, non si so-
 lone per rigettare per vomito.

Si raccomanda l'etero spogliato contro il veleno di fungi,
 dopo aver liberato, per quanto si può, la via della digestione
 cogli emetici.

p. 424. I Greci ed i Romani facevano gran uso di testiculi
 (testis intra) che ingrossano specialmente dopo il pubertate e

i fungi. Quelli d'Aspin, & Libia erano i più soavi. Ma i belli,
 o fungi erano troppo stomacali, secondo Margiati. Per procurare
 il prurito della perie ne dove, si usavano anche testis singli, o
aromatico. Giornale dei sat. V.

Umbro anipit fungi parentis aromati
Polus domino.

Galeno parla d'altra perie poco conosciuta come la perie Amantia,
Myces, pyrex etc. Oppure i principali fungi impiegati per
 l'uso della terza sono l'Ag. campestris, edulis, cantabrigiae,
Amoucoron, violaceus, brumlingae, Georgii in Francia, la
Umbro concoloris, e perigaea; il Phallus esculentus, e mitis,
 il Dubus abundans etc.

L'A. paragona la volta per le sue pieghe ai costoloni del fono.

Sembra che l'effluvio dell'umido sia lo stesso di quello dell'aria infusa per sé.
Le lamelle sono i ricettacoli di fiori e di semi degli organi, ed i fiori dei
Dolei.

Il fango sembra all'A. come una pianta a fiori aggragati, ma fiori in parte,
cioè modo di fiori, cioè una classe di vegetabili, di cui alcuni generi o specie
sono detti di un costolone insieme in grande e a fiorire, chiamano il
ricettacolo capofito, ossia che gestisce la sua base al cielo, e porta i suoi
fiori verso terra tenendoli della loro difesa con quella forza di lui parte, che
è una pianta che attiene immediatamente allo stesso.

Per un confronto fra i costoloni d'una pianta aggragata, o compatta e quella che
fange del qual risultato che essi convergono nel ricettacolo la cui lamina
forma capofito: o come albitraria calce spargibile, o come albitraria di
un altro tipo di quel il proprio è ingrossata della lamella o dei fiori il comune dell'umido
quello gestisce la sua forma nel ricettacolo di parecchi fiori compatti; di
risorse nei costoloni che sono due nella prima aggragata, ed al più una
nella seconda e quindi capofito per la volta, nella volta che in
cui fango è ingrossata della base della volta o della Skipta, nella volta
che è estremamente rimpia. e così fogliosa, per che il fango avvicina
alle piante basse, di cui nella divisione parzialmente, come i fangi,
sono senza foglie; nella volta a sua parte fiorire i fiori, nei fiori misti
"La differenza più visibile di questi costoloni sembra in un rispetto

che il fango tende a bruciare della sua parte visibile, nella medesima
parte immediatamente tutte le parti che lo ingrossano, mentre
gli organi degli altri vegetabili sembrano promossi successivamente
gli uni dopo gli altri; alcuni propriamente parlando essi presipiti
non già nella forma, e non possono che sottoporsi.

Per all'A. che i fangi si debbono distinguere anche secondo la forma
del loro capello o stipe, e secondo il loro altro parte troppo visibile; e di
fiorire costoloni in segretamente in origine della menzogna, o per
senza della volta e dell'anello, umido della figura di proiezione della
lamella per cui questi organi spargibili o quasi spargibili.

In seguito l'A. espone la maniera d'aggragarsi dei fangi, e per ciò viene la
tutti aggragati nella stessa maniera, solo un fangi o in un fangi quasi
di vegetazione, e secondo i diversi termini in cui vengono. Rispetto alla
prima viene, l'A. pensa che se anche i fangi abbiano i ricettacoli in
indichi non sono eguali in tutte le specie di fangi, e cioè la figura della
divisione del loro stipe, e ragion, di loro foglie in spigoli, in insipidi, in
cappi, in difese, ed in alcuni, e degli effetti che producono ingrossati.
Rispetto alla seconda l'A. pensa che la loro ingrossatura segue la loro
che una anima della volta prima p.e. del fango del fango, che genera
e spargibile in insipidi, ingrossando di nuovo cappi, mentre alcuni fiori
non solo non ingrossano e corrono, e come anche della aggr.

tuberosus e *muscus* N. Bull. & *subpharynx* Bull. & *conjugum*
 Ajuntò all' influenza del feto l' A. & *opuntia* *prol* *ma* *pro* *pro* *pro*
 il fango ulcers, accenti del mangenerio; e più che di effe
 in questa fiamma quasi indipendentemente dal solo una del corpo
 più di ogni da fono i feto senza qui materiali immediati;
 che uno porge l' una delle specie.

Confirma però l'opinione che i fangi congegn il veleno della foga
 (V. Plin. e Dioscor.) al veleno, giacché questa sanza insona al
 l'uomo sano e senza lesione interna con l' il veleno della foga non
 introdotta nel sangue, e l'ultima gli offe il veleno di fangi un
 contrapposto a quello di veleno della foga.

I cantini per di più i fangi ulcersi sono *botanici*, *chimici*,
 e per *indigeni*. I primi sono forse gli unici che offrono di
 tutti il fango urino, ma questi fiamma veleno una foga di ogni
 foga, e si non possono esser utili che al solo botanico. Tuttavia l'A.
 stabilisce di più urino qui fangi che hanno l' A. la veleno
 completa, che non involge cioè interamente il fango quasi l' A. prima
 delle lesioni di foga di veleno. 2.° mangenerio di veleno e
 veleno con lesioni nuove 3.° e di fangi veleno alcune specie

rispetto quelli il cui fango è bollito alla bre, e ne quali conovono
 i cantini esposti alla luce ambiente (p. 88.)

I cantini chimici tutti del veleno sono ancora non a foga di ogni
 dopo di foga. Ajuntò all'incenerimento della foga che si foga
 veleno, al loro indurimento, ed all'opinione di incenerimento di foga
 fiamma di veleno sono per di veleno di veleno. L'acqua del fango
 è in un carattere indicante una qualità di foga, e questa di veleno
 e questa per un oggetto più di veleno, e che fiamma la foga una casta
 di veleno di foga, benché questa specie non è indicata che la foga di
 veleno nel fango, ma non è una foga di veleno senza veleno acido.
 Per analogia poi l'A. consiglia di evitare i fangi veleni, letargici, e
 veleno di veleno, i veleni di veleno di veleno, quelli che fiamma di veleno
 in un foga veleno o foga, quelli l' A. veleno, o veleno.

Gli effetti di fangi ulcersi sono per un' esposta fiamma in un veleno,
 più spesso fiamma veleno, veleno, veleno alle foga, foga di foga al
 veleno, veleno, più veleno, veleno, veleno al veleno, e foga in
 veleno, veleno di veleno, veleno, veleno, fiamma alla foga,
 ed veleno, veleno alla foga, veleno, veleno, veleno, veleno foga,
 e veleno. I veleni fiamma per veleno veleno secondo la veleno di
 fangi veleno, e lo stato di foga di foga di veleno.
 Veleno e l'A. non sono utili quando veleno foga foga veleno.

[illegible]

Nel S. VII parla l'A. della confusione di luoghi. Per ordine l'im-
perfessione del metodo di confonderli in ligni di una in quasi che parte
di loro, e si distingue bene della loro sostanza da interbordin il ligni,
che per si può distinguere gettando in acqua due garofani aromatici, ma
la confusione ripete spesso, e c'è il difetto dell'alcool che continuamente s'evapora.
Gli insetti possono per luoghi confusi di ben diversi in luogo unico,
e confusi, per immensità replicatamente nell'infusione di tabacco
che così viene fatto: aggiunti alcuni garofani aromatici, per garantirli
dagli insetti, tutti giorni anche questi esserli scelti. Per i luoghi molto
grossi le seguenti note

Solfato di rame polverizzato & mescolato

acqua forte — tinta una

Si agiti per un minuto

Poi si decanti il liquido, che si getta via, e si unisca al soffice

Aggna bollente sopra fuoco

Si agit il nuovo il fluidi simili ai magneti, per si
influiscono il solfo sotto, per la confusione in la glic.

Volendo poi riporsi in luogo si prende una dose del sale infallibile, si piglia
in 8 once d'acqua pura di fonte, cioè la dose siabile, che basta a commin-
ciare un'effluviazione che terminerà al fluito; poi si aggiungerà all'effluviazione
nello spirito di vino rectificato nella proporzione di una ginta per ogni

Due del fluido stesso, finalmente si stempera il sugo, anche
attenuato di filtrar per carta il liquido prima d'aggiungerlo lo spi-
rito di vino.

Pietra 2^a - Si scioglie $\frac{1}{2}$ Oncia di Quercina di salone per-
tata di pietre cristalline / in una ginta d'acqua di stilla,
vi si aggiunge 7 pinte di pura acqua fredda, e una ginta di
spirito di vino rettificato, si filtra il liquore, e si conserva in bottiglia.
La proporzione indicata delle spinte di vino sarà sufficiente per
trovare degli e succhi, meno per arricchirne quelli poco ac-
quisiti e di meno confusione tenuto.

Devesi per averne che il vino sia affatto ricoperto di fluido di modo che
vi sia meno aria possibile, e la sua bolla d'esser chiara da nascerlo
immediato, o questo almeno da una acqua verniciata, e di sottili bol-
le di stagno, o di piombo, che ricopra esattamente l'orlo del vaso.

Per trasportarli poi nel luogo ove si realizza quell'operazione i più propri
si adoperano in vaso di terra forata di ovunque per modo
che il vaso sia pieno, e rispondersi sopra il liquido della pietra prima
pieno il musco se un imbuto, poi avendo il vaso.

Il liquore della Pietra 2^a è già alcuni - conservare i suoi più
delicati e a mantenerne la consistenza più ferma. Il proporzion

per un anno con di una miscela di due liquori, e di un conservare
l'uno dell'altro dopo che la pietra è stata unita con uno di essi.
Si scioglie i e i sali neri in luogo di conservare i luoghi l'acqua
basso sopra e la fanno passare alla percolazione, mentre invece con
debole sbaglia di per comune concludere alle spinte di vino conservare
i due e altre piante marine.

La forma degli agnelli viene tenuta la loro età; sono emulsioni aggre-
gate, per aggiungerli il loro sugo, i suoi liquori di unguento neri,
finalmente nelle rubriche di un conservare o imbutimento. Viene pure
il loro olio - L'olio i soli conservare costano sono quelli tratti dalla
Uva, del Olivo, della Lantana, del sugo e l'altro della carne del
poco più che alquanto quando si è lavorato all'aria.

I nomi sono tratti da Linneo, e in mancanza di questi di Balliardi.

Tavola analitica dei caratteri costanti che profertur filigerini nostri o sepia.
due sono descritti in quest'opera.

	Volva	Anello	Lamelle	
Bulbosi	Incompleta	persistente	intere e divagate	Agar. muscarius
		caduco	— — —	— pustulatus
	Completa	persistente	— — —	— bulbosus vernus
		nullo	di varia dimensione	— bulbosus
Lattiginosi	nullo	nullo	— — —	— volucreus
			— — —	— radicosus
	nullo	nullo	— — —	— terminatus
			— — —	— deliciosus
Non lattiginosi	nullo	nullo	Curvilinee; carne non alterabile a contatto dell'aria; spesso	— theiogalus
			— — —	— zonarius
	nullo	nullo	Curvilinee; carne mutabile.	— lactifluus plumbeus
			— — —	— azonites
Non lattiginosi	nullo	nullo	— — —	— dygmae
			— — —	— lactifluus Krypt.
	nullo	nullo	— — —	— lactifluus auro.
			— — —	— — —
Non lattiginosi	nullo	nullo	— — —	— — —
			— — —	— — —
	nullo	nullo	— — —	— — —
			— — —	— — —

Sezione Ima. Agarici bulbosi resinati.

Agaricus muscarius L. A. pseudo-aureolatus Bull.

Produce prima diposizione al vomito, poi angustia, e mal esun gerente, e non si amminifera l'enchi sopraggiungendo l'abbattimento, la fustigazione, l'indisposizione, e la morte. E facile a confondersi colla

A. cyaneus L. o l'uso mangiabile da cui diffinire per aver la Volva incompleta, irregolare di superficie, la stipe bulbosa, e fistolosa in qualche parte, l'anello persistente, la pelle del cappello sopra d'una e non spaccabile dalla parte della base senza lacerazione, il suo colore bianco, mentre l'A. cyaneus oltre l'aver caratteri opposti agli avvertiti ha per i suoi di più.

A. pustulatus L. A. verrucosus Bull.

Questo un diffinire del primo che per suo colore rosso e pelle superficiale del suo cappello verrucosa, che poi allora bruci anche bianca, e perciò non è che una varietà del primo. Ha un sapore alquanto salato. Trovati nei boschi di vigne e nei giardini della prima pioggia di luglio fino a tutto settembre. E da tutti conosciuti per nocivo, e perciò non si vede nei mercati.

A. bulbosus vernus Bull.

Diffinire dall'A. bulboso per suo colore cengia bianco, per suo sapore amaro, e per non isbruciar che in primavera. Cresce in buon dentro 8 o 10 minuti in circa un braccio come di peso con senso di costrizione alla faccia per cui sembra simile all'A. pipendae. Trovati nei boschi alla fine di ottobre e talora dopo le forti nebbie.

(90)
Siphonopoda del A. campestri un mi è facile il compendiarlo per aver
 una idea, l'ovulo nella gressina alla lamella, a bordo interno rugoso, e
 persistente, la lamella di unia d'impione per di loro, la pelle del capello
 non istrutibile senza l'aggiunta della corna, l'adna pinta per distinguere
 la corna da una fi altra nell'acido carbonico, mentre quella del *A. campestri* per
 te un altro riveste.

A. bulbosus. Bull.

Paulus usi supe sopra una memoria, in cui erano de d'ordine a un
giorno due denari come a rei animali; Nèci on l'ho preso perf. de
Wolff, mandavono certi can coniti, poi cattoro a terra, andovono
in letargo e morivono. N' solo etoro v'istitua Paulus guaiando utile.

Insuffi nella setole, e bronchiali, una più' spesso nei tessuti grossi e nella R.
Ma la setole semi completa peristofante, radiata, l'anello peristofale rivolt
all'ingiro, le lamelle X varia d'insufficienza. Stitani, la spirale peristofale
bulbosa, il cuscello di setole terrene e radiata, talora cuneato d'insufficienza
umida lucida con bruni di setole che la macchia di bianco, e la setole
bianca non osservata, odor e acqua non d'insufficienza nel ginepro, e la setole
nell'insufficienza.

Ch. virens. Bull.

Non mi vi si morì. Più capofatti, capi agerici mangerecci
per aver la vita completa. Maffredo capone insopportabile a ogni.
Dorrei nella famiglia, e nella sem sul finiv della foto. Ha la vita
passata in una guerra, lo spiriti bulboso pieno, nessun amore, le donne

(91)
vini, di cui le veggini non portano dal centro del capello, sempre rossi - o bruno
anche nelle varietà bianche.

A. radicosus - Bull.

Volva mellea; Stigm. cinis, congoz. indic. e fibrosa, squamosa; anello im-
proprio cioè attaccato allo Stigm. non per uno di quei margini, che anzi i suoi lobi,
— per un lobo che percorre la sua media lunghezza, dei quali margini alcun
porzioni restano attaccate alla periferia del cono, nelle striations e mackies,
la mellea frangiata verso oscuri, sopra opposti opposti, più volte acc.

Trasferiti nei boschi di S. Lazzaro tutto Ottobre.

Sezione II. Aganici senza Alveoli e lattiginosi, cioè senza
 Aganicus necator Bull. subcircularis Pd. vivitrix Pd.

La sua agione deletoria è aumentata e la costura. Non ha rotto, ha le stighe piene nude indicate, il capello a superficie falgata, - periferia ciliata, la lamella cuneiforme, ruvida, la carne tenera bianca, costura soda, che sotto manda una latta bianca acuminata, che divisa giustifica quando la stagione è afilata, e scalfisce specialmente nella scopa delle stighe percolate per all' A. che debbono ammettere nei luoghi anche d'ozio contro l'opinione di Michal (NB.) I sabbatori e gli scali potrebbero essere uccisi allungati, e la carne del buprestide cellulare senza essere uccisa.

A. deliciosus L. Schaeffer. *A. pygmaeus* Bull.

Linneo gli diede forse questo nome perché i popoli del Nord cui egli apparteneva
non gli diede della foresta che inghiottiva un forte signor al palato.

(92)

È innocuo uela per giovine, ma involuendo di una acciara, produce
gli aspi. sp. di d. a. nocivo.

Nasce da Agosto a Settembre nei luoghi frutti. Non ha uola né anella.
Capello di color rosso-cinereo, con molte zone concentriche delle spighe color più
intense. Lamelle curvilinee vari semplici. Carne non alterabile, piena di
sugo giallo o annerito. Sugo doppio nullo, più di poco forte.

A. theiogalax. Bull.

È sospetto per aspi latijungo come anche il seguente. Non ha uola né anella.
Spighe olive più o meno striate da lungo tempo delle tinte, capello rosso.
labris a profuso arrossamento, lamelle larghe curvilinee terminate a sega
per verso la base, carne giallina sotto la pelle non mutabile, piena di sugo
sulfureo amaro più alettivo. Troppi nei buphi alle state.

A. lachfleus zonarius. Bull.

Trovi: da giugno a novembre sul bosco. Non ha uola né anella. Spighe
più o meno color rosso arrossate alle basi. Capello buphi rosso con zone
più cariche. Lamelle semplici. Carne bianca non mutabile latijungo con

A. lachfleus plumbeus Bull. *A. Plumbeus* Bull.

È molto sospetto per sugo latijungo acrispino e congelantissimo all'aria
libera che esso trasfuso. È raro a trovarsi nei buphi e lungo sopra tutto del
la forte e sotto l'aridume. Somma una varietà dell'*A. zonarius* da cui non differisce
niss che per color e pelle menzogna delle zone.

(93)

A. agonistis. Bull.

Diffusa del delizioso di L. e taigale di Bull. per cantoni di viti ad an
acqua che vinta. Non ha uola né anella. Ma le spighe striate sottili
più. Il capello glabro sulla superficie a variate. Le lamelle che
verso le spighe si formano un angolo rientrante. Carne soda bianca.

A. dymogalus. Bull.

Uola e anella nulla. Spighe piene grasse. Lamelle curvilinee vari.
Carne mutabile che sotto prende un color di buphi scorgendo di bianco, e
che si fonde con quella delle spighe. Sugo latijungo insipido.

A. lachfleus. Ruff. Schaeffer. *canonius* Bull.

È sospetto per latijungo. Secondo Ruff. che per neg' ora in poi' appena
produce anelli, cartilagine, vomito, e digressioni, e infanzia d'una persona, che
dopo mangiarne rimprovera una malattia, e talora che produce
vomito. È molto comune nella selva umida ombrosa d'estate e d'autunno,
e per la più solitaria, cresce a grappoli sui tronchi vecchi a più di terra.
Spighe piene delle stoffe che del capello, solo biancastre. Lamelle aggrava
simili sulle spighe sempre formate. Capello a righe più scure, di color
rosso cinereo, con zone più intense. Carne fragile senz'aspi flessibile, immen
tabile, sugo di sugo latijungo, e di questo spand odor di campane.

A. lachfleus acis. Bull. *piperis* L. Schaeffer.

È frequente nei buphi, lungo le viti dell'acqua in viti di Prunella Loba, e
altrove, lungo sopra tutto. Arriva al peso di 38 once. Ma le spighe

(94)

coto, eccentrico nel frango adolt, pieno, biancastro, capello bianco o carino, l'è
 senza gonfi; lamella sommi: sul foglio verso fronte, carne solida bianca,
 che spoglia dirim giallina, insidra, zuppa d'ago cand'it aen.

Sezione 3.^a Agarii non lattiginosi.

A. crustuliniformis Bull.

Ha saper aere e diagrandevole a spai. È comune ne barchi e prati.
 Stipite gracile sottile cilindrico filigato. Lamella libris chilopiansi un
 intervallo fra esse e le stipite, ed ovacee. Per ogni lamella intera
 ved ne hanno og. 3. Dimezzate.

A. contiguus Bull.

Ha saper acid che poi dirim amaro. La sua carne composta fra le
 rite manda un fuso attracceduto. Trarsi ne boschi in agosto e Settembre.
 Stipite corte, grosse, svasate all'apice. L'orlo del capello involato per og:
 sotto; cancellato quand'è giovane. Lamelle infesse nella sua giovinezza, e
 nullo, dimezzate poscia, sommi sulle stipite. Colore giallatenno.

A. piperatus Bull.

Diffinisce da quel di L. per esser non lattiginoso quando per intermisti ad
 bianco sapor d'ago. È comune ne boschi in Settembre ed Ottobre.
 Stipite corte grosse, d'egual dimension. Capello a superficie glutinosa, apert:
 feno crente scancellato sopra e sotto, d'ineff. Lamelle non infesse inguali
 semplici. Carne aquosa fragile.

(95)

A. annularius Bull.

Il suo sapore diffiniva grato dirim poi d'tanta asprezza che stringe violent:
 mente la gola. Trarsi a maggio apert: d' solici vasi, ne boschi in Settem:
 bre ed ottobre. Stipite nascent da tronchi vasi, o putiti in fessure in altri
 spai, lungo, l'è fis, pieno. Capello emisferico, d'un giallo ovaceo, ovio
 d'esser d' bistro. lamelle a bordi frangiti. Lamelle vici, d' cui la più
 lunga alcune sommi sulle stipite. Carne bianca.

A. urens Bull.

Il nome detagli da Bull. indica la sua qualità perniciosa. Stipite pieno
 lungo, sottile, gracile, ingrossato alla base e d'altro all'apice dov'è munito
 d'un bordo glanduloso. Capello d' color giallo-tenno d'arore. Lamelle
 vassette. Sapor d'ora carne urante.

A. cantharellus L. et alior.

È uno di più comuni nei prati, allei feldi di chi, lungo i tronchi. Ha
 odor di pino, ed è visoso ed quando è vecchio, nel qual tempo ha la carne
 secca e cornea. Trarsi da agosto a Settembre. Stipite pieno nudo
 solitario ed aggruppato. Capello per la più maggioranza d'abito da un lato
 al bord' inguale e lucido, giallo. Lamelle viciose v'è l'è grosse
 sommi sulle stipite. Carne feda giallina. Sapor un poco pippicante,
 poi grato.

A. integer L. Kniff. *ambly* Schaff. *pectinatus* et *sanguineus* Dahl.

Siccome questa specie vive nel colto usi di cui originaglii Stigle di Bull. e Schaffer che ne fanno una specie distinta. Planch & Kirzner l'ha intesa nel caso dell'innocuo, ma è da supporre che sia la stessa specie nociva in un punto di vegetazione, ed innocua in un altro. Prodece insigni per i districci, meteofo e morte. Kniff dice che basta uno di questi colti in altro mangiarli per guastarli tutti. Alligna nelle gelate calde, e nella ombra, e fiorisce in Agosto e Settembre.

Stipite corto e tozzo di quel grasso. Capello o bianco, o rosso o sanguigno, talvolta limato o unido. Lamelle frange bianche. Saper della carne caustico.

A. cyathiformis. Schaffer. *fung* *aurant* *infundibuliformis* Micheli.

Nasce all'autunno alla radice degli Abeti morti, e vien chiamata dai contadini del Nidale *Rever* *muffia* perchè è di sospetto. Stipite assai corto e tozzo pieno giallo di giallo. Capello denso imbutiforme a margini ondosi, ed a superficie piumosa. Talora è driso in liti. Lamelle gialle e rosse. Schaffer ne dà una varietà il nome d' *A. infundibuliformis*.

Conclusion

Planch nella *Spicologia* parla anche dell' *A. glutinosus*, ma questo non è che uno stesso, e per lo più ignota qual sia; e dell' *A. pumilus* non fa che dire che sia mangiato giacché appena alla fine di luglio in buona vegetazione.

(98)

(99)

Helleborus viridiflorus

caule angulato biplo, ramis brevibus paucifloris, hirsutis plantaginatis
sepalis luteis ovatis, filis ^{angulis} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

In Dalm. montibus Apr. Majus

Boyleum suberectum

Cerinthus purpurea

Caule erecto superius ramoso filis ^{longioribus} reflexis, glaucis ^{longioribus} albis mucronatis
sepalis ^{longioribus} ovatis, filis ^{longioribus} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

In montibus Bozgia inter Libanum et Taurus

Maxima species Cerinthi in qua haec sunt: ovatis, mucronatis, distinctis lobis
sepalis ^{longioribus} ovatis, filis ^{longioribus} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

Boyleum suberectum filis ^{longioribus} reflexis, glaucis ^{longioribus} albis mucronatis
sepalis ^{longioribus} ovatis, filis ^{longioribus} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

Centaurea saloniensis Sp. I. p. 22. n. 299.

Caule ^{longioribus} angulato biplo, ramis brevibus paucifloris, hirsutis plantaginatis
sepalis ^{longioribus} ovatis, filis ^{longioribus} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

Pape Saloni ad viam quae ducit in Taurum, et circa Scutellum

C. cuspidata Sp. I. p. 22. n. 300.

Caule ^{longioribus} angulato biplo, ramis brevibus paucifloris, hirsutis plantaginatis
sepalis ^{longioribus} ovatis, filis ^{longioribus} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

Flab. ad viam m. 4. Bozgia. M. Tauri

Herb. inter Taurus Libanum circa Taurus, in montibus prope Taurum, in montibus prope Taurum
sepalis ^{longioribus} ovatis, filis ^{longioribus} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

Centaurea montana P. G. H. p. 22. n. 301.

Pl. filis ^{longioribus} pinnatis, corollae glaucas, sepalis ^{longioribus} ovatis, filis ^{longioribus} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

Boyleum suberectum filis ^{longioribus} reflexis, glaucis ^{longioribus} albis mucronatis
sepalis ^{longioribus} ovatis, filis ^{longioribus} connatis ^{glabris} multifloris (8-12)
lobis ^{longioribus} distinctis, lacinis lanceolatis-linearibus, acutis apice mucronatis
sepalis ^{longioribus} multifloris

Gentiana crispata

caule tetragono a basi v. ramp. fl. inf.
oblongo, ^{sp. elliptico} ~~sp. elliptico~~, apice subcordato

lanatus, oblongo, margini crispis.

floribus paucis, brevibus pedunculatis

5-fidis, calycis lanatis marginibus

impresso-lobatis, apice subcordatis

cor. tubo glan. brevibus 5 oblongis

Euphorbia calycis 5-fidis, cor. tubo subtri-

angulo, lobis superioribus lobis marginibus

impresso-lobatis, ^{subtriangulis} ~~subtriangulis~~ inferioribus lobis lobis

oblongis, antheris brevibus

Camp. coryllifolia

calyces campanulati, semine
ovata nitida | isabellina |

Stachys montana

St. bifida caule adscandente, folijs oblongis, subternatis, integris, obtusius-
culis, supra lineari, subtus nervosis, floribus integris, axillaris, sessilibus
diffinis sub sessilibus, calycibus angustis, bivalvibus, lobis linearibus, galea linearis
pinnata. 28

St. ligula. *St. obovata*. aff. *St. ovata*, a qua hinc *St. ligula* pendula
obtusiuscula, subternis vel oppositis, linearibus, integris, apice oblongis, nec
curvis, calycibus angustis, galea linearibus.

In collibus Dalm. rarior.

St. montana

St. bifida caule adscandente, folijs inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus, angustis
obtusiusculis, supra lineari, subtus nervosis, floribus integris, axillaris, sessilibus
diffinis sub sessilibus, calycibus angustis, bivalvibus, lobis linearibus, galea linearis
pinnata. 28

St. bifida. *St. nigrescens*

Hab. in speciosa. *St. bifida*

St. fragilis

St. bifida caule adscandente, folijs oblongis, subternatis, integris, obtusius-
culis, supra lineari, subtus nervosis, floribus integris, axillaris, sessilibus
diffinis sub sessilibus, calycibus angustis, bivalvibus, lobis linearibus, galea linearis
pinnata. 28

St. obovata pinnatifida, vel utriusque pinnae lobis
Hab. in Dalm. rarior, et in speciosa ad speciem ad speciem.

St. eriozona an *St. ligula* - *St. bifida* var. *St. ligula*?

St. bifida caule adscandente, folijs oblongis, subternatis, integris, obtusius-
culis, supra lineari, subtus nervosis, floribus integris, axillaris, sessilibus
diffinis sub sessilibus, calycibus angustis, bivalvibus, lobis linearibus, galea linearis
pinnata. 28

St. bifida caule adscandente, folijs oblongis, subternatis, integris, obtusius-
culis, supra lineari, subtus nervosis, floribus integris, axillaris, sessilibus
diffinis sub sessilibus, calycibus angustis, bivalvibus, lobis linearibus, galea linearis
pinnata. 28

St. bifida caule adscandente, folijs oblongis, subternatis, integris, obtusius-
culis, supra lineari, subtus nervosis, floribus integris, axillaris, sessilibus
diffinis sub sessilibus, calycibus angustis, bivalvibus, lobis linearibus, galea linearis
pinnata. 28

St. bifida caule adscandente, folijs oblongis, subternatis, integris, obtusius-
culis, supra lineari, subtus nervosis, floribus integris, axillaris, sessilibus
diffinis sub sessilibus, calycibus angustis, bivalvibus, lobis linearibus, galea linearis
pinnata. 28

Lathyrus pariflorus

caule prostrato pubescente. foliis linearibus. linearibus. marginibus
 subtergibus glabris. pediculis axillaribus oppositis. cymis subglobosis. flori-
 bus subglobosis. pediculis elongatis. appendicibus longis. longioribus. flori-
 bus post anthesin cernitis. calycibus longioribus. pediculis subglobosis. subglobosis.
 tubis superius breviter lobatis. 28

L. nuchalis Boissier & Heldr. in extenu. Delav. corinae p. albina
 Fl. Algeriae Septentr.

Pl. Chemnitz. gaudet foliis thymis. vasa laticia. Habitat tamen, juxta
 canalem Linyon superius vasa, et affertur. A. j. cern. 1.
 gaudet laticia vasa. Differt ab h. j. gaudet foliis vasa
 appendicibus longioribus. flori-
 bus longioribus. pediculis brevioribus, calycibus
 brevioribus. et longioribus. in vasa.

1. *Andropogon pubescens*
2. *Phleum echinatum* Thunb.
3. *Hypericula ciliata*
4. *Salix repens*

5. 1.

5. *Caryophyllus paniculatus* P. g.
6. *Myrica*
7. *Hypericum*
8. *Phacelia microcalyx*
9. *Lithospermum*
10. *Stemmatea*

11. *Orthocentrus flavescens*
12. *Anthracinus*
13. *Polypodium*
14. *Centropogon*
15. *Polypodium*

6

16. *Brithogale*
17. *Centropogon*
18. *Polypodium*

10

19. *Diastylis*
20. *Centropogon*
21. *Polypodium*

13

22. *Stellaria multifida*

14

23. *Lathyrus*
24. *Stellaria*

16

25. *Stellaria multifida*
26. *Stellaria*

15

27. *Stellaria*
28. *Stellaria*
29. *Stellaria*
30. *Stellaria*

17

31. *Stellaria*
32. *Stellaria*

Cyber

33. *Stellaria*
34. *Stellaria*
35. *Stellaria*
36. *Stellaria*

37. *Stellaria*
38. *Stellaria*
39. *Stellaria*
40. *Stellaria*

1. *Andropogon pubescens* miki

9. spicis axillaribus terminalibusque longe pinnulatis; vaginatis geminis;
vaginae glabrae, pedunculis ~~simplex~~ apice pubescentibus, flori-
bus bifidis; antheris brevissimis utrinque brevioribus, foliis angu-
stissimis glaucis brevibus sparsim pilosis. 28. callosis simplicibus

Hab. in grommaris maritimis l'os Dobarce Nib. prope Voullia inter
Ongem et Meucron. Floret Tunis.

Obs. Affinis A. hirta, qui differt praesuntibus (saepe minus panicula) promissis,
apice folij longis difficha barbata, vaginis villis, arista flaccida quae
duplo longior, folij late linearibus glabris multis longioribus

2. *Phleum echinatum* Host Ic. gram. austriac. Vol. III p. 8. tab. 11 (1803)

Phl. spica suborta, glanij calycanij basi ciliatij, apice truncatij, carinis ac-
minato-angustij, angustij florum superiorum calyce longioribz, ovibz
angulatis scabrij demum divergentibz radice fibrosa annua. @

Syn. Phleum flexuosum Smith Prodr. N. York. p. 42 (1806)
Vulgaris in the Dolomite Mts.

Obs. *Phleum felinum* Sm. unum idemque cum ae *Ph. echinatum* Host
propter concordantiam characterum utriusque plantae a botanicis expressit
rura, praedocuit autopsia stirpis sicile a cl. Fusconi pro *Ph. felino* com
municata, quae cum nostro *Ph. echinato* omnino in usque ad unguem con
tuit. Certe dignitas et differentia a b.m. Boenars et Schultze. in Syst.
veg. vol. II p. 380-81 attulit utriusque speciei accommodatus: Non ite
rum ut se habet quoad usum quibus ut. Sprengel hunc plantam diffinire.

re sententia est in Sycl. veg. VI. I. p. 241. 42. Ipse enim tribuit Phleo
echinatus speciem compositam subrotundam, calyces truncatos ciliatos an-
thet., et folia serrulata; P. felineo e contra speciem ovalem et caly-
ces autem globulose acuminatos - aristatos. Attamen, vix tantu
vix, et ex folia stripi dentatis, cognitione a se non debet, speciem
P. echinatus aliquo leuon quod in vulgari formi oculi nunc ma-
gis nunc minus oblonga suppetente hinc, prout vixit loci natu-
ritatem, nunquam tamena chin in longi fissuribus composita fissi-
calyces utriusque speciei truncati esse, vix it. et ^{ipsum} Smithii in obis
obtusifloris, et bois tentum ciliatis; laciniae vix glomeratae in
basi loborum vix sensim attenuatae prodire; folia denique margine
vix subrepente. Aristi florum inferiores breues sunt quam in aliis.
et calycis vix adaequant. Ex his itaque patet duos huius speciei in una
tanta junctura esse.

A. *Galium rupestre* nichi

5. globum vivit, caule quadrangulo diffuso dichotomo monophyllo, basi lignoso,
ramis divaricatis, floribus laxo paniculatis, axillaribus solitariis, termin-
libus subgeminis inaequaliter pedunculatis, (foliis subernis, ~~obtusis~~ ^{apice lobatis} ~~obtusis~~
late linearibus ^{apice lobatis} majoribus, subangulis autis, oppositis, ^{apice lobatis} ~~obtusis~~),
cordatis campanulatis obtusis, pediculis globis lobatis. &c.

In vegetabilibus Onzi, ~~Bickon~~, Uxellin, Bickon, Turrie. Floret Junio Jul.

obs. inv. *Spiz. Gali.* where *L. longicauda* probably owing to secondary,
glottis, flag linearly margins rusty, peduncles corolla campanulate they
also

22 *Streptopogon fragilis* m.

[illegible]

Helb. intertongens et *Pygmaea* ad ian, in march 2 Bickhore at Sal-

Obs. Short hairs. Long oblong ones generally scattered among 2 present rather: Part
fleshy white fls.

23 *S. menthaefolia* v.

S. hirtula ~~can.~~ ^{adventiva} ~~cap.~~ ^{variegata} 10, flous inferioribus petiolatis subrotatis.
 ovatis vix longis. bracteis, superioribus ovatis-lanceolatis, sessilibus, flouibus inaequalibus
 subrotatis ~~flouibus~~ ^{seminibus} ~~seminibus~~ ^{ovatis} ~~ovatis~~ ^{diffinis} sub 10-floris; calycibus
 campanulatis puberulis antheris, ~~galea~~ ^{calycibus} ~~puberulis~~ ^{lobatis} ~~speculato-purpureis~~ ^{intra} ~~intra~~ ^{intra}
 nativis.

Hol. Kyurii.

Obi. Pyrid., sicca nigra, et. flor. luvio.

24 S. ~~rubens~~ subcaneus m

[illegible]

In early Dohrn. morning. St. Paul - Augsburg.

Pts. Affing it was, Kemp down fluff much agitatedly it was ^{other}
 away, ^{Inf.} ^{majority}, can he have minor party long and better. Part
 sign - H. schoolmen. ~~Part~~

25 *Forsythia delavayi mitch.*

7. *Stellata concolor*, caudal lobe ^{superiorly} ~~superiorly~~ ^{margin} ~~margin~~ ^{adventually} ~~adventually~~ ^{terribly} ~~terribly~~ ^{flying} ~~flying~~
strongly in ^{jet-like} ~~jet-like~~ ^{attenuated} ~~attenuated~~ ^{inching} ~~inching~~ ^{regarding} ~~regarding~~ ^{style} ~~style~~ ^{large} ~~large~~ ^{rudder} ~~rudder~~ ^{thymus} ~~thymus~~
to 6260. 24

Syn. F. trigonum DC. Syst. 2. p. 290 Prodr. 1. p. 158 Sp. Syst. 2. p. 870

Trithem. Enchir. P. I. d. l. p. 15 to 10. p. 1.

Hb. in apertis mensis Longi. Pl. Mayo. hinc

In figura prima est a d. St. sequens emendat nectat: nam
triginta sed tres, qui tunc conuentione angeli finis, quatuordecim
In ut uoce specifia, huius non singulis sed bibit. In icon
alio, ubi ut bene, deus duo coluntur ybilitas, huius singulis singulis
non bibit, et ad singulis bibulam inuoluit, ut perit quid, qui in
prope omnia infirmitates.

26 Pteroneuron Isometricum n.

Pl. foliis pinnatis acutis; glaucis, nervis, foliis et vasis petiolaribus
trilobis, infimis subpalmatis; ribis vis ensis glabris, stylis elongatis
thorac. erantibus; renibus apice marginatis. caule apice
ramosissimo

Cyn. Cardamine meritiona Portensch. in *St. Syst.* 2. p. 265. P. Nr.
1. p. 159. Institution. En. Pl. Salin. p. 15 tab. 11. Schuss. ic.
tab. 2. f. 92. *Sp. Syst. veg.* Vol. IV. part. II. p. 241

Hab. inter saxa marta circa Pyramidem, in vespertilio circa Gran, in M^{te}

[illegible]

30 *Centium crispum*
 canes ^{californicum} ~~floridum~~ ^{uniflorum} ~~californicum~~ ^{floridum}
 obis ^{reptans} ~~imbricatum~~ ^{imbricatum} ~~imbricatum~~ ^{imbricatum} ~~imbricatum~~ ^{imbricatum}
~~reptans~~ ^{reptans} ~~reptans~~ ^{reptans} ~~reptans~~ ^{reptans} ~~reptans~~ ^{reptans}
 the plant ~~obtusifolia~~ ^{obtusifolia} ~~obtusifolia~~ ^{obtusifolia} ~~obtusifolia~~ ^{obtusifolia} ~~obtusifolia~~ ^{obtusifolia}
 from barba. ©

In Birkens die 10. August. 1828 Petter.

Offing J. Gonzalez, Diego Fernandez - Lucinda - Calixto
in a corking ship

11 Gentian flangey ^{Herinshill} mts.

and sharp flange tubular, flange oblique. flange
protruding posteriorly, flange coming, cor. tubular
is flange flange tubular, being oblique margin impa-
cor. tubular.

The Bridles to 10 days later.

Gentiana crispata

9. make between a soft unripe, full & perfectly strong, ripened
and perfectly, ripened, whole - sometimes the ripening will be
very particularly brown peduncles. Softly, why is this
unripe unripe - ^{being} usually ripened early, with two green ^{ripe} ^{ripe}
the ripening. 9. 9.

Shin hi-kori jō-ni m. aya-ya. Chōkyō ichi-ku.

are being invaded, or color spreading. S. flammula extinction? Insects?

Euphorbia officinarum p. ex Herb.

D. calyx 16 flos. cor. luteo subincisura, lobis longioribus lobis marginatis
lobis plicatis; infero 16 flos lobis lobis oblongis, lobis lobis lobis.

In Cerganthe rugyloides calyx cerganthus: rosea
viride / color i subtile / an aestiva?

[illegible]

Asimio *nomine*

Asimio *nomine*, *caule* *spinoso*, *fructu*, *semine*
virg *plurim* *stich* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*

Differs *ab* *h. p. can* *W. cui* *offic*, *ad* *quarta*, *conne*
pericly *erich*, *plur* *stich* *pericly* *erich*, *apic* *caule*

Cyrtis *frugos*

C. frugos *erich*, *plur* *stich* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*

Apic, *si* *cui*, *lysis* *labore*, *quo* *plur* *stich* *pericly* *erich*, *apic* *caule*

Hab *in* *montib* *virg* *fructu*, *ita* *fructu* *et* *fructu*, *con*
in *h. p. can* *W. cui* *offic*

Cyrtis *adoncha*

C. adoncha *erich*, *plur* *stich* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*
pericly *erich* *apic* *caule* *pericly* *erich*, *apic* *caule*

Con *montib* *virg* *fructu*, *ita* *fructu* *et* *fructu*, *con*

Terminologia *de* *fungis*

Nell *ordine* *de* *fungis* *erant* *stati* *compos* *de* *linnea*
tutti *quelli* *fructu* *de* *conistena* *per* *lo* *piu* *molle*, *e*
conne *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*
naturali *famiglie* *Hyperogler*, *e* *Fungi*. *Poliofani*

N *holi* *speci*

Sulla *due* *naturali* *con* *vari* *proone* *le* *opinion* *de* *end*

altri *quasi* *op* *detti*
altri *quasi* *op* *detti* *de* *la* *fermentazione* *e* *putrefazione*
altri *quasi* *op* *detti* *de* *la* *conistena* *per* *lo* *piu* *molle*, *e*
conne *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*

Poliofani; *altri* *quasi* *op* *detti* *de* *la* *fermentazione* *e* *putrefazione*
alle *Galle*, *ed* *ai* *Poliofani*, *altri* *quasi* *op* *detti* *de* *la* *conistena* *per* *lo* *piu* *molle*, *e*
conne *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*

conne *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*
conne *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*

speci *de* *fungis*, *le* *conne* *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*
conne *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*

conne *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*
conne *che* *nomine* *de* *monti* *distribuiti* *nella* *due*

I funghi sono vegetabili semplicissimi più o meno parte
aerofita e costituiti dalla stipe della protuberanza. Quindi
ogni fungo ^{qui conosciuti un} ~~ha~~ di stipe in cui sono immersi i semi
semi che diconsi Spore, o Sporule.

Molti specie di funghi più o meno sono avvolti in una
membrana che nominasi involucro (Involucrum) Se questo
restando in se tutto il fungo col suo gambo Stipe Volva e
se il solo cappello del fungo, e specialmente la sua superficie
inferiore diconsi anelli (annulus). Se l'anello ha composti
di altrettanti fili ^{filamenti} ~~filamenti~~ diconsi Corina, o Veolo.

Il stipe nelle varie specie di funghi cambia stranamente
di forma. Quindi il nome di Cappello (Pileus) ne spiega
caratteri, grandi, ed agosti che hanno la figura d'un
ombrello. Varia ^{questo} nella forma, nella sostanza.
Riguardo alla forma esso diconsi emisferici (hemisphaerici)
quando ha una figura circolare al di sopra più o meno
convessa, al di sotto concava o piana; di mazzetto (dimidiatus)
quando ha una figura semicircolare, così che quasi tagliata
a mezzo; spargito (effusus) quando la sua figura è irreg.
lora - la sua superficie irregolare e variamente ripiegata
(Bot. Taurus)

Funghi epiphylli juvat. Plantas in quibus
invascentur.

In fol. Salicis Capree. Xyloma salicinum, gylorides, salignum. Uredo pinguis.
Dematium salic.

— Andromeda polifolia. Xyloma andromedae.

— Aceris Platanoidis, et campestris. Xyloma acerinum. Eriinum acerinum

— Aceris Pseudoplatani. Xyloma punctatum

— Phytocampi spicata. Xyloma stellum

— Prunae domesticae. Xyloma rubrum

— — spinosa. Xyl. rubrum var. Prunae fr. spin.

— Quercus. Xyl. perigordis

— Fagi. Xyl. perigordis, Xyl. pignum, Eriinum pignum

— Corticis Caryaanthi. Xyl. hyssinoidis. Eriinum Caryaanthi

— Populi tremulae. Xyl. populinum, concentricum. Eriinum populinum

— Alni glutinosae. Xyl. albeum. Eriinum albeum

In fol. Soli. Anemone. Aspidium cornutum

— Pyri communis. Acc. cancellatum

— Phammi cathartici. Acc. Phammi, confum

— Galii borealis. Acc. Galii

— Rumic. aquatici. Acc. Rumic

— Ribes Ergularis. β . Acc. Rumic

— Premanthi muniti. Acc. Premanthi

— Ranunculi Ficaria. β . Acid. confu

— Asperiflorum Aspidium asperiflori

— Infulegini's Tarsus. Acc. Infulegini's, Wood Infulegini's

— Berberis vulgaris. Acc. Berberis

— Orbi tuberosi. Acc. Or. tuber.

— Ranunculi. aery. Acc. Ran. aer.

In fol. Allii unini Acc. All. unig.

— Euphorbie Cyparissii Accid. Euphorbie, Uredo Junckelmanni

— Ingoxopogi pratensis Accid. Ingoxopogi

— Sii Salicis . Acc. Sii Fol.

— Anemones nemorosae Acc. Anemones, Uredo Anemones, Puccinia Anem.

— Anem. nemorosoides Acc. Junckelmanni

— Pini sylvestris Acc. Pini

— Ribis alpinum Uredo conflens

— Menyanthes pinnatifida p. Uv. conflens.

— Alchemilla vulgaris Uredo Alchemilla

— Euphorbie helioscopii Uv. Euph. heliosc.

— — exigua Uv. Euph. exigua

— Rosae centifoliae Ured. Ros. centif. Puccinia rosae a.

— cyparissii Uredo miniata a.

— caninae Uv. miniata a.

— Linum catharticum Uv. miniata p.

— cathartici Uv. miniata p.

In fol. Cerealiu. Urd. linearis a. Ur. segetum, Pimpin. graminis

— Polygodi fragilis Ur. linearis β .

— Campanulatum Ur. Campanul.

— Sonchi avensis Ur. Sonchi av.

— Senecionum Urd. frivola β .

— Rubi fruticosi Ur. Rub. frut. Pimpin. mucronat. β .

— — idi Ur. Rub. idi

— Populi balsamifera Ur. populina

— Betula alba. Ur. populina β .

— Epilobii montani Urd. jugoslav. a.

— Campanul. vulgaris Ur. jugoslav. β .

— Mentha sylvestris Ur. Mentha

— Betula vulgaris Ur. Betula

— Convolvuli avensis Ur. Convolvuli

— Seneculi avensis Ur. Seneculi

— Urtica Faba Ur. Urt. Faba.

In fl. Phaceli

Uv. appendiculata a.

— Pisi satini. Uv. appendiculata β .

— Geniste hirsuta Uv. appendic. γ .

— Dianthi Caryophylli Uv. Dianthi.

— Umbellata Uv. Bullata

— Thlaspi Bursa-pastoris Uv. Candida a.

— Ingo-polygonum Uv. candida β , Uv. Ingo-polygoni

— Alyssii calyc. Uv. candida γ .

— Cheiranthi incani Uv. Cheiranthi

— Caricum Uv. canis

— Mentha aquatica. Puccinia Menthae

— Valantia crinita Pucc. Valantia

— Polygoni amphib; Pucc. Polyg. amph. Pucc. Polyg. aciculare
et aliis.

— Cirsium Pucc. Cirsii

— Potentillanum Pucc. Potentilla

— Boraginis Demetrium herbaceum β .

— Rapi Mali Erineum Rapium

In fol. Filix Crinum lilaceum

Populi nigra Er. aureum


Dissegni per longitudinale offeras versipice (versipendy) / quando
è coperto in guisa che la sua superficie inferiore diventa in
superiore; umbonatus - sordo quando ha una figura conica;
e piana ^{ed} alquanto concava solo nel mezzo; imperfectum / infund-
ibuliformis / quando è concava ed ha forma di imbuto

Armenia lanceolata y. *insipida*

A. glaberrima, caule repente, foliis oppositis, foliis ovatis
longe cuneatis lanceatis ^{oblongis} cuneatis, pediculis brevibus, floribus
albis longe pedunculatis ciliatis, fructibus cuneatis ~~globosis~~ ^{oblongis}
et immixtis ~~globosis~~ ^{oblongis} ~~oblongis~~

In Britania

Armenia affinis *A. lanceolata*, a qua tamen differt nervis
tenuibus minus, glaberrima, cuneatis, floribus, nervis diffinis
in foliis haec in longis et ferebatur nervis minus, isti
autem ferebatur nervis. *A. A. chrysanthemum* Whigg. Spr?



384

455

Micetologia
sda