Osservazioni sopra alcune piante dell'Erbario Linneano

La grande importanza che attribuirono sempre i botanici alla ispezione oculare dell'erbario del grande riformatore svedese serbato in Londra presso la Società che porta il suo nome, onde verificare con sicurezza quali fossero per esso le piante da lui descritte e sulle quali riferendosi nel riferirle e nominarle i successori, spinse me pure nel luglio del 1864 a ispezionarlo per chiarire alcuni dubbi e formarmi più certi criterii sul vero nome linneano di alcune specie. Si sapeva già, che solo coll'esame dei saggi autentici deposti e conservati in quell'erbario prezioso si erano potuti correggere alcuni errori di nomenclatura, e l'illustre botanico siciliano Gio. Gussone ne aveva scoperti alcuni di fecondi studi s'era giovato poscia l'altro illustre botanico italiano Antonio Bertoloni nella sua Flora italica per dare ad alcune piante il vero nome linneano in sostituzione del più recente imposto da coloro che se ne credevano gli scopritori. Pieno d'alcune delle osservazioni e dei giudizii del Gussone adottate dal Bertoloni io aveva creato di debitare esponendone le ragioni nella Flora dalmatica benchè mi mancasse quel sincero ed ottimo fondamento che solo potea ~~dare~~ somministrare dell'osservazione diretta dell'esemplare in cui il Linneo aveva descritta e nominata la pianta. Così adunque con gioja l'opportunità offertami dal viaggio di Londra per togliere ogni dubbio ~~per~~ in proposito e confermare o correggere i giudizii miei o gli altrui, mi sarà ora inutile il render pubblica le osservazioni fatte allora, e le deduzioni che mi parve derivarne.

L'Erbario Linneano acquistato già da Giacomo Edoardo Smith a Upsal, da lui trasportato a Londra e donato alla Società Linneana che ivi presiede, è collocato ora ~~nella~~ in via Piccadilly nel palazzo Burlington House, residenza attuale di quella illustre società. È collocato in una sola stanza di esso, rispettato in tre armadii ~~[illegible]~~ ed a rimpetto di chi lo guarda avvi altro armadio contenente la biblioteca Linneana, mentre a sinistra ~~[illegible]~~ sta quella delle altre opere da lui possedute di storia naturale, chimica, medicina ecc. Rimpetto a questi cinque sono altri armadii o ripiani contenenti animali preparati o secchi, vegetali, ancora parte delle opere di Linneo.

Premesso ciò mi pare ora ad esporre le ~~poche~~ osservazioni che ho potuto istituire in quell'erbario.

1° Atropa Mandragora. Questo nome è scritto di mano del Linneo stesso nell'esemplare che possiede il Linneo del gen. Species Plantarum ed. I p. 181 ~~sotto il nome~~ per cui quantunque ~~manchi~~ ~~sotto~~ e che tutto sotto il nome specifico della Mandragora offrendovisi manchi la descrizione a penna con cui il Linneo solea contrassegnare le specie di cui possedeva nell'erbario il saggio autentico da lui descritto, non è a dubitarsi che la specie che or vi si trova anche quella ~~[illegible]~~ è ancora, come conviene a la specie di Mandragora delle Species plantarum ed. I. Or bene quel saggio ~~a~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]

chiamò più tardi M. acaulis, e che fece di recente il Bertoloni mutò di nome di Mandragora officinalis, perchè credette che non competesse ad essa il nome di M. officinarum dato già dal Linneo, attribuito ad altra specie da Spreng. avea nominato M. officinalis. Il Bertoloni fu tratto in errore dalle figure che dà G. Smith nella Flora graeca dell'Altopa Mandragora la quale esprime la specie Linneana a fiori bianchi ed a calice fruttifero più breve della bacca globosa, rappresentata in esso rappresentata una specie a fiori violacei ed a calice fruttifero quasi eguale alla sua bacca ovoidea o bilunga. Ora questa è quella che il Bertoloni chiamò M. officinalis Sprengel. M. officinarum Bertol. non L. o M. officinalis degli antichi. Il Linneo non aveva conosciuto che una sola specie di Mandragora quando scrisse le prime e la seconda edizione della specie plantarum non diede ad essa alcun carattere specifico o differenziale, ma della specie adotta da lui dedusse (Pempt 457) ove sotto il nome di Mandragora mas è riferito il frutto rotondo della M. officinarum) e dal frammento del Bauhino (Pin. 169. Mandragora fructu rotundo) riferisce all'autore, che la pianta da lui nominata per M. officinarum è appunto la Mandragora mas degli antichi a fiori bianchi e frutto rotondo e non già l'altra ad essi non conosciuta e genuina appunto non conosciuta. Da tutte quelle che ho dedotte, che l'opinione da me esposta nella Flora dalmatica Vol 2. p. 236 che la Mandragora officinarum del Linneo, non fosse quella esposta dal Bertoloni, ma l'altra Mandragora della Flora greca, ne incontra la M. mas degli antichi a quella che il Bertoloni chiamò M. acaulis non più nemmeno confermata dal tipo del Bertoloni (premesso che appartiene alla M. officinalis del Bertol. e non già alla M. officinarum del Bertoloni, come del solo esame critico della descrizione linneana io aveva già sospettato e pubblicato nell'opera stampata nel 1844. Malgrado ciò il Bertoloni nell'opera di cui fu di sopra nel 1844 ha specie europee di Mandragora dubbie, per nessuna così Mandragora officinarum L. di cui è sinonimo la M. acaulis Bertol. M. autumnalis Syn. syst. veg. non Bertol, di cui è sinonimo la Atropa Mandragora Bertol. Sibth. et Sm. fl. gr. III p. 26 tab. 232 e la M. officinarum Bertol. l.c. tab. 2. non L.

M. mandragora Bertol. di cui è sinonimo la M. autumnalis Bertol. l.c. tab. 3. e non dello Syn.

L'errore del Bertoloni fu reso più grave dal fatto che egli non conobbe e genuina appunto non conosciuto. Da tutte quelle che ho dedotte, che l'opinione da me esposta nella Flora dalmatica Vol 2. p. 236 che la Mandragora officinarum del Linneo, non fosse quella esposta dal Bertoloni, ma l'altra Mandragora della Flora greca, ne incontra la M. mas degli antichi a quella che il Bertoloni chiamò M. acaulis non più nemmeno confermata dal tipo del Bertoloni (premesso che appartiene alla M. officinalis del Bertoloni e non già alla M. officinarum del Bertoloni, come del solo esame critico della descrizione linneana io aveva già sospettato e pubblicato nell'opera stampata nel 1844. Malgrado ciò il Bertoloni nell'opera di cui fu di sopra nel 1844 ha specie europee di Mandragora dubbie, per nessuna così Mandragora officinarum L. di cui è sinonimo la M. acaulis Bertol. M. autumnalis Syn. syst. veg. non Bertol, di cui è sinonimo la Atropa Mandragora Bertol. Sibth. et Sm. fl. gr. III p. 26 tab. 232 e la M. officinarum Bertol. l.c. tab. 2. non L.

M. mandragora Bertol. di cui è sinonimo la M. autumnalis Bertol. l.c. tab. 3. e non dello Syn.

Sect. I. Prod. Sebbene la vera pianta di Linneo sia la M. officinarum Bertol. e non la M. officinalis Bertol. che è quella che il Bertoloni chiamò M. officinarum Bertol.

di sua penna è stato è segnato il nome generico colla sola limitazione a penna nelle ~~esiccate~~ delle ~~esiccate~~ p. pl. ed I. che adoperava il Linneo.

Tutti si nota che questo esiccato di Linneo fu collocato nell'Orto botanico d'Upsal, e che le piante lo compongono colle erbarie del Banks. Nel stylis inaccessis a quelle che lo contiene, ami in altra ~~esiccata~~ con egual nome posteriormente ~~a mano~~ le piante interrogatorie a Leyss, che parmi essere la ~~Solanum~~ Nicotiana pubiana L., ed a questo stylis si è venuto un altro che parmi ~~la~~ Solanum mentiana ed ~~una~~ Escludendo pertanto dal Th. Leyss L. le due ~~una~~ specie cancellate, ~~sono~~ tutte le rimanenti specie di Th. Leyss e affini ~~sono~~ possono riprendere senza difficoltà all'esiccato primo dell'erbario Linneano, ~~non~~ non per a prima giunta potersi ~~corrispondere~~ ad essi riferire ni le diagnosi delle specie plantarum (Hooker interessante specierum caule suffruticoso erecto) nè i disegni e le figure del Bauhin, del Clusio e del Bauhier, che corrispondono a queste diagnosi ~~non non~~ e ~~diversificano~~ dall'esiccato suddetto. - Pure esaminati accuratamente molti fogli del Th. aiculaiy W. K. comunicatimi nè colli opere della Dalmazia, che pure per consenso di tutti che ispezionarono il Th. Leyss dell'erbario di Linneo si riguardi perpetuamente, ho potuto vegliare come alcune volte i caulis anche in questa specie ~~mere~~ più robusti e più robusti e diritti, e l'infiorescenza ~~superiore~~ ancora limitata al solo capitolo terminale, come capitata di due tre o più verticilli l'un corrispondente all'altri nel medesimo caule, ~~ma~~ e potrebbe persuadermi, che le diagnosi del Linneo e le figure di lui citate se non esprimono la forma più comune del Th. Leyss ~~[illegible]~~ siano nell'autentico dell'erbario, possono però essere state tratte da altra forma più rispondente alla medesima specie, ~~[illegible]~~ ~~specie~~ specie. In un esiccato collocato dell'Orto Botanico di Madrid ho pure osservato esservi fatti rigidi e diritti i caulis, e l'infiorescenza verticillata. - Quanto poi alla identità di specie fra il Th. Leyss e ~~Linneo~~ e quella della flora graeca essa mi risulta evidente dal confronto di una pianta del primo coi fogli antichi dal luogo classico primo citato ove vuolsi la sua pianta lo Lobthorpe ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~la stessa Bauhin~~ (H. Lindl. XII p. 201) riferisce la pianta ~~[illegible]~~ al ~~sua~~ Th. aegyptiacum Pers. o Th. Leyss L. mentre poi ne riporta il ~~nome~~ nome e la figura del H. p. t. 574 al Th. Linneo Vahl - Il Th. Linneo Vahl e per le osservazioni del Fresen che ne vidi l'autentico rispondono per quanto da una ispezione nell'erbario di Dc una differenza pianta del Th. Leyss ma per l'ispezione ai per le tipici piante un po' più larghe, per ispezione l'un e l'altra di varia antichità.

~~Thymus Zygis. L. sp. pl. ed. I. tom. 1. p. 591. ed. II. 2. p. 826.~~

Questo ~~nome~~ nome fu ~~[illegible]~~ applicato a diverse piante e lo stesso esemplare dell'erbario linneano secondo il Persoon appartiene al Th. Zygis di L. e di Sibthorp, al Th. hirtus di Ehrh. al Th. serpyllum di Vahl al Th. serpyllum Den. ed al Th. acinoides di Willd. e Kit, mentre invece secondo il Bentham quell'esemplare non appartiene già al Th. Zygis della flora greca ma piuttosto al Th. acinoides W. et Kit, il Th. serpyllum Den, e quelle altre cose a riunirsi al Th. angustifolius del Persoon. Nel detto erbario sonvi più esemplari. Nel primo foglio avvi un Thymus affatto simile al Th. acinoides della flora Lunganese, a cui alcuni rami alcuni decumbenti, e questi possono rappresentare la vera specie Th. Zygis L., da cui però differisce per i fiori. Thymus vulgaris rizidius simile Bauh. hist. 2. p. 271. Thymus angustifolius longiusculus folio Bauh. ic. 777, e serpyllum ligustri Zygis dictum Clus. hist. 1. p. 358, le cui figure rappresentano piante fornite di caratteri differenti da quelle, cioè con tronchi diritti e fiori disposti in più verticilli successivi e fra di loro distanti.

Thymus Zygis.

Anche per questa pianta son diversi i pareri: ~~Oltre~~ ~~alcuni~~ gran numero di botanici ~~essendo la~~ per quali il Bauhin ~~[illegible]~~ ritiene per Th. Zygis L. sp. pl. ed. I. tom. 1. p. 591 et ed. II. 2. p. 826 il Th. angustifolius Pers. ench. 2. p. 130, e vi associa il Th. acinoides Willd. et K. Th. odoratissimus Bieb. a tronchi eretti, Th. serpyllum Den. ecc., ma ne esclude il Th. Zygis Sibth. et Sm. fl. gr. vi. p. 60 tab. 574, che invece riferiscono al Th. striatus Vahl — che il Linneo e il Sibthorp — Altri botanici per quali il Persoon il Bentham riunirono in una sola specie il Th. Zygis di ~~Linneo e del Sibthorp~~ questi due autori ed il Th. striatus Vahl di cui il Persoon ~~[illegible]~~ riguardò la medesima specie anche il Th. Zygis L. considerò piuttosto come un autentico Zygis.

La grande somiglianza dei due Zygis tra loro, e la mutabilità già notata di caratteri del genere stesso fanno, di colpo e tutto in ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

Statice reticulata. L'esaplon che fa nell'estremo è glabro, a forma di piccolo lanceolato-obovato, acuminato, quadripunto, a punti eretto, a rami nudi tutti da un lato, a fiori rad. in spiche, e questi fiori di sovra limaon d'un giallo incarnato. Dietro il foglio ove è attaccato sta scritto Limonia monspeliensium minus. A questo saggio mancano tutti i caratteri dati dal Linneo alla sua Statice reticulata sp. pl. ed. 1. v. 1. p. 275, e specialmente il caule prostrato i rami diffusi ritorti, mentre quelli del Sauvages sono rami bimustiffi, del Plukenetio virgulis ascendentibus rufescentibus, ni vi corrisponde punto la figura del Pluk. almag. 221. t. 42. f. 4. e meno ancora quella del Bauh. pl. ic. 83. t. 44. Somiglia piuttosto ai saggi della Statice cordata nell'estremità, ma ignoro per qual motivo si sia detta pianta creata dal Rottb. e dal Bosquier. ~~Statice minuta. Il saggio dell'erbario ha foglie fitte brevissime cordate o rovesciate, quasi sessili, e chiari rami tutti eretti, di rimidi fiori, nel che differisce da tutte le specie il quale e nulla meno si comprende come gli altri abbia potuto asserire che Linneo non l'abbia veduta! L'avere citato ad essa, come gli avevano per altro pianta, sinonimi e figure che non vi appartengono non dovrebbe ch'egli non conoscesse ~~ancor~~ ~~pianta~~ la detta specie, ed il fatto che la vi si trova tuttavia nell'erbario ~~fino ancora~~ l'opposto. Intanto solo a credersi in questo esaplon ~~riferito~~ ~~ad~~ ~~specie~~ ~~Statice cordata~~ ~~come~~ la pianta Linneana come ~~affermò~~ ~~implicitamente~~ ~~il~~ ~~che~~ ~~dichiarò~~ ~~Statice~~ ~~Bosquier~~ ~~il~~ ~~Bosquier~~ ~~il~~ ~~Bosquier~~ ~~il

2. Nel fascicolo dell'Erbario Linneano che contiene il genere Spondias avvi un saggio di pianta ombrellifera composta di un fusto erbaceo che porta tre rami ognuno di quelli finisce con un ombrella di fiori. Questo fusto sembra uscire da un ceppo legnoso in mezzo ai fogli a cui la pianta è inestellata, e da ciascun lato dal lato della ella dal ceppo una foglia inestellata quasi ella ne separamento del primo.

A questo saggio sono apposti tre nomi a lapis e con carattere dello Smith, an Laserpitium fruticosum, Athamanta annua aut cretica. L'aspetto generale di questo saggio, la forma globosa delle ombrelle, le foglie coronanti con foglioline filiformi, l'involucello filiforme a denti acuminati, il tormento al pari dei frutti mi fecero immediatamente ravvisare in lui la pianta che il Linneo non avea stato denominata e che lo Smith con il Lyptophyllum per la somiglianza dei caratteri con più meno riferito appresso con dubbio tra due indicate le nomi, avea appresso con dubbio tra nomi, di piante delle quali quella dell'Aegopodium e di tutte e tre nessuno di quelli le appartiene essendo di specie di genere, nell'altro esposto il Seseli globiferum della flora danica III p. 41. tab. III f. 1.

Autorizzato ed anzi animato ad apporre il nome Lyptophyllum dal che legnatane dello Smith Linneano sig. Riccardo Viviani, ch'era presente a questa ricognizione, e che l'era convinto col confronto fatto del saggio colla descrizione e figura del Seseli globiferum nell'opera sopra citata, ho apposto il saggio che ora è alcun dubbio alla pianta del Linneo, e ho riposto il nome di questo, ben tanto di trovato nell'erbario che la pianta era stata indi del giardino botanico moderno un fatto prima che io la coltivassi vivo in Bologna e che dopo.

Quanto alla grossezza del tubo laggiù non avvi nel foglio cui è attaccato alcuna indicazione da cui dipenda. Pur egli è molto probabile che anche allora fu stato commesso al tubo con altri della Bologna dell'Ardenio.

Colchicum montanum L. hub. n. 2.

Il saggio presente una pianta sempre bulbosa, con due fiori, con foglie bislunghe-lanceolate piane (~~non fiori, foglie [illegible] per allattarsi~~), brevi, erette, glabre nel margine. Le divisioni del perianzio sono lanceolate d'un ~~[illegible]~~ colore porporino da 9 a 12 ~~[illegible]~~ nervature, delle quali le più esterne talora sono un poco ramificate. Le filamenti degli stami son gracili ma sono assottigliandosi verso l'apice; le antere sono bislunghe, alla base bilobe. Gli stili sono sotto il nome specifico del Colchicum montanum nelle osservazioni della Sp. fl. ed. I. p. 342 che adducevano il Linneo avrì la timidità a porre [illegible] ad appresso del Linneo quando ~~[illegible]~~ possedeva nell'erbario ~~non specifico di questa~~ la specie da lui descritta in quel libro. Malgrado ciò lo Smith nell'erbario stesso fel polizzino del nome linneano dopo 2 – montanum (Sacchi Edoardo Smith) non sospettò minime J. E. S., e del lato opposto = An Bulbocodium ornatum? vix J. E. S. Difatti non può questo saggio essere un Bulbocodium perchè in questo lo stilo è semplice, e nel saggio in esame gli stili son evidentemente tre come nei Colchici. – ~~La pianta~~ Ora il Colchicum montanum dell'erbario linneano ~~non è pianta~~ diverso dal C. montanum del Bertol., come dal confronto accurato da me fatto delle piante linneane colle italiane e colle descritte evidentemente mi risultò. Egli è un vero che nelle ~~[illegible]~~ piante, secondo l'erbario, le foglie sono più brevi, più dritte più piane, mentre per lo più nelle altre son più lunghe, più patenti ricurve, ed anche piegate a doccia, ma questi tre caratteri sono verisimilissimi in queste piante e l'ultimo mi ~~[illegible]~~ pare delle loro diversità. E poi (per cui molti [illegible] in [illegible] fondano una differenza) (Bert. Fit. IV p. 278) uno il Gaspare altri potrebbe affermare al Bertoloni, che nell'erbario del Linneo da lui visto mancasse il saggio del Colchicum montanum di questo, mentre questo non solo v'è, ma è confermato l'autenticità dal n.° 2. che porta quel saggio nell'erbario ~~[illegible]~~ corrisponde al numero stesso della Sp. fl. ed. I. ~~[illegible]~~ in quel libro. Mossi pure le lineette a penna che comprova essere questa la pianta del Linneo della per C. montanum. Questo non potrebbe però essere confermato come opposta a pianta non più dritta, ma ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

Senecio nebrodensis L. sp. pl. ed. II. p. 1217

Nell'erbario Linneano mancava già nel 1862 allorchè io vi studiava, qualche esiccata che rispondesse al sopradetto nome. Ma questa esiccata si trova anni prima, sicchè il Gussone non avrebbe potuto stampare nel 1843 nella sua Flor. Sic. syn. vol. 2 p. 425 a proposito di questa specie: "Senecio Lin. in plantis preserti quoad radicem nutantem, differt, sed specimen herbarii ipsius variantem a. vitibit." Nell'esiccata Linneana della sp. pl. ed. 2 del 1763 citata nella letteratura Linneana alla nel vol. 2 p. 1217 sicchè la descrizione che di il Linneo di Sol piccolo, alla parte folii di Erba scrupi aggiunta di nuovo dal L. stesso l'epiteto pubblicato, lio forse avrebbe egli studiato, anche dopo pubblicata la seconda edizione del detto libro l'esiccata adunque è ora che si è avvenuto? All'esame di questa non risulta che l'obiegan e l'esiccata Anthemis Cota et A. altissima che il Nebrodensis, specie questa stessa I saggi di tali piante nell'erbario Linneano non fan diversi di specie, locchè conferma la riunione operata delle dette due specie in una nelle Flor. Dalmatica 2 p. 78, conservando il nome di A. Cota come più antico, perchè i caratteri già del Mertens, e volgendo ultimo fermarsi fin dai tempi di questo.

Anthemis pergrina.

Al nome di questa pianta è seguita nell'erbario di mano dello Smith le parole Syst. veg. X. di questa pianta apici dubia perchè dovuta del Linno in quel ms. lett. al Linnè. Vol. pinnatifid, foliolis subtrifidis, caule erectiusculo subtomento, receptac. subconvexis s. X. p. 1223 n. 3. — Non si oppone nemmeno ne indicazione di patria ove nell'erbario Linneano un solo a pedunculo lunghi cilindrici, per cui si differenzia dall'Anthemis ~~[illegible]~~ o A. tomentosa Sow. non L. e si avvicina, ~~tanto~~ da confondersi, all'A. tomentosa L. herb., piuttostrato alla A. montana L., alla quale il Gussone riferì la detta A. tomentosa dell'erbario medesimo. (V. Gussone fl. sic. syn. II. p. 488)