

3.
Classis I. Monandria.

Character. Plantae floribus Stamine unico praeditis exornati.

Ordo I. Monogynia

Charact. Flores stylo unico praediti.

Genera.

- I. Centranthus
- II. Zostera
- III. Hippuris

Ordo II. Digynia

Charact. Flores stylis duobus praediti.

Genera.

- IV. Callitriche
- V. Psilurus

Ordo III. Tetragynia

Char. Flores stylis pluribus praediti.

Genus.

- VI. Zannichellia

Tabula analytica Generum.

classis Monandrice

Plantae.

1	Floribus stylo unico praeditis. Sid. $N = 2$	Floribus stylis pluribus praeditis. Sid. $N = 11$	
2	Floribus apetalis	2	Floribus corollatis
3	Spadii alterne impositis <u>Zosteræ II</u>	<u>Centranthus. I</u> axillis foliorum insidentibus <u>Hippuris. III</u>	
4	Stylis geminis	5	Stylis pluribus <u>Zannichellia. VI.</u>
5	Floribus axillaribus <u>Callitriche. IV</u>	Floribus spicatis <u>Psilurus. V.</u>	

Ordo I Monogynia
I Centaureus.

De Cand. fl. franc. vol. IV. p. 238.

Ch. Flores corymboso-paniculati. Calyx mango integer inaequalis, demum in pappum plumosum abiens. Corolla supera infundibuliformis inequaliter quinqueloba, tubo subulato basi calcarato. foveola uniloculari monosperma pappo plumoso coronata. ord. nat. Valerianee De C.
1. Centaureus ruber De C. fl. fr. v. IV. p. 239. Reichenb. fl. succ. 1. p. 197.
C. foliis integris ovatis lanceolatis superioribus acuminatis, floribus corymbosis.

Syn. Valeriana rubra A. Linn. Sp. pl. 1. p. 44. Host fl. austr. 1. p. 24.
Aldch. fl. jadr. p. 15.

Icon Lamarck Enc. bot. pl. 24. f. 2.
Engl. botan. 4. 1821.

Morison Hist. v. sect. 7. l. 11. f. 15.

Rivini. monsp. tab. 2. f. 2.

Hab. ad muros domorum viui. Perasto prope Cattaro. Flores rubri. Floret
Julio. Augusto. 7.

II Zosteria L.

Ch. Spadix oblongus uno latere florifer e spatula plana folioea ma-
die rima dehiscente procedens. Anthera sessilis gemini opposita.
Stamen ovatum stylis brevi, stigma bipartito. foveola elliptica mo-
nosperma. ord. nat. Potamee Nuss. in Dict. Sc. natur. tom XLIII.

2. Zosteria marina Linn. Sp. pl. 2. p. 1374. Visian. stirp. dalm. p. 51. Host fl.
austr. 1. p. 1. Reichenb. fl. succ. 1. p. 6. Aldch. fl. jadr. p. 2.

Herba sub mare densa, radice fibrosa, caule tereti basi radicante,
foliis gramineis linearibus obtusis integerrimis alternis basi vaginanti-
bus, sterilibus longissimis, fertilibus spatulaceis brevioribus
supra basin rima dehiscens, e qua spadix florifer prode-
it ovarij antherisque alternis crustis.

Icon. Lam. Enc. bot. pl. 737.
Engl. bot. 4. 1821.

Julye. *Joga. Scitina. Porost.*

Hab. in mari frequens. Floret Augusto. Septembri. 7.

Usus. Pitius in valendis vulgo adhibetur.

III. Hippuris. L.

Ch. Flores axillares apetalis. Calyx ovario adnatus limbo precissimo integro Staminiifero. Stylus lateralis filiformis anthere sulco recurvus. Sarcocolla monosperma subrotunda calyce coronata. ord. nat. Haloragae. R. Brown.

3. *Hippuris vulgaris. L. sp. pl. 1. p. 6. Herb. fl. austr. 1. p. 1. Reichb. fl. ex. 3. p. 692.*

H. foliis verticillatis pluribus linearibus.

Icon. Bulliard Herb. De la Fr. tab. 265.

Fior. Danic. tab. 87.

Engl. bot. 1. 763.

Hab. in aquis fluvii Narenta. Flores sessiles minimi viriduli. Floret Mayo. Junio. 7.

Obs. In nostro folia dena vel etiam duodena & quoque caulis articulati geniculo verticilli modo prodeuntia, quorum inferiora et aquis immersa, reflexa et quidquam latiora, emersa autem, erecto-patentia et angusta. Cuiusmodi H. vulgare s. fluviale.
Hoffm. germ. 3. p. 1.

Ordo II Digynia

IV Salitriche L.

Ch. Flores axillares apetalis. Calyx nullus aut rudimentum. Bracteolae binae oppositae falcatae petaloideae. Diercedilibus coactis monospermis concrescentibus compressis extus marginalibus. ord. nat. Haloragae. R. Brown.

4. *Salitriche verna L. sp. pl. 1. p. 6. Reichenb. fl. ex. 3. p. 753. alsch. fl. jard. p. 2*