

8 Phytum saxatile miki.

P. glabrum rigidum, caule tereti simplicissimo striato subnudo, foliis radicalibus lanceolatis
coniatis undulatis margine cartilagineo denticulatis, caulinis paucis squamiformibus;
florum subsessilem fasciculatim in apicem elongatum tantum late digestis 2p.

In collibus lapidosis stercoribus prope Rosiza inter Verzova et Suppa. Floret Julio.

Obs. Folia campanulata lobulatis quaedam formam, margine tenuissime dilatata.

11 Anthriscus dichotoma miki.

A. glabro, caulibus striatis dichotomis geniculatis tenuibus, foliis ternatis petiolatis, foliis
ly late ovatis basi obliquis inciso-pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis, viximus flouso-ci-
liatis margine membranaceis, umbellis axillaribus terminalibusque multiradiatis, invo-
luco ~~sub~~ monophyllis lanceolatis, involuclis polyphyllis ovatis lanceolatis reflexis acumi-
natis margine membranaceis, fructibus mucronatis tuberculosis fusiformibus, stylis divergentibus.

Hab. in monte Sella supra Ascrivium. Floret Junio.

Obs. Ex Anthrisci speciebus a cal. Sprengelio enumeratis in Syst. veg. 1. p. 904, uni A.
pennaroidi miki ignote videtur affinis, a qua tamen, ex diagnosi, differt caulibus dichotomis
geniculatis tenuibus, foliis minus compositis, laciniis glabris latioribus viximus floccosis margine
tantum serratis, umbellis axillaribus terminalibusque. An ♂?

12. Athamanta flavescens miki.

A. diffusa, caule sulcato cano scabro verticillatim ramisifera; foliis ternatis superne com-
positis glabris, foliolis linearibus subulatis mucronatis; umbellis multiradiatis axillaribus
terminalibusque, involuclis omnibus polyphyllis lanceolatis linearibus; seminibus pili-
cosis substellatis 2p.

Hab. in rupestribus Mandrii, Ozei, mont. Diokari, Nagusa, Ascrivi. Fl. Junio Julio.

Lyn. Athamanta ramosissima Portenschl. Herb. non Link.

— verticillata Ejusd. et Trattinn. En. pl. salm. p. 14 tab. 4 non Smith.

Obs. Flores e viridi flavescentes foetidi. Non mala.

13. Selinum inequale miki

S. glabrum, caule erecto striato ramoso, foliis petiolatis pinnatis, inferiorum foliolis
ovatis cuneatis inciso-pinnatifidis laciniis ovatis lanceolatisque integris margine scabris
subtus venosis, superiorum foliolis lanceolatis subintegris; involuco monophyllis vel
nullo, radiis umbellae valde inequalibus. ♂

Hab. circa pagum Verliko in herbidiis, prat. Fl. Octobri.

Obs. Flores subtus, fructusque rubri

12. Seseli ramosissimum nichi.

S. caule glaucum rigidum glabrum, aule duro flexuoso nodoso striato divaricatione ramosissi-
mo; foliis ternato-pinnatis petiolatis, foliolis trifidis basi linearibus indivisis, laciniis
linearibus mucronatis divergentibus integris, umbellulis axillaribus terminalibusque nu-
merosis pauciradiatis, umbellulis minimis densifloris; involucri omnibus lanceolato-li-
nearibus margine serratis, fructibus scabris. ♂

Hab. in locis sterilibus circa Dernj, Dorvete, et in agro Splatensi. Sept. Octobr.

13. Pragium dissectum nichi.

P. caule elato ramoso glabro striato, basi pilis reflexis canescente; foliis inferioribus
pinnatis subrotundis duplicato-dentatis, basi obliquis integris, impari subcordatis, caulium
multifidis, laciniis unciniformibus linearibusque, umbellulis multiradiatis. ♂

Hab. ad sepes et margines agrorum totius Dalmatiae. Fl. aestate.

Obs. An varietas P. Columnae Spr.? Videtur differre directione, nam annuandus est, pube
retrotra ad basim caulium ceteroquin glabri, et propestrum compositione, magnitudine
et forma foliorum caulinozum, quae bipinnatifida vel etiam tripinnatifida sunt, dum
in illo obsolete vel foliolis minutis integris instructa. Herba insuper insipida, in eodem
umbellulis multiradiatis, radiis nempe 12-20 et amplius.

14. Ornithogalum saxatile nichi.

O. scapo recto, foliis glaucis unicoloribus canaliculatis late linearibus ciliatis, racemo sub-
voto; bracteis lanceolato-linearibus longe acuminatis florum equantibus; pedunculis
fructiferis erectis; petalis oblongis, alternis obtusis; filamentis subulatis basi lobatis;

In saxosis agri Scardonitani, Sibenicensis. Fl. Aprili

Obs. Simile O. comoso, a quo differt foliis ciliatis latioribus, et racemo longiore. An-
tem ac O. collinum Gussone Ind. semin. anni 1825 vel ac O. garzanicum Genove
App. ad Ind. sem. anni 1827? quae mihi ignota. Videtur tamen ab illo differre
quia nullam habet cum O. nana similitudinem cui O. collinum omnino simile ex
est Auctorum, qui propter hoc nullam speciei descriptionem dedit; ab altero scapo recto, et pe-
dunculis racemosis non corymbosis.

15. Scilla amphystina nichi

S. bulbo glabro, foliis lanceolatis acuminatis glabris planis; scapo folia subaequante, racem albu-
viatis pedunculis coloratis parvis; bracteis parvis amplexantibus, corollae plane laciniis vasis
obtusis, antheris basi bifidis 2p.

Hab. in partibus vasis circa Salonay. Floret Majo.