Polygraphia Delmedica

ossia

Piante simili pure trovate in Delmedica

Si pubblica a Ferrara tutte le piante simili che si conoscono, prendendo di esaminare, prima di venire in esame che si riferiscono ai essi. Siccome alle antiche generali geografiche, si devono tagliare attorno ai spirito la bocca, anche per la posizione che con accenna per mezzo che tutti gli operatori concorrono ad riunirsi la posizione degli stessi filosofi alla necessità, e le bestie si devono dipingere alla che si dipingono in parte e se in proporzione i capi. Quelle che portano di questi simili sono il de Bruch, il Lang, e l'opera l'Etrusco.

Filiny

Adventity sibleane Etrusc. nota tab. II. f. 2. 2. a. Se si dà la figura parti tutte di sopra due si possono essi ordine le varie tere e le loro disposizioni, con accidente che ciascuna dipendono

l'Etrusc. tab XIV. f. 3. Alla in Gran di Roma

Lastri polygraphy ejusdem tab. III. f. 7. 7. a. 8. Se dal l'Etrusc. dipende l'Etrusc. tab. II. III. il nome di Gemistij polygraphy ne ottenne poi la figura di pianta adatta non dipende di pianta pubblica dell'Etrusc. un disegno con giorno di lui non pubblica tanto dopo alle altre di pitti, ordine ognuno dipende. Così la figura con dipendente 7. a. onde per ordine egli le notizie di maggior e la disposizione di nomi. Alcuni le opere dell'Etrusc. come alle Gemistij ordine con figure Volantij opere e pitti gente disposte ritratti alle Lastrine ordine; principalmente dei Gemistij. — Anche le Gemistij dicono la opinione alle Lastrine; Nonostante non ne rendere il nome nome dopo dei Etrusc. o Etrusc. Padre Lagna stato pubblica Chardy dicono Etrusc. Gemistij non è parlato sicuro l'Etrusc. bene i nomi secondari opere o tab. dettami alle Etrusc. e molte opere sono ripetendone dettami, e con una trasposizione, che fra opinione alle figure in opere nuovo.

Nuovi non è parlato il nome ordine non fingendo verso l'opera in nuove pitture, ma le opere si ordine ordine per alle cose

Otrusci non è parlato la cosa opera e opinione. ordine Vulle

ne nome

Lagna

Dichroptichij - i vetrij per le macchine pendenti verticali, con le lente
non è bisogno come in quelle.

Clathroptichij? Lanzeana tab. II. f. 1.5. tab. 1. f. 8
Jacquetij minuscula Cap. i 68. [illegible] h. bois

fronde ----- piccoli ~~lungi~~ (late) obbligij ogni obbligij marginali rotondi - cubetij,
tubetyrigi, costa cubetijsum, nervij secondarij (ob) angolo acutissimo exorientij,
nervij costam excurrentij, parallelij, ventij, [illegible] transversum apud conjunctij
axillij ~~[illegible]~~ quadilateralij -

La pianta delle piante è assai varia, lunga (7-8 cent.) la lobyg. potabile 15 ad 16 cent.
la costa grossa fino a più di 3 millim. l'ogni pianta obbligij, è ~~[illegible]~~ raro
esserne ~~[illegible]~~ della costa ~~[illegible]~~, nervi ad alternata
obbligij prima divergono ad angolo acutissimo, poi alla loro
obliqui per lo loro corso il margine. Tutte le nervi vicine generalmente
angolo retto, o quasi alla obbligij, e spesso in tutto l'ovvero alla
delle anche triangolari acuti, triangolari, ovvero (affine rarissimo)
quadrate, per lo più trapezoidali, talora rotondi, e perfino
rotondi. — La fig. 8. tab. ~~[illegible]~~ 1. rappresenta una pianta. Nel
piede di questa pianta si giudica natura: la tav. 2. f. 1. rappresenta una
~~o tre piante~~ minuscolo. Nella stessa, di cui la fig. 1. a. rappresenta una
pianta ingrandita per fare vedere in 6 come sopravvenne della
costa e nervi secondarij, ed in a la rete vivente. La fig. 5. rappresenta
l'ingrandimento più perfetto della sua rete, dove si vedono il margine cubetij
e la grossa costa cubetijsum. La fig. 5. a. offre un pezzo di pianta
ingrandita alla 4 per fare vedere in a e in b come [illegible]
nelle figure 1. a. della stessa tavola. Finalmente la fig. 1. b della
stessa tavola II. rappresenta una pianta ingrandita della
fronde per fare meglio vedere la forma della rete vivente.

Clathroptichij? nervifilum Cap. tab. 1. f. 1.2.3.4.

fronde ----- piccoli ellittici - lanceolatij, ~~[illegible]~~ convessi - inclinati, margine obliquij ~~[illegible]~~
obliqui alternij, nervi quasi obliquij, costa cubetijsum ~~[illegible]~~ extensum canaliculata ~~[illegible]~~
nervij secondarij ad in angolo acuto.

La pianta è lanceolato-ellittica, lunga dai 6 agli 8 cent., larga nel mezzo 2-3, la costa
~~[illegible]~~ 1½ millim. di ~~[illegible]~~ larghezza, 2. di altezza, i nervi in gran più numerosi, che
anche più ~~[illegible]~~ che nelle piante, perciò tutto il resto eguali. La fig.
1.3.4 rappresenta diversi pezzi di piante ingrandite; la 2. pezzo della radicale
per fare vedere la pianta e la venatura — Commune dei Ghiacci geologici
Cotta D. N. 062

Palmacity granorzyj Vij. tab. 1. f. 6.

Frucij i zupełnie bezpłatnie stawki, circulizij semibrunij granoty
stałej w gniazdach dyfrbej

he stróż ono cłoi dopełni, i ofiarę autor fryzu la circulizi familiarnej
he gołi fryzu długie dei 13 ai 15 mill. frosei 2-3 mill. alle 1.
Per il carattere delle circulizi non si circulizi ad alcun Polmacity
primi dopełnie; i grano al P. tangelgij Hep. e P. carlicelly Ster
ma ne dempsen gardi il primo mano delle circulizi familiarnej, e
l'altro ha le stroki più fen - più regolari

Hirgendrofyllum hep. ind. Vsf. tab. VI f. 1-2
fbiij pathelij corazij, petrolo unguje alto-arbuello, bacca obovata obliqui
cort conspicua, nubiij Ofrbij

Di zoppe gente un fi circuno - gorgi in che li spuri, i Th. Elbyffbiji
Mosl. l'H. scalgeber ej l'H. tangelbaje ej. ed l'H.
i bragnoi de Bobej - Nbrzyje bacoi Albuni bacoi; ma
non un fu trovato che un solo specie nel circuno d'Europa.

Schyffo nerofo i del Pomeran scuro e cinere
nerofo bianco i d. Sarr alle pelli del Pomeran bianco

Il nerovo genere di pelli ha l'aspetto sommamente simile alle d'acqui
pirsky, ma ne differisce perchè in questo i nervi laterali alle
coste sono semplicissimi in tutta la loro lunghezza (J. Hai Mayri Elbyff.
e J. Eckardti Germar (V. Elbyff. H. d. Vorw. tab. XIII) o solo bifurcato
una o al più due volte poco lungi dalla coste da cui nascono
(J. asplenirdy Elbyff. l. c. tab. XI) Je, e J. marmulaea
Elbyff l.c. tab XII f. 3.) J. Schaeuleini Elbyff. tab. XII f. 2. mentre
nel nostro i nervi laterali sono composti per di loro ~~più~~ ossia ramificati
perpendicolari al nervo - Quanto nerovo più simile ancora è
ad alcuni Gobiosfrizij (J. Brownianus Bryce hesp. des reg. p. 11 pl. 62.) ~~ecc.~~
ma a questa mancano i nervi secondarii paralleli, che si trovano nel fossile di
Bologna, e che tolto vedono quelli analoghi della J. marmulaea, mentre
nelle Gobiosfrizij tutti i nervi ~~pari~~ compresi in tutti i pesci in una vera
- ungli obliqui.

Malgrado più anzi formulato è il vero fondo alle Sagenopteris fog. per la rotazione dei nervi, non si pongono non sono i nervi secondarii così numerosi e sovente obliquamente paralleli dalla costa fino al margine delle foglie nelle maggiori sono esagonoide, con quadrilateri, con due lati, paralleli ai più lunghi – Le Sagenopteris furono trovate sole nel terreno jurassico d'Italia e del Giap. ed anche nel terreno carbonifero

è non può che il Goepp nei gatt. d. Kreideff. lief. VI-VI. tab. 15-16 nelle fig. 1-e 5 della tav. XV-e XVI nessun indizio i nervi secondarii che andano sino al margine, e nel carattere del genere Sagenopteris (l. c. p. 113 dice nervi secondarii terminicini, numerosi, regolari = e nota la somiglianza delle Sagenopteris a molte Aerophiteae e specialmente alle A. aureum L. A. speciosum W. A. danaeaeformum Langsd. et Fisch. alle grandi spiriti di ovulae sensibili, e alle Pteris dichotoma, Pt. Henkeana, Pt. podot (Lithrachia Presl.) Quanto al Medio non si significano perchè i nervi secondarii non ascendono verso la costa per quasi una metà di venia. Delle Pteris citate non conosco la nervatura, ma le altre Pteris hanno nervi fitti e quasi obliqui – L'Acrostichi accenna ai 10 meglio più di tutti gli altri, e le vene trasverse or sono perpendicolari ai nervi, or oblique.

Dubi affinità Myrsiphyllum ? Schizopteris

1. Nervophyllum Pilleae Nervophyllum sublaxum
Pteris (Pteridophyll.)
2. Sagenopteris lanceolata Langeana
3. Pteris Myrsidodes
4. Laetea polypodioides
5 Blechnum Gramineae Egis.
6. Bajuntiopsis
7 Pecopteris Nephrodes dubia
Myrsiphyllum Sphenopteris
8 Sphenopteris Adiantum
9. Polypodites pomeranicus
Polypodium
Coniopteris Polypodium
Coniopteris
10 Acrostichites plagiopteris
Gymnogramme
11 Sphenopteris

12 Dryandra
Ericaceae
13 Andromeda
Oleaceae
14. Hypnophyllum
Malpighiaceae
15 Hirnea Myrsiphyllum
Sapindaceae
16 Sapindus Sphaltae
17 — Schizopteris
? Polygonum
18 Cinnamomum
Bignoniae
19 Myrsiphyllum
Leguminosae
20 Phoenicites
21 Cinnamomum

Tab. III 1-7.
22. Sphenopteris ? Muscinea indeterm.

Blechnum Brownii Ettgs. — Vid. tab. 1. f. 5

Nè altro fu figurato un pezzo di fronda fertile più grande e più completo di quello dell'Ettgs. Colla fig. 5 a. fu aggiunto un pezzo ingrandito per far vedere la disposizione dei nervi e il margine denticolato. [illegible] alla [illegible] [illegible] fl. [illegible], [illegible] assai per i nervi.

Chondrites [illegible] Ettgs. presenta un [illegible] assai grande di questa specie [illegible] e [illegible] assai [illegible] di [illegible] [illegible], che [illegible] essere [illegible] di questa pianta

Najade dubie.

Sphaerococcites Ettingshausenii Vis. tab. I. f. 2. tab. II. f. 3.

Syn. Flabellaria raphifolia Ettgs. (non Sternb.) fl. foss. tab. III. f. 4.

Sphaerococcites flabelliformis Ettgs. tab. 1. f. 2. 3?

V. Massal. [illegible] del [illegible] ([illegible]) [illegible] figura [illegible] anche la Sphaerococcites flabelliformis Ettgs. del quale figura l'[illegible] [illegible] (tab. ~~[illegible]~~ f. 7.) nel [illegible] [illegible] a. a. le [illegible] [illegible] foglie, [illegible] ma [illegible] [illegible] alga. Nella fig. 3. [illegible] è l'[illegible] figurata dall'Ettgs. [illegible] Flabell.^{a} [illegible] [illegible] [illegible] in a. a. le [illegible] [illegible] il [illegible], [illegible] [illegible] una flabellaria che [illegible] [illegible] delle [illegible]. La fig. 3. a. tab. II. [illegible] le foglie [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ per far vedere la [illegible] delle [illegible] e [illegible] a a ~~[illegible]~~ [illegible] le [illegible] foglie. La [illegible] di questa figura [illegible] è l'[illegible] delle foglie [illegible] con [illegible] [illegible] così ben [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible]? d'altra [illegible], per cui [illegible] il [illegible]?

Conifere

Pinites pelagicus Vis. tab. III. f. 6.

strobili . . . ~~[illegible]~~ [illegible] rhomboidei [illegible] [illegible], [illegible]

exumbonato-laevi

[illegible] le [illegible] di questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] figurata. L'[illegible] [illegible] [illegible] nella [illegible], lunga 7–10 millim. larga 3–4. [illegible] è [illegible] assai ai [illegible] [illegible] del P. [illegible], [illegible], e [illegible].

[illegible] La figura 6. a. rappresenta un pezzo del [illegible] ingrandito per far vedere (a) la [illegible] [illegible]. Questa figura [illegible] [illegible] [illegible], non [illegible] come è nella [illegible].

NB.

Epheridy Stykeney Ely. Vis tab. III f. 3. 4.

si copia la prospe. del Eliss.

La fig. 3. a rappresenta la prospettiva 3. della fig. 3. disegnata per per ordine la situazione del trovarsi e le aperture a. a. di vacui entro a Marmi nell'Eliss. — Lo stesso dessi della fig. 4. a. che rappresenta la fig. 4. equale.

Gruinsacen

Barbyen squellen Ely. Vis pl. del tab. V. f. 5. tab. III f. 5

si copia la descriz. dell'Eliss.

Si dispone due prospettive di queste pietre secondo tali disegni, che nella prima in a. il vuoto, e la il colore ha 3. canali di prospettiva

Astcarpe

Astcarpeder Eglieth Est. colle degrese rappresentate al compasso

Sapindey Eglieth Vis. tab. V. f. 2.

La figura pubblicata dell'Eliss. non fu bene rappresentata, perchè dove erano le tre inegualmente consistenti uniti insieme. Si rimediò con più diverse prove spesse per prova e giudizio del Sapindy dell'Eliss. e trovai (Astr. Bosc.) disegnate per parte nel pubblico i vacui laterali vicini ad angoli più acuti, sono retti e rimangono vicini all'orlo, lasciando nelle carte i vacui laterali fatti in angoli più larghi, qui retti, e sono eleganti arrivati ad unirsi fra loro ad ave vicino il margine. Distingue il Sapindy lamiglia per la tipo degrese.

Sapindy Alnedey Vis tab. V. f. 1. tab. VI. f. 3.

Solidity pentahedrity elongate-elliptity accurately convexity integrity, bifaciality, extrorsity, vacuity sub angulo (45 Grad.) e esse equidistantly arrangedly subflexuosity altherity marginem versus arrangedly conjunctly, vacuity transversity sub angulo fere recto arrangedly, vacuity angulary, vacuity longitudinality formity inter se conjunctly, vacuity vacuo inter angulo vicinity, vacuity longitudinality vicinity vacuo longitudinale.

(*) è il Cappuccino altherity e Gradualmente [illegible] e insieme fatti alli vacuity laterali fatti aiuto sulla Estr.

Stirpe fatta di tutte le specie pietre più di tutte, per la prova al S. Pancratius Nizzal. (Spid. Angel.) non fatti un difetto in quei vacui più acuti, e vicinanti ad angoli più acuti, e per l'opera assai pubblicata acuto. Per la vista l'autore un poco al S. Spirito, e fuori al S. Lamplis. Tab. V. f. 1 a rappresenta una prospettiva delle specie degrese equale per fare ordine in a. la stessa, in b. la prima disegno

Ai Spidy Nizzal Alnedey Lamplis Eliss.

di nervi, in cui le unghie delle vite vengono rappresentate, in cui le unghie vengono inclinate nelle prime.

La Phasellity obtusata Ley. Vij. tab. V. f. 3.

è principalmente distinta per forma, grandezza e numero in tutte le altre Solenia Lapilli Ley. Alcuni particolari rapporti — li angoli formati — non sono altri fatti dalla Lessia di Bertkiana simile alla

C. apodity (Hel Bore)

Il Dorippe negosity Ley. Vij. tab. VI f. 3. ~~Ley~~ (Vena Lunaria)

La Lanice Thyg Ley. ~~[illegible]~~

~~con ogni probabilità spettare al genere~~ Mecrivia Auct. (Hufeyan.)

Vij. tab. III. f. 1.

Hirsea hernity Ley. Vij. tab. V. f. 4.

Adrenale portugen Ley.

Questi si uniti a certe forme del Stenoria acclamation Ley. delle Eugenie Cystitity Ley. Però le ognifi di Adrenale portugen ognuno vite dentro alle fig 5. 6. 9 della Flora di Schyth tab. 23.

(*) La fig 3ª tab VI è a dire una finitezza al Dorippy negosity Ley. però le uni spesi. La l'ogni più accurata Forse la Lanice Thyg Ethy sarebbe giusta di alcuni — questo genere, anzi con ragione potrebbe al genere Mecrivia Auct. gefun.

Dryander
Cohopteria perancipsti Vij. tab. VI f. 4.

pliej obtuse-spatulatis in petiolum attenuatis, apice obtuso, rarius dilatatis, integris, permanentibus, cellis solitis, nervis alternis tenuibus rarius, rarissime ramosis, conjunctis, vix ramosis incrassatis.

Secondo alla Pavonx Longifiorum Ley fl. Stylt tab XXIV f. 23.

ma in differisce perchè quelle ha i nervi che corrono nelle foglie alle sole differite — ogni conjugati; ed ha l'ogni più accurata.

Dryander
Coralla Hagelgum tab. IV

pliej rotunde-ovatis convexis undulatis-bullatis permanentibus margine reflexo-punctis, cellis solitis nervis oppositis alternisque simplicibus parallelis, ~~[illegible]~~ decurrentibus inaequaliter conjunctis, rarius ~~[illegible]~~ anastomosantibus, vix ulla laxa dimplexia polygona.

Foglie coriacee cordiformi bollate, lunghe nell'esplosione 18-20 cent, larghe 12-13 al margine con fiori — Nervi in opposti non alterni reticolati fatti incrociati

di 45 a 60°. [illegible], alquanto paralleli fra loro, e distanti circa fra loro di 2 a 3 cent. Le coste sono in alto poco flessuose; [illegible] [illegible] [illegible] irregolari, [illegible] [illegible] coi lati curvi: il [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] più [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ e [illegible]. Per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] più lungo nella [illegible], più [illegible] nella [illegible]. — La fig. 1. 6 [illegible] [illegible] in [illegible] i [illegible] [illegible], in c la [illegible], in 6 la [illegible] [illegible], in a la [illegible] [illegible]. — Da confrontarsi colla [illegible] [illegible] e Megaphytum? [illegible] Vis. tab. III f. ~~[illegible]~~. 2.

Il caule è grosso da 1 a 3 millim. le [illegible] sono capillari [illegible] capillari [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible], [illegible] il numero delle [illegible]. La [illegible] [illegible] [illegible] alcuni Megaphyllites [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] offrono [illegible] qualche rassomiglianza più o meno lontana.

Piceites ~~[illegible]~~

Cochliocarpus tab. II. f. 6.

~~[illegible]~~ [illegible] cochleatus [illegible].

Frutto spirale con 4 giri della ~~larghezza~~ [illegible] di 12-13 mill. circolare. ogni ciclo ~~[illegible]~~ della grossezza di 2.3 millim. con [illegible] trasversali (fig. 6. a. aa) ~~trasversali~~ [illegible] distanti di 2 a 4 mill. Rassomiglia al frutto di [illegible], [illegible]. [illegible] [illegible] il sospetto che possa appartenere ai [illegible] e [illegible] ~~[illegible]~~ una [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] i [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] sospetto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] grosse [illegible], che [illegible] escludere l'origine animale.

Cochliocarpus scorpioides Vis.

coriaceo