

Presentato liq 18 Giugno 1865 N. 265

Plantae Serbiae

Rariores aut Novae

A Prof. Roberto de Visiani

et
Prof. Josepho Pančić

descriptae

Et Scribis Illustratae

Decas II.

Tab. ~~III~~ ^{VIII} Decima ~~XXI~~ ^{XXII} del volume

Presentato il 18 giugno 1865 - n. 265 -

2

Plantae rubicae
rariores aut novae

Decas II.

XI.

(Silva)

Heliosperma monachorum Vif. et Panc. f. 186.

Tabula VIII, fig. 2. circa grasso

Herb. pediculis caulibus gracilibus ascenduntibus gemulatis, basi pinnatis, apice distichis; foliis inferioribus caulicampis sterilibus, obverse lanceolato-linearibus, sessilibus, acuminatis patentibus, caulicampis linearibus; pedunculis filiformibus, floribus erectis; calycibus turbinate-campulatis, parvis glandulosis, lobis ovato-lanceolatis obtusis hyalinis-marginatis, petalis calyce duplo longioribus quadrifidis, corollae dentibus lanceolatis acuminatis petalis laminae dimidiam aequantibus; capsula campulata ^{sessilibus} rebigata, calyce subaequali, carpophoro suo triplo longiore; seminibus subreniformibus, dorso paleis linearibus dense cristatis.

Syn. Silene monachorum, Vif.

Tab. ~~Tab VIII fig 2. A. Pteropert. et reflex. calyce, amplex. petalis.~~

~~B. Calyx. C. Petalum. D. Capsula. E. Semen: omnia multi aucta.~~

Hab. in saxosis ^{umbrosis} sub rupe Rostara ad ^{mirum lignum} Monasterium Racia Sibiriae occidentalis, ^{in penetra. et in campis ad rivum} ad Derventa rivuli Urganis, in substrato calcareo. Floret Sibiria. Flores albi. Perennans.

DESCR. Planta lanuginosa, superius glabrior, caulibus decumbentibus teretibus, ad gemulos nodos-innervatis, superne in cymam laxissimam divaricato-distichis, ramulis pedunculisque filiformibus. Folia uniuersim integra, in caulium sterilibus apice congeste linear-spathulata, apice basi ^{par longius} attenuata obtusiuscula, petalis longiusculis mollibus lanuginosis; caulicampis sessilibus linearibus acutis glabrioribus. Calyces petalis glandulosis obtusi, in fructu subnudi. Petala obovata, ungue linearis-rhombis, basi cuneata, superius contracta; laminae

ovali, utrinque breviter unidentata, semicordata, venis patentibus, passim
obliteratis, apice obtuse biloba; coronae bicyclitae dentibus elongatis. Sta-
mina sub anthesi exserta, antheris albis. Pistillum stylis tribus fili-
formibus, ovio carpophorum aequante. Capsula dentibus obtusis
reflexis. Semina negro-pardica breviter pediculis cristata.

Obs. Species affinis *H. chromodonta*, Boiss. et Reut., sed quantum video
in specimenibus, a. etl. auct. communicatis statim differt folijs cum
longis petiolis bipinnatis latioribus ac apice, dem in illis tam bpf. quam
apice attenuantibus, ita ut folia supra breviter petiolata videantur
similia prope *H. enophoro* Turcz. (Vest. d. Zool. bot. Seidlich.
Mosc. 1858 p. 38) sive *H. Veselskyi*, Sanka in Linnaea 1858) quod
mihi in visum, sed propter descriptionem ibidem datam diffingui videntur
sub breviora pariter, petiolis foliorum inferiorum lamina comensu-
mibus brevioribus nec illarum subtaceantibus, calyce truncato et glan-
dulis, coronae dentibus nullis brevioribus.

Exp. Icon. III. tab. VIII, fig. 2. A. Flor. apertae et reflexae calyce auctis petalis -
B. calyx - C. Petalum - D. Capsula - E. Semen: omnia nulla aucta

Scabiosa arhaeta Vis. et Panc.

Tabula IX.

S. hennip, inferne cano-pubescentia, superne glabrata, caule erecto ^{brachiato} ramoso striato, folijs bipinnatis-partitis petiolatis, segmentis linearibus obtusiusculis canaliculatis, superioribus pinnatis-partitis sessilibus, superioribus linearibus indivisis; capitulis ovatis basi truncatis, involucri foliolis late lanceolatis, lobis exsertentibus, fructiferis globosis; corollis subconformibus tubo pubescentibus, corona involucri tubo ad cavinas pilosa basi barbata multilobis superata; calyce semli dentibus triangularibus multig.
 Hab. in saxonia arenariis ad ^{circuli} *Trauer* ^{Caithensis in} *Saxonia* meridionali. Flor. lilacinae flor. Julio.

Descrip. Herba tripartita. Radix, juxta specimen, vix perennans, folijs hennip. Folia omnia tenuiter seta, bipinnata-vel pinnato-partita semper breviter petiolata, ambitu oblonga, superioribus linearibus ^{indivisis} sessilibus, pube breviter pubescentia, segmentis anguste linearibus obtusis, saepe pilo apiculatis, super canaliculatis, lobis bi-trifidis, pedunculis elongatis alternis, basi foliolis binis oppositis linearibus longiusculis praeditis, caeterum indivis. Capitula floribus calathiformia, seu basi truncata super convexa, foliolis paucis basi late lanceolatis obtusis mucronata. Corollae lobi exteriores quidquam majores, non radiantes, oblongi, extus pilosuli. Fructus turbinatus lobellus basi barbatus, costis decem apicibus trifurcis in coronam productis, lobis convexis, basi attenuatis, tubo superne latiore indivis; corona scariosa, pellicula subintegra, 30- radiata. Calyx papiferus, seu calyx, sessilibus papulis unius quinque-dentatus, dentibus papae desitibus.

Obs. Similis *S. trinacspica* Vis. et Griseb. a nostra discrepat glabritate, floribus ochroleucis, capitulis ovideis, involucro et papae radiis retatis multo longioribus. Confer etiam sequentem.

Exempl. Non. Tab. IX. A, corolla radii. B, fructus. C, corona cum calyce. D, pars folii: omnia multo aucta.

Labiosa. penarioides Vis. et Panc.

Tabula X.

S. radice crassa lignescente perennans; pube crispula adpressa glau-
co-canescenti; caulibus ^{ramulis, pinnis} bi-trichotomis, angulatis, ramis elongatis
natis; foliis tripinnati-partitis petiolatis, segmentis oblongo-
linearibus obtusiusculis, ^{plis, lacinis} superioribus bipinnati-partitis sessilibus,
superioribus linearibus indivisis; capitulis globosis involucri foliolis
oblongo-linearibus usque longioribus, fructiferis axillaribus; corollis sub-
conformibus extus pilosulis; corone involucri tubi ad carinam
pilose basi barbata multothesis superata; calyce vixili, dentibus
triangulo-setaceis, seta brevissima aut abolita.

Herb. in glareosis, ^{et saxosis} serpentinariis ad Raska circuli Caëkensis Sibiriae
meridionalis. Flores citrini. H. Julio.

Descr. Radix subliguosa et certe perennans. Totae herbae superne e pu-
be adpressa canescente glaucescens. Caulis ex una radice plures
erecti, viriduli, offi eadem pube adpressi, vix bipedi, ^{multiculis} ~~aut tri-~~
pedi, rami bi-trichotomi. Folia ad radicem congesta multiplex,
inferior petiolata, acubita ovata, segmentis ^{omnibus} linearibus-oblongis,
obtusis, ^{alabris} subtus revolutis, venis vix, integris, pilo plus minusve
longo terminatis; superiora tenuia minus densa, segmentis longioribus
tenuioribus, et scitulae ^{scitulae} ~~scitulae~~ vix tenuis longissimi. Cap-
tula florifera subrotunda, corollis omnibus subconformibus, lobis
tamen exterioribus tribus quodam majoribus, extus pilosulis, intus
glabris. Fructus breviter turbinatus decemcostatus, costis convexis
pilosulis, basi barbatis, apicibus triperis in coram productis,culo
profundius versus latius diffusis. Corone scariose pellucida 30-
radiata. Cyathus papiferus sessilibus fereus quinque-dentatus, dentibus triangulo-
attenuatis, ^{basi} apice setaceo, ^{vel nullo}.

Obs. Species haec *S. Welbianae* Don nostri quibusdam similis, hac omni ex
parte major, et foliis omnibus aequaliter tenuifolia, nec inprimis
spatulato-ovatis et sequentibus lysate-pinnatifidis; nec non prope basi
late aut infesta, qui in illa setas exsertit nigros corone depleta longior,
omnino differt. — Similis quoque praecedenti *S. achaetae* G. et P. sed differt
habitu omnino laxiore vegetiore, foliorum lacinulis oblongis nec omnibus duplis vel
quadruplis in partem attenuatis, floribus citrinis vel obscuris. — *S. brevitate* Don. differt
etiam foliis inferioribus lysatis, caule bi-trichotomo, paucifloro, involucri ^{capituli} inferioris capitis

Expl.

Expt. Scov. Feb. X. A, Corolla. B, Fructus. C, Calyx cum pappo —
D. Pars filii: omnia multo aucta.

Hieracium marmorum Pan. et Wj.

Tabula XI.

H. perenne glaucum, pili plumoso-scabris implexis albidis et tuberculo orbi lanatum, caule erecto sulcato foliis, a medio in pedunculos simpliciter perforatos diris; foliis inferioribus obovatis in petiolum alatum decurrentibus, superioribus obovato-oblongis repando-dentatis, basi cordata amplicaulibus, supremis squamoso-reticatis; pedunculis ~~pub.~~ stellato-pilisque longioribus obtusis; capitulis turbinatis binis lanatis; involucri foliis linearibus obtusiusculis, piliis partibus simplicibus, stellatisque brevioribus dorso perspicua obtusis, margine scarioso glabris; involucri ad medium villosis; actinibus rectis pentagonis 10-striatis, apice truncatis denticulatis dilatatis furis, pappo denticulato.

Syn. *H. lanatum* Pan. Verz. n. 1276 (pro parte et quod locum ~~1276~~ ^{Spania}) non al.

Hab. in rupibus marmoris ad ^{et in monte ~~Vidley~~} ~~Sonjak~~ ^{circuli} ~~Toravacensis~~, et ad ~~Podanica~~ ^{et} ~~Manasija~~ ^{circuli} ~~Cyrenensis~~, montis ~~Starica~~ ^{et} ~~circuli~~ ~~Krajnensis~~, montis ~~St. im.~~ ^{et} ~~montis~~ ~~Stanj~~ ^{et} ~~circuli~~ ~~Alektivacensis~~ ^{et} ~~Serbiae~~ ^{et} ~~orientalis~~ ^{et} ~~Ernaschenis~~.
H. aerei. Flor. Sicilia.

Obs. Indumento triplici, tuberculis in caule tandem demudatis albidis, villos in iuro caule ac foliorum marginibus copiosiore, et pedunculis capitulisque pilis simplicibus stellatisque implexis: foliis quoque competentiam potius chartaceam quam pannosam, superioribus basi iugium dilatata ab omnibus ~~Audryaloidis~~ ^{et} quorum rechneri pertinet, abunde diversum — ~~Officina~~ ^{et} tamen *H. tarygeto* Boiss. Diag. fl. or. VII. 15, quod vero differt foliis caulibus basi longe ~~spatulatis~~ ^{attenuatis}, ideoque spatulato-obovatis, nec basi cordata lata amplicaulibus ut in nostro.

Ad plenioram plantae notitiam lubet hic addere descriptionem accuratam

117
Hirum a cl. Schaefferio Bigantino, Compositarum illustratori exi-
nio, profusum Panice communicatum.

Herba perennis, rhizomate lignovente fibroso, apophylloso, dodrantali-
-sesquipedali, dilute viridi-lutescenti, villosa, corymboso paniculato;
caule foliato albentiviride $1\frac{1}{2}$ lin. diametro intente, tereti,
striato, medulla frute, foliorum carina in caule plus minus
decurrente subangulata; Folia 4-2. foll. longa $1\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll. late,
oblongo-ovata, inferius in petiolum late alatum paulo attenuata,
subciliis, oblongo-ovata obtusa apiculata; reliqua oblongo-ovata,
cordata, acuta, omnia denticulata, utriusque, praecipue vero mar-
gine, infra, et carinis pilis elongatis, denticulato-barbellatis (plu-
rimis aut.) villosis, ^{caulis} ad medium ~~caulis~~ in axilla foliorum deorsum
sententiam in ramis ab utraque et brevioribus 1-2 cephalis
foliis parvis ovatis densum in squamis abscissilibus obtusis. Ca-
pitula semper erecta, speciosa multiflora (59 flores numerari)
pedicellis $1\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$, pl. 2 foll. longis imbricatis parce villosis,
sed pilis stellatis dense obtusis. Involucrum obscure canis pilis stelli-
geris dense obtusis, imbricatis villosis varioribus, carina confertioribus,
3 lin. longis, hemisphaerici, subimbricati foliis linearis v. linea-
ri-lanceolata obtusis, exteriora minorum variae longitudinis,
interna (n. 21) subaequalia. Flores flavi 5 lineas longi, ad tu-
bum 2. lin. non attingentem et ligulatae dosum pilosae, ceterum
glabris. Antherae $\frac{1}{2}$ lin. longae exsertae pallidae. Stylus nudi per-
sistens flavi. Pappus $1\frac{1}{2}$ lin. longus, pallidus, testaceo costato,
glabris, apice truncato. Pappus $2\frac{1}{2}$ lin. longus, persistens, copio-
sus, barbellatus, sordidus. — Hieracium marmoratum, affine
H. Raygeto Boiss., id differt involucri foliis obtusis, foliisque
caulinis brevioribus, ovatis cordatis. — A Hieracium lanatum W. Kt.
diversissimum caule pectinato, ramis in axilla folii pectati ne
squamaeformi orientibus, et involucri villosis absque pilis glan-
duliferis, ligulisque dorso pilosis nec glabris. Andryaloides Nies-
epior. p. 74. adnumerandum. Sch. bij. in lit.

Exil. Lon. Tab. XI. A, folia juniora cuticularia, B, Pili longior ^{caulis} C. 6

- E, seta paggi multa auctae.

rollo. IIII D, Achaeniam ^{auctum} IIII E, Idem tripla auctum. - F, Receptaculum
cum involucro. - ^

Centaurea myriotoma V. et Pan.

Tabula XII.

C. peregrina, ^{perennans} glabrata, foliis bipinnatifidatis, petiolatis, junioribus caulis
scutibus, superioribus bipinnatifidatis serratisque, pinnatifidis
tibus sessilibus, segmentis linearibus ~~acutis~~ decurrentibus subsiliatis
tibus canaliculatis acutis, floralibus linearibus indivisis, caule compresso
se rursus exsertite angulato; capitulis terminalibus solitariis
ovatis basi filatis, squamis involucri ovalibus oblongis viridibus
marginibus anguste scariosis, dorso 5-7 nervibus, apice splaccato in-
voluti palmato-pinnate partibus ciliis elongatis denticulatis; acheniis
glabris oblongo-linearibus angulatis pappi setas inequality paullo
superantes.

Herb. in praeruptis calcariis montis ^{ive. Pözarovicensis} ~~Vukhan~~ in Serbia centrali. Fl. pur-
purei. Pl. ~~Indica~~ a medio Junio, affinis praecedenti

Deser. Radix conica perennans. Herba omnis semina glabrata, apice
tenuiter pilis viridibus raris brevissimis adpersa. Folia juniora ca-
ulescentia: omnium segmenta acuminata crispipula sulco cana-
liculata. Caulis et rami crassi angulati exstantibus albibus lineati.
Involucrum exacte ovatum, basi rotundata, inde deum cordatum.
Squamis inferioribus ovalibus, reliquis sensim longioribus angustioribus,
apice nigris, ciliis parvis ^{viridibus} ~~exterioribus~~ scariosis, terminalibus abbrevia-
tis inermibus, margine serrulatis, dorso leviter sulcato. Corollae
tubus et lacinae limbi filiformes. Achenium nigro-purpureo viti-
dulum, uncinato-oblongum, tetragonum, basi hinc hilo albo
excipuum, setis pappi exterioribus brevioribus. Pertinet species
ad *Stenolophos* Cass. in *Bl. Andr.* VI, p. 585.

Obs. Nominum similis *C. tenuiflorae*, Sord., quae differt creditur pubescentia
totius plantae, foliis segmentis minus rigidis, nec canaliculatis,
et squamis interioribus linearibus angustioribus. Descriptione speciei Sord.
vixit, et specimen mutuum meo loco nobis deficiente, plantam
serbicum inferam hic protulimus descriptione et nomine accurato expre-
ssam, quo facilis de eorum dissimilitudine aut unitate ^{titani} specifice periculum
possumus.

Expt. Non Tab. XII. A, Pass folii. ~~aa~~ B, Corolla. ~~aa~~ C, D, E, F, Squamae
G, Achaenium : omnia in aceto.

Centauria Derwentana Kf et Panz

Tabula XIII, fig. 1.

C. perennis, cano-puberula; foliis lyrato-pinnatifidis serratis obtusis, inferioribus infimis elliptico-lanceolatis inferioribusque petiolatis, superioribus sessilibus, floralibus oblongo linearibus integris; caule crasso exquisite angulato foliato, apice paniculato racemoso, ramis abbreviatis bifidis, ramulis unifloris; capitulis orate-cylindricis basi foliolatis; squamis involucri oblongis, internis oblongo-linearibus, omnibus levissime quinque nervibus, summa apice tenuis incurvis, pinnato-lobatis, ciliis lateralibus scariis argentis longioribus; achaeniis glabris cuneato-oblongis angulatis, pappi setis achaeniis aequalibus.

Hab. ad rivos caliares ad Derwentam in hertia meridionali. H. purpurea. H. Linnæo.

Descr. Herba radice perenni, caule vix angulato, sursum subflexo, ramis divergentibus apice in ramulis binis monocephalis capitulum subsessilem divisis. Folia senescenti Jacobææ aut *S. aquaticæ*, lyrata, segmentis lateralibus oblongis patentibus subdentatis integripice, terminali cuneato-ovato serrato, omnibus obtusis. Capitulum ortum aut subsessile cum flavo-viridi, squamis apice dilute breviterque fuscatis, dorso leviter striatis, apice alio incurvis lateralibus brevior et fuscis terminalibus. Pappus in vivo dilute rufus, setis internis brevioribus omnibus. Ad *Arctophos* pertinet.

Expl. Icon. Tab. XIII, fig. 1. A, Radix radicale. B, Radix inferior. C, Corolla. D, E, F, Squamæ. G, Achaenium: omnia aucta.

Obs. E sententia prof. Panzii potius *Prophellii* adnumeranda, et inter hanc affinis *C. lyrophyllæ* Guss., *C. Marshallianæ*, Spr. et *C. integrifolæ*, C. A. Mey. A primis differt foliis radicalibus indivisis, capitulis inter folia bractæiformia sessilibus, et squamis omnibus fimbriatis, nec exterioribus, ut in *C. Marshallianæ*, lanceolatis integerrimis patentibus; a *C. integrifolia* foliis medijs lyratis, caulibus elongatis pleurocephalis, et indumento.

Linaria rubroides Vis et Pan.

Tabula XV.

L. perennis, glabra; caulibus ascenduntibus paniculata racemosa; foliis lanceolatis quaternis-verticillatis, nervis alternis, utrinque attenuatis, petiolaribus, acutiusculis; racemis ~~subulatis~~ terminalibus densis multifloris tenuibus, lateralibus abbreviatis paucifloris; bracteis pedicellis subaequalibus; calycis laciniis linearibus-subulatis obtusis corollae tubo plus duplo brevioribus; corolla palato villosa calicem descendens subulatum arcuatam obtusiusculum subaequante; capsula ovali-subrotunda emarginata calycem superante.

Hab. in glareosis, saxosis, serpentinosis montis *Sargan* et *nygn* *Kranje* ad *Ratisia* ^{in monte *Boja*} *circuli* *Uicensis* in terra meridionali. *H. lutei*. *H. Augusti*.

Descr. Radix multicaulis perennans. Flos ovatus petiolaribus lanceolatis vel superioribus lanceolatis-linearibus, verticillatis vel sparsis, nervulatis lacinis. Caulis ramis, ramis superioribus floriferis, racemis terminalibus longioribus multifloris solitariis, brevibus. Bractea linearis. Pedicelli in racemo sensim breviores. Corolla calycem sesquialongior, tubo superior erecto ^{et h. p.} bilobis, palato villosa calicem saepe superans. Stigma capitatum indivisum. Capsula prope medium utrinque unguis - semina striata.

Obs. Differt ab affini *L. gentiifolia*, Mill. ejuoque formis *L. silerifolia* Visch. et probabiliter *L. concolor*, Griseb. foliis distincta in petiolum attenuatis, quae in utroque illorum immo basi caulem lateris petioli amplectantur. & *L. concolor*, Griseb. in super caulibus paniculatis ramosis, floribus pluribus in racemo elongate congestis, corolla lobis subaequalibus et palato villosa. A *L. striata*, DC. magis differt per folia, bracteis pedicellis subaequalibus nec longioribus, calycis laciniis tubo corollae multo brevioribus nec aequalibus, calicem subulatis longioribus abbreviatis concavis; palato villosa nec glabra.

Species, ut videtur pro *Linaria* serpentinae propria, qui insperant in

illo cohabitare videt cum alijs plantis terrae specialibus, *Eryngia*
setica, P. et V. *Soridione setica*, *Urtica glabriflora*, *Urtica*, *Pa-*
teritilla Kipiani, *Sanic*, *Daphne Blagayana*, *Quackia aurea*, alijque
quos extra subditum illud in terra hactenus non invenit.
Expl. Icon. Tab. xv, A, Hos dylo autef. B, Muchy quadruplo autef.
C, Cauley sterilis.

Verbaricum pannosum Ktj

Tabula XIV.

V. molliter densaque albo tomentosa; foliis crassis, radicalibus ellipticis-lanceolatis, utrinque longe attenuatis, integris, caulinis breviter et anguste decurrentibus acuminatis; racemo laxifloro, basi ramuloso; bracteis lanceolato-linearibus, floribus laxo profunditate pedicellis calycis laciniis lanceolatis superantibus cano-lanuginosis; corollis calyce triplo longioribus fauce concavis; staminibus tribus superioribus abortivis barbatis, antheris abortivis, duobus inferioribus longioribus nudis, antheris semilunatis fertilibus in filamentis apice adnatis-decurrentibus; capsula ovali calycem duplo excedente.

Syn. V. montanum Panic. Ver. 2. in herb. W. plan. ⁸⁴³ in Scherz bot. bot. Ver. Wien. 1856 non Schrad.

Hab. in pasuis monti Tomnora livada circuli Kijazevacensis Sibiriae australis. Flor. Julio.

Descr. Caulis teres sub tomento detestibili implexo densa abortivus. Folia inferiora lanceolata-elliptica in petiolum bifollicularem canaliculatum sensim attenuata, apice lanceolata-cuspidata, margine integro, subtus crassissime at denseque costata et nervosa, venis reticulatis, tomento undique dense fimo pauciformi alba. Folia caulina sessilia breviter decurrentia, tomento laxiore nimirum cana, integro vel obsolete rarioreque denticulata, apice attenuata, in axillis superiorum racemuliferis. Racis racemi terminalis erecti laxiflori, pedicelli interdum bracteolati, calycis, et corollae dorsum ac marginem, cano-lanuginosi. Corolla rotata concava 5-partita, laciniis ellipticis vel obovatis, rotatis, brevibus inferioribus quidem majoribus, tubo vix ullo. Stamina superiora filamentis vix albidis crispis aequaliter dense barbatis, inferiorum longiorum nuda, in vico fusa, apice immixta. Antherae superiorum transverse crispipulae steriles: omnium glabrae. Capsula obovata pubescenti. Lacinia undulato-nigra, oblonga. Pertinet ad Sect. Thapsus.

Obs. A V. montano, Siberad. et V. niveo, Tenor., quibus ^{radicalibus} corpore
tus, diffini credimus tonenti natem et colori, foliis imbricatis,
impidatis, pedicellis longioribus laxis, et filamentis fertilibus,
omnino glabris.

Expl. Icon. Tab. XIV. A, Stem radicale ex desp. B, Costa pedicels.
C, Stamen sterile, multo acutum. D, Capsula cum pedunculo bracte
late et calyce. E, Semen multo acutum.

Euphorbia glabriflora, R. & S.

Tabula XIII fig. 2.

E. suffruticosa, glauco-virens, glabra, decumbens, inermis, ramis ascendenti-
bus foliis simplicibus; foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis mu-
crotulatis, basi petiunculato-attenuatis; umbellae radiis abbreviatis
subquinis aequalibus monopetalis, plerumque scissilibus ovalibus radii
quibus basi cinctis, inferne n. d., nervis longis; involucri tuberculati
inter glabros lobos retundato-truncatis integris, glandula truncata
semilenata reflexa taxinata; stylis ad medium costatis, apice
bifidis; capsula globosa verrucis oblongis obrita, semine ovali
nido, annulo irregulari crassa.

Syn. *E. prorepens* Panic. Ver. Verb. phan. in Schr. post. bot. Ver. n. 268. non Jan
Hab. in repetitibus septentrionalibus montibus Stal. conuli Castrensis et
montis Latibor ^{et ad Krumm, an. d. 1795} Tessae meridionalis. Flor. Neme. Julis.

Descr. Radix et basi caulis lignosae crassae, caulinibus supradictis
decumbentibus, ~~ramis~~ ascendentibus angulatis, superius
herbaceis, inermibus, ramis ad foliorum delapsorem basem
tuberculo. persistente notatis. Folia Neme. ellipticula nunc
breviter acutata, saepe mucronata, vix nervia, glauco-vi-
ridia, integra, plana. Folia florantia ceteris duplo latiora
brevioraque ovali-subrotunda. Stamina filamento medio, an-
therae biglobosae.

Obs. Affinis *E. Bivonae*, Head. et Boiss. in DL. prod. necnon *E. spinosa*,
L. Differt ab illa ramis non tri-quadrifloris sed simplicibus,
et jam a basi foliosis, foliis umbellatis radiis superantibus,
involucri lobis integris, semine albo-lutesco. Ab *E. spinosa*,
L. Differt magis, habitu nec dumoso nec crinosa, et teneriori,
ramis simplicibus inermibus, capsula verrucis brevioribus undeque
obrita. Ab utroque inferius recedit involucri inter glabros quod
in illis dense hispidum - habitum potius refert *E. linearifoliae*; Jay.
icon. raro. t. tab. 86 quae *E. linearifoliae* W. sp. pl. t. p. 598, *E.*
spinosa, L. V. inermis, Boiss. in DL. prod. XV, p. 132. sed icon et descriptio

et d'après Jacquin plantes exhibent variis neurocephalis
specie triphyllis, glandulis involucri quibus substrandis, capsulis
intestate adpressis verrucosis, quae a vestro abhorrent. — Ab
E. fragifer, Jan verrucis capsulae duobus nervis comitis abbreviatis
vixibus, nec filiformibus quibusvis in capsula pifum aequante
statim distinguitur.

Expl. Icon Tab. XIII, fig. 2 ~~et~~ A, Nos. ~~et~~ B, Pars involucri arte explanata
ut conspiciantur glandulae, stamina et interior involucri facies
glabra. D, capsula. ~~et~~ E, semina in omni multo acuta.

Allium serbicum Raf. et Panī.

Tabula VIII fig. 1.

A. bulbo solitario tunicis albidis tenuissimis verrucosis inclusis; ^{capo} tereti inferne foliis; foliis semiteretibus subulatis ^{laciniis} furtis ^{super} canaliculatis, scapo paullo brevioribus; spathe bivalvi, valvis ovatis apice acuminato-fetacci, altera umbellam 10-20 florum ^{hemi-}sphaericam superante, altera subaequante; pediculis lanis ^{cruciat.} subaequalibus apice incurvatis; perianthiis campanulatis phyllis ellipticis; staminibus singulis ^{sepalis} basi imo dilatata coalitis perianthium aequantibus, stylo longioribus; capsula obovato-trigona, seminibus cuneato-obovatis.

Hab. in rupibus calcareis ad Ujice, Makro gor, et Derventa circuli Ujicensis. Flores albi aut carni, phyllis nervo ^{uno} ^{te} ^{drum} ^{p. 11}.

Descr. Bulbus ovatus vagina membranacea, rarisime sub-caespitibus ^{sup}-scapus palmariis ad tertiam sui partem foliis longis ^{virginatis}. Haec subulata glaucescentia ^{super} canaliculata aut ^{con}planata, subius convexa, laevia, scapum non raro ^{aequan} ^{tin}. Spatha valvae basi latae, apice caudata-fetacae valde inaequalis. Umbellae capsuliferae pedicelli apice ^{juncti} ^{nato-} ^{incurvati}, in hemisphaerium dispositi, ab invicem ^{diver} ^{gentes}. Flori ^{contigu}, phyllis nervo medio ultra laminam ^{producti} ^{apiculati}. Filamenta ^{basi} paullo dilatata, ibique in annuleam ^{brevem} perianthis adnatum ^{concreta}. Anthera oblongae, defloratis ^{exsertis}. Ovarium breviter stipitatum trigono-subrotundum, flavidum, angulis ^{truncatis} obtusis, apice ^{aspericulum}, stylo ^{longis}. Capsula scabripula emarginata, stylo ^{persistente} perianthium ^{excedente} ^{superante}, tribocleari, seminibus ^{ab} ⁱⁿ ^{loculo} ^{bini} ^{juxta} ^{positis}.

Obs. Pertinet ad Allium macrospathe, S. 6 Don. ad species alienas ejusdem ^{sectionis} in Kunth en. pl. IV, p. 414.

Expl. Icon. Tab. VIII, fig. 1. A, Quae folia; B, Fl.; C, Stamen; D, Semen: omnia multo ^{accut.}

In
Plantarum Serbicarum
Decade I

emendanda

Potentilla poterifolia Wj. loc. cit. p. 11, nomen specif.
cum, utpote quod jam antea a cl. Boissier pro specie
persica prorsus aliena designanda usurpatum, cum
pro planta serbica servari nequeat, in sequens mutetur.

Potentilla Visianii Pan.

Syn. P. poterifolia Vis. pl. serb. Dec. I. p. 11 nec Boiss.

(Presentata l. 18 giugno 1865)