

Subiis *retracta* N. et Ponce

S. tenuis; inferne ^{can-} *paterula* *specie* *glabrata*, *caule* *erecto* *laevitate* *nuca*. *Stam.*
~~filamentis~~ *filamentis* *trian-* ^{subulatis} *gynostemio*, *sepalis* *linearibus* *oblongis* *pubes* *antheris* *capitulatis*
~~lobis~~ *lobis* *trian-* ^{subulatis} *gynostemio*, *sepalis* *linearibus* *oblongis* *pubes* *antheris* *capitulatis*
corollae *subconspicuae* *tubo* *extro* *filamentis* *caeruleis* *tubo* *ad* *canonem* *filamentis*
basin *barbata* *multitudine* *superioris*, ^{alga} *semita* *denticulatis* *mutis*.

Hab. in saxosis arenosis ad *Dmaen* *Scythiae* *montibus*. *H. lituani*. *H. pale*
flor. *Tab.* 18 - *A.* *corolla* *radix*. *B.* *calycina*. *C.* *corolla* *canonem* *calycis*. *D.* *partes* *filamentis* *omnis*
multo *averte*.

Deser. *Herb.* *tri-* *foliaris*. *radix* *partes* *specimen* *vix* *primarium*, *unicoloris*. *Herb.* *omnis*
tenacitate *trian-* *gynostemio* *vel* *semita* *pubes* *superioris* *linearibus* *oblongis* ^{antheris} *pubes* *antheris* *capitulatis*
pubes *antheris* *capitulatis*, *sepalis* *linearibus* *oblongis*, *sepalis* *linearibus* *oblongis*, *sepalis* *linearibus* *oblongis*, *sepalis* *linearibus* *oblongis*
lobis. *Caule* *tri-* *lobis*, *semita* *radix*, *pediculis* *oblongis* *aterris*. *Herb.* *filamentis* *tri-*
lobis *linearibus* *linearibus* *linearibus* *linearibus*, *caulem* *undif*. *Capitula* *semita* *capitulatis* *semita*, *semita*
lobis *trian-* *gynostemio* *semita* *pubes* *antheris* *capitulatis*. *Corolla* *lobis* *exterioribus*
quibus *superioribus* *oblongis* *extro* *filamentis*. *Corolla* *semita* *pubes* *antheris* *capitulatis*. *Calycis*
tubum *lobis* *lobis*, *lobis* *decem* *quae* *trian-* *gynostemio* *extro* *canonem*, *lobis* *aterris*
sub *superioribus* *lobis* *lobis*. *Corolla* *semita* *pubes* *antheris* *capitulatis* *30-* *radix*. *Cyathus* *pubes*
semita *lobis* *lobis* *semita* *5-* *denticulatis*, *lobis* *trian-* *gynostemio* *mutis*

Obs. *Similis* *S. tenuis* *Herb.* *et* *Griseb.* *et* *superioribus* *glabrata*, *semita* *lobis* *exterioribus*
capitulatis *ovoidis*, *et* *semita* *radix* *semita* *lobis* *trian-* *gynostemio*.

7
Plantation ~~at~~ near
Deas W.

Linaria rubioides

L. peregrina, glabra, caulibus ^{paniculatis} adscandentibus ramosis, foliis lanceolatis le-
 vianis quaternis - verticillatis superioribus alteris, utrinque attenuatis peti-
 olatis acutiusculis, racemis ^{terminalibus} multifloris, lateralibus ^{abundantibus} paucifloris, bracteis
~~sub~~ pedicello subaequalibus, calycis laciniis linearibus subulatis obtusis corollae tu-
 bo plus duplo brevioribus, corollae palato villosa calicis ^{subulatis acutiusculis} dependens
~~obtusis~~ obtusiusculis subaequantibus, capsula ovali-subrotunda emarginata
 calycem superante

Icon Tab. XX. A. Her. B. Mueh. : nulla auct. ad Fastista
 Hab. in saxonijs serpentinijs montis Sargan et supra Brasenjo coruall
 Ujicnijs, in Serbia meridionali.

Deser. Radix multicaulis peregrina. Folia omnia pubesca lanceolata vel supra
 vel lanceolato-linearia, verticillata, vel sparsa mucronulata. Caulis ramosus,
 ramis superioribus floriferis, racemis terminalibus longioribus densifloris. Bracteae
 lineares. Pedicelli in racemis saepe binijs. Corolla calyce multo longior, labio su-
 periori erecto bilobo, palato villoso. Stylus capitatus - simplex. Capsula profunde sul-
 cata. Semina striata.

Obs. Differt ab affinitate *L. genistifolia* Mill., ejusque formis *L. silicifolia* Rich. *L.*
linifolia Ehrh. et *L. cordata* Griseb., folijs distincte in petiolis attenuatis, quae in
 illis omnibus basi latiuscule caulem amplectuntur: a *L. cordata* fr. in superis caulibus folijs
 calicis ramosis, floribus plerumque in racemis elongatis congestis, corolla calicem subaequali nec
 ipso longiore. A *L. striata* DC. discrepat foliorum forma et latitudine, bracteis pedicellis
 subaequalibus nec longioribus, calycis lacinijs tubo ^{corollae} ^{longioribus} multo brevioribus
 nec aequalibus; calicem subulatis longe, nec obtusato corio; palato villoso, nec glabro.

Species, ut videtur, serpentine propria, juxta praesentia Panicis, cum alijs plantis quae in Serbia
 notant, sicut *Eryngia serbica* Presl, *Solidago serbica*, *Euphorbia glaberrima*
Potentilla Vilianii P. Daphne Blagayana, *Quercus aurea* alijque,
 quae extra substitutum illud in Serbia haecum non inveniunt.

Expl. Icon. A. Flor. duplo auctus. B. Bracteis quadruplo auctus. C. Caulis stentis

Sedum corniculatum

L. perenne ^{glabrum vivax} ^{basil.} ^{capitulum}
 caulis decumbens, caulibus ascendens, foliis ^{obtusis} ^{obtusis} ^{obtusis} ^{obtusis}
 complanatis basi truncata medio in duobus ^{ovatis} ^{ovatis} ^{ovatis} ^{ovatis}
 lobis trifidis, nervis ^{obtusis} ^{obtusis} ^{obtusis} ^{obtusis}
 petalis lanceolatis apice in corniculam ^{obtusis} ^{obtusis} ^{obtusis} ^{obtusis}
 dilatato-potentibus.

Sedum album

glabrum, foliis ^{obtusis} ^{obtusis} ^{obtusis} ^{obtusis}

Allium serbicum Nj. et Peri.

- A. bulbo solitario tunica albida tenuissime nervulosis incluso, saepe tereti inferius foliis, foliis teretibus subulatis ^{radicibus} prostratis, saepe ~~inter~~ ^{inter} canaliculatis, saepe paullo brevioribus; spatha bisleri, valvorum ~~apice~~ ^{apice} ovatis longae apice accurato-retusis, albae umbellae ^{10-20 florum} ~~superiore~~ hemisphaericae superante albae subaequantis; pedicellis ^{radicibus} laxis erectis aequalibus apice inaequalibus; perianthio campanulato phyllis ellipticis ^{inaequalibus} apice ~~retusis~~ ^{retusis}; staminibus filiformibus basi ^{retusis} inaequalibus, perianthio aequalibus, stylo longioribus; capsula striata trigona, seminibus curvato-obovatis.

Icon. Tab. ~~II~~ f. 1.

Hab. in rupibus calcareis ad Ulice, Mokro goru et Derwenta circuli Thraciensis. Floris albidis aut carnis, phyllis nervo viridibus fragilibus. De hinc Desv. Bulbus ovatus vaginae membranae, solitarius, rarissime subcaespitosus. Stipulus ~~est~~ palmaris ad tertiam sui partem foliis longe brevior.

Haec subulata glaucopendia ~~superiore~~ canaliculata aut complanata, subhis curvata, lacera saepe interdum aequantibus. Spathae valvae basi latae apice caudato-retusae, valvae inaequales. Umbellae capsuliferae ^{apice puberulae, nervosis} ~~superiore~~ hemisphaericae dispositae ab invicem ^{diversis} ~~retusis~~ ^{retusis} floris contiguis. ^{perianthio adnatis} ~~retusis~~ ^{retusis} filamentis basi paullo dilatatis ibique in annulum brevium ^{concreta} ~~retusis~~ ^{retusis}.

nerve pediculis
vaginae membranae
foliis

Antherae oblongae, cum defloratae existant. Ovarium breviter stipitatum trigono-subrotundum, flavidum, angulis fereventibus, apice apiculatum, stylo ^{emarginato} ~~longioribus~~ ^{longioribus}. Capsula sabripula, stylo persistente perianthium exsertito superante, tuberculans, seminibus atris in loculo binis, juxta positibus.

Obs. Pertinet ad Allium macrospatha ~~Don~~ S. B. Don., ad speciem alienam ejusdem sectionis ap. Kunth en. pl. v. p. 414.

Expl. icon. Tab. VIII fig. I. A. Apex folii. B. Flor. C. Stamen & Semen: omnia nulla aucta.