Vaccinieæ n. gen.

Calyx minute 5-dentatus. Corolla petalis oblongis (sex lanc.) 1½ mm
ovatis cuneatis retroflexis, carpellis tyrnbeformibus
subcurvis extus 5-sulcis, stylo antice, dorsaliter subulato extrorsum
marginantibus; inter stigmatibus
Vallecula 3-plurisulcata
saliente dremplo longitudinaliter exarata: albumen tenuissimum. Cotyledones
patulæ apicibus cordatum adnexa. Fructus phyllodineus retusus
glaber rarius pruinosus: bacca; carpella evacte ovata tenui, apice subrostrata,
stylis rudimentis suffulta, loculis; semina pendula, testa
dorsaliter, rubiginosa nitida, rugulosa, albumine carnoso, embryone
umbilico inclusum, cotyledonibus foliaceis, radicula infera. H. Jun. Junio
Sibiu. Hab in monte Javor in Serbia, und ayslum planta
dictum, nisi typus humanitus dispositus concessit d. Josepho
Pancic, Viglatum scribens iconibus pulcherrimis ornavit, descriptionem
Eumuntem gallice jussit pulcherrimam illustrationem
Rhizoma
haud expansum repentem. Genus inter Cassiopeam Andromedam
Leucothoen collocat
locum habet, nullis certum tamen evidenter affinibus, et ab omnibus
Cassiopeæ distinctum a basi ad apicem subtenuissima ad Cassiopeam tenuissimum fere
Leucothoe inclusa
a Cassiopeæ & Cassiopeæ tenuissima, et
tenuissima, et