

Palmerie cultivées a Nice
en pleine terre

- Chamaedorea elegans }
 Mexicana }
Chamerope botrysans }
 crulsa }
 fragilis }
 Martiana } et y végètent avec la plus
Cycas Revoluta } grande vigueur
- Jubaea spectabilis }
Latania berteriana }
 Jenkinsiana }
Phoenix dactylifera }
Rhopis stabelliformis }

Calamus equestris }
Sabal Andersonii } Aris Nostique, le pourroit
 Croit et en seroit le même } surpasser la pleine terre chez nous
 du Jubaea spectabilis du Chili } (Nostique)
 et de Chamerope Martiana de l'Hymalaya
 plus Nostique encore que le Phoenix dactylifera

Elate Sylvestris } paraît moins Nostique
Arca Subra } à peu la seconde Année

Latania, et Cycas bien n'approche de leur force, et de
leur hauteur

Temperatura Media a Nizza

Media nell' Anno	+ 15.6	Media più forte Giove	+ 8.3
Inverno	+ 9.3	il più Caldo Agosto	+ 23.6
Primavera	+ 13.3		
Estate	+ 22.5	Minimo della	
Autunno	+ 17.2	temperatura spicata	- 9.6

A. Bon di Tadi scrive in luce a queste parole

a Nijeres in Franca a 3 leghe da Tolone sulla riva del Mediterraneo
 si coltivano in prima terra. In Inverno si sale d'Inverno in
 dicende sotto l'oro, qualche volta a 2 e 3 / 5. 6 sono variamente
 Vedi Flora Vol 8 pag 201. ann 1

Salvia <i>Thymia dactylifera</i>	sign	<i>Laurus Camphora</i>
✓ <i>Chamaecyparis humilis</i>		<i>Crocolophne madagascariensis</i>
<i>Latania borbonica</i>		<i>Cratogeomys floridensis</i>
" <i>Chamaecyparis excelsa</i>		<i>Chamaecyparis laevigata</i>
" <i>Palmetto</i>		<i>Sideroxylon laurifolium</i>
<i>Jussiaea spectabilis</i>		<i>Cataglyphis Crenata</i>
<i>Graminaceae tropicale</i>		<i>Megastipidium pictum</i>
<i>Bambusa Arundinacea</i>		<i>Phytolacca dioica</i>
<i>Saccharum officinarum</i>	✓	<i>Strelitzia reginae</i>
<i>Andropogon squarrosus</i>	✓	<i>Solanum jasminoides</i>
<i>Arthro. d'Ornament</i>		<i>Mandevilla sanderiana</i>
<i>Sida hortensis, e mollis</i>		✓ <i>Mansonia domestica</i>
<i>Erythrina Crista galli</i>	Coniferi	<i>Schinus molle</i>
✓ <i>Pithecolobium bicon</i>		<i>Pinus Canariensis</i>
<i>Coccoloba laurifolia</i>	✓	<i>Caryophyllus sinensis</i>
✓ <i>Calycanthus procera</i>		<i>Cyperus elegans pendula</i>
<i>Mercurialis splendens</i>	✓	<i>Sagittaria imperiana</i>
<i>Acacia latifolia</i>	✓	<i>Cyperus pumilus</i>
<i>Justicia Albatula</i>	✓	<i>Abies Pinsapo</i>
✓ <i>Lagerstrœmia indica</i>		<i>Cyperus Bournefortii</i>
" <i>Negivna</i>		<i>Sunopsis excelsa</i>
✓ <i>Poinciana Gilliesii</i>	✓	" <i>thunbergii</i>
<i>Melastomum lephant</i>		<i>Shaya hybrida</i>
" <i>viridiflora</i>		<i>Brenelia buxifolia</i>
<i>Melaleuca linariifolia</i>		<i>Abies Nitidissima</i>
✓ <i>Pithecolobium undulatum</i>	✓	" <i>plata</i>
<i>Solanum burrielatum</i>		<i>Cyperus Lambertianus</i>
<i>Laurus indica</i>	✓	<i>Cyperus glaucus pendula</i>
<i>Prunus Caroliniana</i>		<i>Retinobolus pycnanthoides</i>
✓ " <i>lusitanica</i>		
<i>Ulmus sinensis</i>		
✓ <i>Ligustrum japonicum</i>		
<i>Bignonia Manglietia</i>		

Vol VI pag 57 si legge riportata nel *Cephalotaxus Fortunei*
 che si rischiarò prima sotto
 Si può surprenere a pini in un luogo, e in un luogo non
 hanno (*Chamaecyparis excelsa* Humb. Desm. &
 Nigens, introdotti per l'Inghilterra da lui, e per il Reo di
 supporta, e in alcune specie d'altre le mima huiusmodi per
 l'Inghilterra) di 1849-1850