

Genova  
8. 11. 867.

Carissimo Collega

Eccovi due frondi della Cheilanthes. Vi avrei  
mandato e Vi manderei volentieri l'opuscolo  
del Todaro; ma essendomi dimenticato a segnare  
i fioretti, di cui abbonda, non avrei ussiffe dalle  
mie mani.

Vi trasferirò qui dietro, per l'ottima direzione  
i passaggi relativi alla Cheilanthes.

Non istarò ad annoiarvi di bel nuovo colla litanìa  
dei miei gravami, Vi dirò solo che non ho trala  
forza di lagnarmi dei cattivi trattamenti che  
m'ho beccati, ogni qualvolta ne ho avuta occasione.  
Ma che volete? Al d'i d'oggi chi tta al governo  
non ha più sentimento nè di pudore, nè di ago-  
glia!

Non mi trattengo di più avendo qui sul mio tavolo  
un mucchio di micetti da determinare. Ci feroi  
Vi manderò per il P. Saccardo l'opuscolo di cui  
Vi ho fatto cenno. Intanto mi ripeto con tutta  
fama

Vostra affm amico  
G. de Notarij

Todaro Synops. plantar. acotyledon. Vascular.  
Hist. etc. Palermo 1866. 4:

p. 10. Cheilanthes Swartz. ent. pp. etc.

„ Sporotheca subglobosa, discreta, confluentia,  
marginif seu lobulof marginarum inundentia. etc.  
Che vena parv? Avendo posto Sporotheca globosa do  
a credere ch' e' altra presso le capsule per tori. e poi  
quel discreta confluentia!

Cheilanthes acrostica Tod. enum. fl. sic. 7. 9.

Pteris acrostica Bralb.

Polypod. fragrans Linn. mant. alt. 307. ex. p. quond  
plantam gallicam.

Adiantum fragrans Viv.

Cheilanthes bravedens Swartz.

Cheilanthes odora Guss.

„ Frondif pars foliacea stipite longior, circum  
scriptione ovata vel oblonga, ac superne ob pinnas  
sensim decrescentis angustior, bipinnata 7-15-jugis,  
utrinque glabra, pinnulis circumscriptiois ovato-  
oblongis, obtusis, bipinnatis-dis, laciniis  
rotundatis integris, vel puberulatis, primum planis  
fentis, inde convexulis, margine revolutis. Indusium  
membranaceo ferebros, albidu, brevis ciliato-lacero

Guss. aggiunta di brevis ciliato-lacero agli indusii



farebbe supporre esser la pianta sicula diversa da  
quella pubblicata nell' Index Crittogamico

Cheilanthes Tinacii Tod. enum. pl. sic. 1, 12.

Cheil. odor. var. stipitata glabrata Tineo herb. H. Pan.

Forse la descrizione che finisce:

Sporotheca subglobosa, marginalis, discreta, bracteae  
confluentes. Indusium non vidimus !

aggiungo la premessa = Pinnularum laminae  
medicis, non exiguae, coriaceae, elliptico-subrotundatae,  
obtusae, interdum obsolete lobulatae, margine revolute  
sporothecae obtergente.

Sarebbe la pinnula della Cheilanthes di Trigon ed anche  
della timbrata, ma senz' indusio !

„ Offerway „ ..... essa è una specie ben distinta dalla  
Cheil. odor. e che approssimasi all' C. agrostidis  
F. & M. / Acrost. microphyllum Bert. / . Essa merita di  
esser esaminata sulla pianta viva, ed in maggior n.  
di saggi. Per il suo stile si avvicina ad una forma della  
Ch. acrostich., che noi possediamo dalla Corfica favorita  
dal Requeir, e raccolta mess. Ajaccio, e che si distin-  
gue dalla forma ordinaria della C. acrostich. per la bre-  
vità della parte stipitata delle due frondi e per il picco-  
lissimo numero delle coppie delle due penne principali; forma  
che ben distingue la pianta raccolta da Requeir nei  
contorni di Ajaccio, dall' altra forma della Steffe Chei-  
lanthes che questo distinto botanico ci ha rimesso da  
varie altre località dell' isola medesima, ecc. !!