

Tutta l'ellandria conata, proprio quel tipo
Di un buon genere di Bromeliacea

Le Bromeliacee ~~di questo~~ Bromelia del Lindley appartengono una famiglia
di piante vivaci, che vivino per lo più attaccate quasi sempre fissate
ai tronchi di vari alberi, abitano le regioni sempre per i tropici,
e si diffondono a parte tutte per le loro foglie, ^{anelli} rigate scanalate per
anche alla base, dopo essere già all'apice infusa nel tronco, e
spesso armate nel margine di denti acuti e spinosi. Il tronco, che
talora manca, è generato di foglie più o meno distribuite a gem-
lunghe di medesima e densità in grandezza. I fiori ora disposti
in spiga ora in grappolo ora in pannocchia, talora sono solitari, o
in piccoli sono spiccati ciascuno d'un botto, che in alcune specie
è grande e colorito, in altre piccolo e bianco, son tutti ^{adornati} composti
per lo più regolari, e composti di un perianzio lungo in cui si porta
tra delle quali più comune hanno il colore e la tessitura del calice,
tra internodi l'apice della corolla. Qui più raramente nei fiori, e
nei l'infiorescenza in varia in vari generi, ed a volte sono per lo più
subspicci ^{di questa} ~~di questa~~ base delle divisioni interne del perianzio ^{dentate} ~~dentate~~ o
spuntate nell'apice: i filamenti sono per lo più rubelli, le
antere bifloro bilobate con legge spesso parallela ed aguzzata per
la lunghezza. Il pistillo consta di un ovario ovale o libero dal perianzio, ora
attaccato in parte al medesimo, e ora al tutto del perispermio
vinco ^{che} ~~che~~ ^{di} ~~di~~ ^{in cui} ~~in cui~~ ^{per cui} ~~per cui~~ ^{proprio} ~~proprio~~
tra legge ^{in cui} ~~in cui~~ ^{per cui} ~~per cui ^{proprio} ~~proprio~~ ^{per cui} ~~per cui~~ ^{proprio} ~~proprio~~
medesimo e sono antrichi: di una sola semenza e tra angoli: di
tra formano bracci ed indivisi spesso cavati e di latta, o diritti o
curvati. Il frutto è una bacca bilobata che non l'apice e non per
perispermio, ^{ora} ~~ora ^{una} ~~una ^{capolla} ~~capolla ^{con} ~~con ^{tra} ~~tra ^{colore} ~~colore~~ ^{schindano} ~~schindano~~ per
la natura ^{in cui} ~~in cui ^{che} ~~che ^{us} ~~us ^{essigisce} ~~essigisce ⁱ ~~i ^{margini} ~~margini~~ ⁱ ~~i ^{quale} ~~quale~~ ^{regole} ~~regole~~ ^{rispetto} ~~rispetto~~ ^{l'asse} ~~l'asse~~
del frutto ^{per} ~~per ^{una} ~~una ^{capolla} ~~capolla~~ ^{con} ~~con ^{tra} ~~tra ^{colore} ~~colore~~ ^{schindano} ~~schindano~~ per~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Phytovohiz-

Chas. *Pinguicula* ^{acutifolia} *lobum* ^{acutifolia} *capitata*, ^{acutifolia} *extremis* *calycinis* *capitata* *acutifolia*
imbricatis, *apice* *lapi* *obovatis*; *interioribus* *puberulis* *lobis*, *iniquibus* *elongatis* *vegis*
 " *lobis* *lanceis* *reflexo-patulis*. *Stamina* *sex* *hypogaea*, *filamentis* *lamellatis*
multis, *lobis*, *antheris* *oblongo-linearibus* *lapi* *capitata* *emarginatis* *filamentis* *imperfectis* *acutis*

[illegible][illegible]

Spec. Phytanthiæ Insecti.

Ph. leptothecaeformis, plij i pismu, lanceolata - lanuginosa

Saphne

D. florig terminally ~~aggregating~~ ^{perennial} ~~erect~~ ^{erect} ~~laevigatus~~ ^{laevigatus} ~~perianth~~ ^{perianth}
 internodes - elliptic ~~slightly~~ ^{slightly} ~~apic~~ ^{apic} ~~obtusely~~ ^{obtusely} ~~margin~~ ^{margin} ~~narrow~~ ^{narrow} ~~flat~~ ^{flat} ~~above~~ ^{above} ~~laevigatus~~ ^{laevigatus}
~~apic~~ ^{apic} ~~obtusely~~ ^{obtusely} ~~margin~~ ^{margin} ~~narrow~~ ^{narrow} ~~flat~~ ^{flat} ~~above~~ ^{above} ~~laevigatus~~ ^{laevigatus}
 narrow puberul.

[illegible][illegible]

Daphne Allen hair white; right fleshy scaly, bearing prominent wing,
left scaly at base, fleshy from upper part ^{of its extent}. All four have black mites.

Inkr. *Syngnium Cusum* et *S. Mitham mudi*, ¹⁸⁷¹ *illi* ¹⁸⁷² *hinc* ¹⁸⁷³ *plag* ¹⁸⁷⁴ *Mitig.*

exp. n. a. fls. acutis ^{concomitantibus} filis florib. - 6 6 corolla acuta et aperta. c.
antheris acutis. ⁱⁿ pappo cum disco nutrimen. ovum herb. nigr.
brunneum hirs. styg. disc. nigro.

Haristo

Se si fanno sezioni, o se il colico sia marginale, bene, e i pochi uguali, o più piccoli.
più spesso più brevi e più curvi, che compongono e si avvicinano gradualmente più
s'avvicinano al centro del feto?

Se i pochi siano 14-15 come nella 8^a, o 10^a, questi sono, oppure sono
e sono tutti all'apice?

Se gli spunti sono 20 circa, o 50-60?

Se gli spunti sono 4 o 5?

1. Nome delle antere, e del polline: Cosa sono i corpuscoli adovanti, o
filamenti, nelle stili? Le grani di polline?
2. Se l'ovario sia uniloculare o multiloculare, ogni ovulo parietale, o centrale,
e numero di quaglie ovuline?

Cosa sia il nuovo infuso che ottiene nel colico, e a cosa esse corrispondano?

Gastromia

3. Esame microscopico, e descrizione del Nipote glanduloso che copre l'ovario, delle stili, e
dell'ovario, del feto, dell'embrione. Esame delle stili, e degli spunti.
5. Esame delle antere, della loro struttura, del polline, e del corollino, che mostra
beninteso a un solo punto che arriva per loro la loro legge dell'embrione, e
ad anche l'embrione.

Se si fanno di tutto ciò un Nipote microscopico, e il Nipote di ciò che
presenta il microscopio riguarda ai quesiti 12, 13, 14, 15 -