

Vol. III p. 193. Post *Laxifragam* medianam *Junc. addatus*

Saxifraga Rocheliana Thun. suppl. sax. dec. II ex Hort. fl. austr. I. p. 502. Pebb.
fl. exc. n. 3611. St. prod. syst. nat. xv. p. 22.

1. foliis repulcanum breviter oblongis obtusis, apicibus rigidi, subtus convexo-lacinatis
 margine cartilagineo 5-7 porolati, basi ciliatis, caulibus ^{floribusque congestis} calycibus ^{oblongis} vix
 villosis, calycis laciniis oblongis obtusis, corollae dyale brevioribus, petalis, ovario
 uniuersibus, nervo palmarum dichotomo.

Syn. *S. pseudocacina* Roch. pl. rar. ban. p. 1. *S. coriophylla* Guss. 17. fl. delm.
p. 333. *S. Rochetii* Strob. v. rar. lat. II. 11.

Tron. Roch. ph. ban. var. tab III. f. 9 Sternb. l. c. tab. II. 11

Hab. in rupestribus calcareis montium Vellebith ubi ^{invenit} legit Fr. Maly, et montij

Obs. Pelala bas. unimurva, nervo sup. basin palmato. Folia ~~glabra~~ ^{glabra} - ~~oblonga~~ ^{oblonga} margine ~~marginis~~ cartilagineo, ad basin utrinque pino-ciliolato, apic. ~~obtusis~~ ^{obtusis} ibique 3-5-pinnulato, pinnulis remotis. Folia ex icon. Nothelie pluripinnulata sed non diversa - S. scardica Gris. l. videtur foliis acutis diversa