

I

Florae DalmaticaeSupplementum alterumPars IIPlantaginaceae Linn.Vis. fl. dalm. II p. 2.

- Ad Hor. dalm. VII. II. p. 1. adde locum in spongesis ad Sin
niae et in foris ad Vir (M.N.) Panck. et pl. vase. p. 80. Tommas. v. 1. p. 56
in ins. Veglia, et Hor. asiatica: Sene. in DC. prod. XIII. p. 694: foliis rotundatis,
obtuse dentatim-sinuatim, pedunculis spicisque bai venotifloris gracibus —
Syn. P. asiatica L. p. 1. p. 163. Panck. adn. ad fl. et faun. p. 35 — Hab. in graminoribus circa
Kovice infra Mali Durmitor (M.N.) et circa Rogoz (Dalm.) An. II. intermedia
et rotundata. —
- Ad Plantaginem cornuta Gou. Vis. fl. dalm. II. p. 1. adde locis circa Sturm. Deutsch. fl. IV.
Ad Plantaginem medium L. Vis. I. c. p. 2. adde locis circa Cattaro (Dalm.) et monte
Cerna Planina (M.N.) Panck. I. c. in Bosnia Lendin. et in platag. ins. Veglia (Dalm.)
Tommas. I. c. p. 56 — Addatur Var. plurata: foliis inter nervos interdum longitudine
litter convexis — Syn. Pl. plicata Schott. Nym. et Kotze. anal. b. t. Vind. 1854. p. 4. — Panck.
I. c. p. 35. — Hab. in graminoribus montis Kom (M.N.) Panck. Obs. pl. ic. germ. XVII tab. MXXXIX
Ad Plantaginem lanceolatam L. Vis. fl. dalm. I. c. p. 2. adde locum. Billekens
(Herreg.) Panck. (Bosnia) Scrofa, et in ins. Veglia (Dalm.) Tommas. I. c. Vulgaris
Ad Plantaginem argenteum Chaix. Vis. fl. dalm. I. c. p. 3. adde locis montis Glava
prope Zetinja (Herreg.) et in parvus Carina dicti infra Kom (M.N.) Panck.
I. c. P. Victoriae Poir. Panck. et pl. p. 80 in parvus m. Durmitor puge Syrene
(M.N.). Richb. fil. ic. germ. XVII tab. MXXXIX —
- Ad Plantaginem Bellardii Allion. Vis. I. c. p. 3. adde locis in saxosis circa Biće, Duga
et Bratonožici (M.N.) Panck. I. c. p. 35. Richb. fil. ic. germ. XVII tab. MXXXIII.
- Ad Plantaginem Lagopus L. Vis. I. c. adde locum ins. Veglia et circa Besca (Dalm.)
Tommas. I. c. Richb. fil. ic. germ. XVII tab. MXXXIII Fig. III - IV - VI.
- Ad Plantaginem maritimum L. Vis. I. c. Sub hoc nomine referri possunt Var.
subulata, Var. alpina, Var. serpentina et Var. ciliata Auct. in M.N., Herreg.
Bosnia et in innatis obvias.
- Ad Plantaginem Psyllium L. Vis. I. c. p. 5 adde locum in arenosis circa Savoia (Dalm.) Panck.
- Ad Plantaginem coronopus L. Vis. I. c. adde locum in apriis circa Cattaro (Dalm.) et Biće (M.N.)
Panck. I. c. et in ins. Veglia ad mare (Dalm.) Tommas. I. c. — Addatur
Plantago montana Lam. enc. bot. v. p. 360. Host fl. austri. I. p. 212. Richb. fl. ex. p. 395
Panck. I. c. Panck. et pl. p. 80
- Pl. glabriuscula, foliis linearis-lanceolatis integris aut remote dentatim, s. r. nervis

IV

sco po tereti piloso, apice rotundato - ovata fuscescente, bracteis glabris marginis membranaceis ciliatis laevius calycis subtrotundis apice pilosis, capitulo conica

Syn. R. atrata Hopp. ~~cantata~~. Rechb. p. 85.

disperma

Hab. in parvis mont. Paslebica in Bielgora (Herzeg), in m. Kom et Male

Durnitor (M.N.) Panth., in parvis mont. Durnitor et Savoje (M.N.) Pani.

H. Jul. Aug. Pevena.

Phoenstaginaceae Juss.

V. s. fl. dalm. II. p. 5.

Panth. c. p. 36

Ad Armeriam canescensem Boiss. Vis. fl. dalm. Syll. p. 49 adde locum sub A. vulgari Vis. fl. dalm. II. p. 6 non W. adde locum in monte Prologh (Bosn.) Sredna, et in Cetinje, et m. Lovcen et in Velika Sutrebita (M.N.) Pani. c. p. 89, in parvus circa Bilek, et circa Bratovac in Bjelaz

gova (Herzeg) Panth.. Addeatur n. Rechb. ii. germ. XVII tab. 99. f. M.C. Pani. c. p. 36

Armeria alpina W. en fl. h. berol. I. p. 333. Rechb. fl. ex. p. 139. Panth. c. p. 36

A. foliis linearis - lanceolatis linearibus glabris, subtrinerviis, rame cum

presso scapo glabro, bracteis elliptico - rotundatis obtusis, interioribus

obtusifinis, tubo calycis villoso - striato pedicello suo dividito breviore,

petalis emarginatis.

Syn. Statice Armeria alpina Hopp. Host fl. austri. E. p. 407.

Hion. Sturm deutsch. fl. II. 51. Rechb. ii. germ. ~~ent. xviii. tab. M.C.~~ fl. ex.

Hab. in parvus Biele Karini dicti, et in m. Kom, in Sinjajina Planina, ad lacum Crno Jezero et in Male Durnitor (M.N.) Panth. — non in

m. Durnitor Kom et Savoje (M.N.) Pani. — Var. latifolia : foliis lanceo-

lates — ~~Rechb. fl. ex. p. 139. tab. 99. f. M.C.~~ — Hab. in parvus alpinus m. Kom. (M.N.) Panth.

Ad Statice Limonium L. Vis. c. p. 7 adde locos in insula Veglia (Dalm.) et ad St. cancellatam Bernh. Vis. fl. dalm. II. p. 8, quae St. Dithyphora Tauch

diagn. in Syll. pl. nov. Ratisb. II. p. 254 (1828), adde locos in ins. Veglia et

scopulis ipsam circumcurrentibus (Dalm.) Tonina, c. p. 56. Vis. fl. dalm. np. p. 51.

Ad Plumbaginem europaeum L. Vis. fl. dalm. II. p. 9 adde locum in saxonie ad

Ostrogo, supra Vir et ad Botjevici distr. Crimicae (M.N.) Pani. c. p. 80.

Globulariaceae DC.

V. s. fl. dalm. II. p. 9.

Ad Globulariam cordifolium L. Vis. fl. dalm. I. c. p. 10 adde locum in saxonie

Si montis Glava et Kira et Draia prope Trebinje (Herzeg.) Panth. c. p.

p. 65, in riparibus m. Lovcen Tolvican Durnitor, Savoje et Kom (M.N.)

Pani. c. p. 89, in saxonie montium, m. Drishkovac ins. Veglia (Dalm.) Tonina,

c. p. 56. Addeatur Var. nana Cambra. Panth. c. p. 65.

Obs. Huc addit. St. Willkommii Nym. Pani. c. p. 79: sed hanc non vidi.

III

Dipsaceae Vaill.Kr. fl. dalm. II p. 10.

Ad *Dipsacus laciniatus* L. Vis. fl. dalm. II p. 11 adde locum in
dumetis vallis *Mornia* prope coenobium S. Stephani (MN.) *Pani*
el. fl. p. 13 et addatur.

Dipsacus pilosus L. 4. fl. p. 111. Hart fl. austri. I. p. 186. Robb.
fl. exc. p. 197. *Pani*. l. c.

D. foliosus petiolatus, ~~super basim laminae utrinque~~
~~articulatis, paleis rectangulis~~
~~obvolutis, hispidatis, aristatis rectis setoloso-isetatis,~~ ~~bracteis~~
~~reflexis capitulo subglobo subaequalibus.~~

Icon. *Dipsacus* Robb. II. p. 197. *Dipsacus* Dalm. III. tab. 248. Engl. bot. t. 822.
Obs. fl. dalm. t. 11448.

Hab. in alnetis super *Kolasin* (MN.) *Pani*. H. altid. H. aestate. Biem. Non vidic.
Ad *Dipsacus syvestris* Mill. Vis. I. c. adde locum in ins. *Vegia* (Dalm.) *Tommasi*. l. c.
Ad *Succisa pratensis* Moench. Vis. I. c. p. 11 adde locum in prati pinguisibus
sub monte Durmitor et in valle *Zeta* (MN.) *Pani*. l. c.

Ad *Cephaelium leucanthemum* Schreb. Vis. I. c. p. 12 in qua notanda sunt albastro
florum glotosa, adde locum in saxonis ad Nijequis, Covo et Ostrag, nec non
super Grahovo (MN.) *Pani*. l. c. p. 18 et in ins. Vegia, monte Trishkav et regno
Plavnik (Dalm.) *Tommasi*. l. c. Obs. Huc quaque refers *C. graciam* Panth.
el. fl. p. 37, quae nulla nota specifica differt a *C. leucanthemum* Schreb.,
in ruminis formis et glotitis sive nulla foliorum cadente, quae
confer in fl. dalm. An et subito decurrentes *l. c. fl. gr. pndr. I. p. 80*,
quae *C. graciam* Rosm. et Sch. 148t. Veg. III. p. 43, quae ex descriptiōnibus
prosos manus auctorū nulla constanti nota discriminatur?

Ad *Cephaelium transylvanicum* Schreb. Vis. I. c. p. 13 adde locum in prati vallis
Zeta sub Danilor Grad (MN.) *Pani*. l. c.

Ad *Asterolephalum Columbianum* Wallr. Vis. I. c. p. 13 adde locum circa pagum
Ceklin, in valle fluminis *Zara* infra Kom, circa Lipovo Kovice et Stavniki
(MN.) Panth. l. c. p. 57, et in prati ad gradum et in silvocotibibus Kukuvaj Beso sub
monte Kom (MN.) *Pani*. l. c. p. 44; et ad Var. o granumaria Vis. fl. dalm. I. c.
p. 13 adde locum in graminosis circa *Orshovac* in Biela Gora (Herweg.) Panth.
l. c.; et in saxonis super Grahovo, in asperis ad Var. (vix reticulata) (MN.) *Pani*. l. c. et in
Vegia, Capricio, Beso et Popovo (Dalm.) *Tommasi*. veg. Vegia p. 42, omnibus sub *Scirpus*.

Ad *Asterolephalum suaveolens* Wallr. Vis. I. c. p. 14. adde locum circa Begir et Sivija (Bosnia) Sen.
Smer., et ad Var. *silicifolium* Vis. fl. dalm. II. p. 14 (sub sc. *stenophyllum* R. et Sch.) adde loc. in rete
tribus Male Durmitor (MN.) Panth. et *Pani* l. c.

Ad *Asterolephalum coeruleum* sp. Vis. fl. dalm. suppl. p. 51 probatur iconis citatae et in dignissi
subsistere verba "caulinibus exerto", pro pedunculis capiformibus. Deinde adde Var. *B. nanum*:

arile humili reperente, pedunculis monococephalig agathifly - Hab. specimen legit & hope
lettinj et in Panici' l. c. p. 44: Var. prop. Ad. Storich circa Letting.

m. Louv Ad. Asterophyllum holosericum Spreng. Fl. Gal. II. p. 34 ad locum
sub Sc. holosericae Bestot. in saxosif. Orlava skala dicti in valle Penitice Dol
infra Kom (MN.) Panth. l. c. p. 38. et in asperis sub monte Kom loco Tocia
Platno dicti (MN.) Pan. l. c. p. 44 et circa Begir Beg. Kulta et Suja, Varech,
Vlapach, rive ad Livno (Bosnia) Scindtn.

Ad. Asterophyllum graminifolium Spreng. l. c. p. 15. ad locum in vegetribus montibus
Loviens et rura Grakovo (MN.) Pan. l. c. p. 47 sub Scabiosa. - Addatur
Asterophyllum Webbianum Spreng. syst. veg. III. p. 382. Vis. ill. pl. gr. p. 16. P. ~~1~~

~~1~~ A. urano-subserratus, foliis ~~integerrimis~~, inferioribus petiolatis obvolutis suberectis,
superioribus lyrate-pinnatis, lobis oblongis acutis, capitulis longe pedunculatis,
hemisphaericis, corollis subaequalibus, setis nigris corona duplo longioribus -

Syn. Scabiosa Webiana Don in botan. reg. I. p. 117. DC. prod. syst. IV. p. 66. Panth. l. c. p. 37
Tion. Bot. reg. tab. 317.

Hab. in saxosif. circa Rieka et in Orlava skala infra Kom (MN.) Panth. Hochstet. sufficit
H. actate. Huic addi meritum.

Asterophyllum trinacifolium Vis.

A. effusus, tenuiter pubescens, superiore scabiosifolius, foliis bipinnata-partitif. foliis
setaceo-lineariis mucronatis, capitulis subglobosis, corollis radiantibus, coronae
involuti tubo et fovearum carinis pilosis, setis tubo multo longioribus.

Syn. Scabiosa trinacifolia Vis. in Regens. flor. 1835 p. 333. Gris. spic. fl. sum. II. p. 183
Panth. l. c. p. 44.

Hab. in vegetribus Gvera Stijena sub monte Durmitor (MN.) Pan. H. act. Peruna. Hochstet.
Obs. Affinit. A. pumariaefolia Vis. et Pan. fl. 1836, qui differt lobis fibrosis inferiorum lateribus
et setis coronae fructus virae aequalibus.

Asterophyllum vernicium Rebh. Fl. Herz. p. 194.

A. foliis basi ciliatis, inferioribus pinnato-partitif. lobis linearibus diffundib., superioribus
linearibus induratis, capitulis hemisphaericis, corollis radiantibus ampliis, coronae
dentatae involuti tubo foveis aequali basi pilosis, setis tubo duplo longioribus.

Syn. Scabiosa uranica L. sp. pl. p. 144. Host. H. aust. l. c. p. 195. Pan. l. c. p. 44. Sc. argentea L. sp. pl.
p. 145. Sc. alba Rebh. Det. ins. III. p. 3

Tion. Rebh. in germ. XII. tab. 609. Tab. 1. c. tab. 16. Griseb. H. 1836. II. tab. 187. Conf. Disses. tab. II. p. 9.
Hab. in glaciis rivo Graicnicka Rijeka et Nitickicka Zupa (MN.) Pan. H. albi, subrotundis obovatae
H. actata. Bienn.

Ad. Scabiosum arvense L. l. c. p. 16. ad locum in graminis inf. Vegla Tomm. l. c. p. 42 (Dalm.)
in monte Gliva prope Trebinje Panth. adi. p. 37 et in campis ad Cetinje Pan. (MN.), ad Genitza
rura Kolezin usque ad Sutynske et Podloga (Bosnia) Scindtn. Adde Var. rigidissimum Koch syn.
Fl. germ. II. p. 57; glabrum, foliis ad costas ciliatis, pinnatis vel omnibus induratis - Hab. ad Suja supra
Bozenglava, et a Quier ad Livno (Bosnia) Scindtn. Ad. JAV. B. ad Cetinje Rep. Vis. l. c. p. 16 ad locum

V.

circa Lettinge (sub *Knautia*) (M.N.) Pantz. l. c. p. 37

Ab *Scabiosa integrifolia* L. dif. l. c. ade locis in graminoribus circa *Trebinje* et *Bjelagora*, et circa *Trebina* (Herzeg) et circa *Kotica* (M.N.) Pantz. l. c. sub ~~oblonga~~

Et in pratis in *Vojna* (Lagovo), monte *Organ* etc. (Dalm.) Toninus l. c. sub *Knauti*

Scabiosa sylvatica L. sp. pl. p. 142 Hort. fl austri. t. p. 191 Rehb. fl ex. p. 193.

Se-hispida, foliis scabiosis, indivisis, inferioribus ovali-lanceolatis venato-lunatis, superioribus lanceolatis tenellibus, capitulis longe pedunculatis, bracteis inaequali leviter acuminate, involucello truncato piloso, calyculis 8-10 aristatis, corollis radiatis inaequalibus

Syn. *Knautia sylvatica* Duby, bot. gall. 1. p. 257. Pantz. l. c. p. 37

Icon. Rehb. II. germ. XII tab. 677 Taf. fl austri. IV. tab. 362 Tav. spiss. tab. 2 f. 2.

Hab. in graminoribus valle *Vivara* Dol. infra *Crna Planina* in *Penitice* Dol. infra Kom. et circa *Kovice* ad pedem *Mali Dvoracitor* (M.N.) Pantz. et super *Sutjaga* usque ad *Koprivica* et *Sutjesta* (Bohemia) Scand. U. rubro-serrulatae. Petri. acq.

Scabiosa longipetala Waldb. et Kit. fl. hung. var. T. p. h. Hort. fl austri

t. p. 90. Rehb. fl ex. p. 193

Se-inferiori glabra, superne pilosa, foliis indivisis oblongo-lanceolatis integrimarginalibus, superioribus tenellibus, foliis in verticilli nequivalentibus inter se variabilibus, corollis inaequalibus

Syn. *Knautia longipetala* Koch syn. *Knautia* sp. p. 376. Pantz. l. c. p. 37

Icon. Waldb. et Kit. l. c. t. tab. 5. Rehb. II. germ. XII tab. 676

Hab. in sylvestris montis *Istretica* in *Bjelagora* (Herzeg) et in *Penitice* Dol. infra Kom. (M.N.) Pantz. et in *Borvina* (Boh.) Scand. Petri. acq.

Valerianaceae DC.

Vis. fl. dalm. II. p. 18.

Post Valerianellam ciliatam DC. Vis. fl. dalm. l. c. addatur

Valerianella olitoria Poll. fl. galat. I. p. 30. Hort. fl austri. I. p. 39. Rehb.

fl. aust. p. 198. Pantz. adn. p. 36. Panzi. l. c. p. 43.

V. fructu ovato-subrotundo conpresso oblique, margine unisulcato, lateribus bi-costatis, costa altera tenuissima, loculo sterilis solitaria, calyx obsolete tridentata, bracteis ciliatis.

Syn. *Valeriana locusta olitoria* L. sp. pl. p. 47. Pedic. locusta Rehb. pl. crit. I. pag. 48.

Icon. Rehb. II. germ. XII tab. DCCVIII et pl. crit. I. f. 121-122. Coss. et Germ. atl. de Pav. tab. XXIV f. A. Engl. bot. t. 811.

Hab. in graminoribus circa *Trebina* et *Billekci* (Herzeg) Pantz., in cultis et dumetis ad Lettinge et prope *Viv.* (M.N.). fl. alti aut caerulecentes. fl. vere. Annua.

Valerianella carinata Lois. not. p. 149. Rehb. fl. ex. p. 198. Panzi. l. c. p. 43.

V. fructu subtriangolare cymbiformi, posticè profunde canaliculata, antice planisulcata in marginem dilatata, media et lateralestibus unicostata, calyx obsolete unidentata, bracteis ciliatis.

Syn. *Fedra carinata* Rehb. pl. cr. I. p. 51.

Icon. Rehb. II. germ. XII tab. DCCIX et pl. cr. I. f. 123. Coss. et Germ. l. c. fig. B.

- Ad Valerianellam usque ad Lebithe, et a Mravich, Doboci Katorshka usque
 ad Totscha, a Passin Konak ad Dobospolje, et ad Travnik. (Bosnia) Sestrn.,
 et in asperis ad Vir (MN.) Panč. H. ali aut certeentes. Fl. vire. Anna.
- Ad Valerianellam pumilum DC. Vis. fl. dalm. II. p. 19 adh. locum in herbido circa
 Trebinje (Herzeg) Pantk. adn. p. 36.
- Ad Valerianellam eriocarpum Desv. Vis. I. c. adh. locum in cultis circa Trebinje (Herzeg)
 Pantk. I. c. Tommas. veg. Vogt. in campis Maria di Capo et Veglia (Dalm.), et
 adh. iconem Rehb. ii. germ. XII tab. DCCXII.
- Ad Valerianellam Morisonii DC. Vis. I. c. p. 20 adh. syn. V. dentata Host fl. aust. I
 p. 39 et icones Rehb. ii. germ. XII tab. DCCXI et Coll. et Germ. I. c. tab. D.
 numer. locis circa Cetinje (MN.) Pantk. adn. p. 36, et in campis Capriaco, Veglia,
 Dobrinje (Dalm.) Tommas. I. c. et circa Travnik ad Bukovica, Tellin, Sutym,
 ika (Bosnia) Sestrn. sub V. dentata Poll.
- Ad Valerianellam auricula DC. Vis. I. c. p. 20 adh. locum in agro circa Cetinje
 (MN.) Pantk. I. c. Tommas. I. c. p. 42 in agro humido ad Capriaco, Pajevac, Ga-
 rize in ins. Veglia (Dalm.) ; et Var. B. laevocarpum Koch fructu hispido a
 Travnik ad pedem Vranjich (Bosnia) Sestrn. - adh. iconem Rehb. ii. germ. XII
 tab. DCCIX
- Ad Valerianellam hamatam DC. Vis. I. c. adh. locum in herbido circa Trebinje (Herzeg)
 Pantk. I. c. et ictem locis ad Cetinje et inter vineas ad Klopot (MN.) Pantk. I. c.
- Ad Valerianam montanam L. Vis. fl. dalm. II. p. 22. adh. iconem Rehb. ii. germ. XII
 tab. DCCXII, et locum in pratis alpinis montis Sastrebica in Bjelagora (Herzeg.), in
 pascau Carina in monte Kom, circa lacum Riblje Jezero et in Mali Durmitor
 (MN.) Pantk. I. c. p. 37, in saxonibus in Durmitor, Favore et Kom (MN.) Pantk. I. c. p. 42, et ad Su-
 tyngia super Poljane, prope Borovica (Bosnia) Sestrn.
- Ad Valerianam tripteridium L. Vis. fl. dalm. II. c. adh. iconem Rehb. ii. germ. XII
 tab. XII tab. DCCXXII et locum in monte Vranjich super Baklar (Bosnia) Sestrn.
- Ad Valerianam tuberosam L. Vis. I. c. adh. locum in herbido montis Glava proprie Trebinje
 (Herzeg) Pantk. I. c. et iconum Rehb. ii. germ. XII tab. DCCXXIII. Dein addatur
 Valeriana saxatilis L. sp. fl. p. 45. Host fl. aust. I. p. 38. Rehb. Fl. ex. p. 99. Paul. I. c. p. 43.
 V. radice fibrillata, foliis indivisis aut subdentatis 3-5 nervis ciliatis, infimis oblongo-
 spatulatis, longe petiolatis, carinatis sessilibus lanceolato-lineariibus.
 Icon. Rehb. ii. germ. XII tab. DCCXX. Iaq. fl. aust. XII tab. 267.
- Hab. in saxonibus montium Favore et Kom (MN.) II. alb. H. aestate. Perenn. Non vidi.
 Valeriana celtica L. sp. fl. p. 46. Host fl. aust. I. p. 37. Rehb. Fl. ex. p. 99.
- Pantk. I. c. p. 37.
- V. endice squamosa-comosa, foliis indivisis integris glaberrimis, infimis obtuso-
 to-lanceolatis in petiolatum attenuatis caulinis sessilibus angustis linearibus.
 Icon. Rehb. ii. germ. XII tab. DCCXX. fig. 1418. Iaq. collect. I. tab. 8. Sturm. deutsch.
- Hab. in pascau alpinis montis Kom (MN.) Pantk. Flores exterius rubelli, intus fl. 44.
 fuligineos. H. aestate. Perenn.

Valeriana Betsisea Panc. et pl. vase. p. 42.

V. caule basi repente rami crenatis, foliis repensibus obtusis glabris, inferioribus ovalibus obsoletis, caulinis ~~longis~~ semiamplexicaulis oblongis remote dentatis acuminatis ~~indigentibus~~ trifidis que, floribus cymosifloris bracteis linear-lanceolatis marginis sellulatis, calycibus striatis glabris, corollis infundibuliformibus calyci longioribus.

Hab. in glaciis calcareis montis Betsise sub raga Visoke Greda. H. Aug. 1860.
H. carni. Legit et nom. il. prof. Panic. Perenn.

Descr. Caules prostrati nodosi radicantes, ramis simplicibus, floriferis, glabris, sub foliorum insertione puberulis. Folia superiore lyrate-triploides. Flores dense cymosiflori pedunculati, bracteis lanceolatis calycum duplo longioribus, corolla tubo conico limbo quinquelobis lobis obtusis ovato-rotundatis. Stanina tria anthers ellipticas. Stigma bipinnatum subinclinatum. Fructus ovalis truncatus, congregetus glaber, nervo marginatus, frice univariatus dorso tricostatus, areis intercostalibus angustissimis, pagis 18-radiatis incurso apice coronatus.

Obs. Affinis *V. globulariaefoliae* Lam., quae differt foliis integrimis nec repensibus, caulinis pinnatisectis nec superioribus triplois, bracteis lanceolato-lineariibus bractibus nec rotundatis elongatis; fructus costatis quinque, quarum media filiformis, duae subsectiones variisque propriis, duae extremae elevatae et maximum fructus constitutentes, dum in nostra variae sunt tria aequidistantia et aequilatera, et pagis 18 nec 12-radiata. — In icona *V. globulariaefoliae* Rehd. in gurm. XII tab. DCCXXIII fig. 1427 fructus costatis non bene exhibitis nec in vaga dorsum fructus unquam 4-costatum. — Affinis quoque *V. capitatae* Bell., sed obvoluta cl. Ober-
son in herb. Wallensteiniensi, nostra differt foliis ovalibus, nec ovatis, longe petiolatis, areis fructus inaequalibus, exterioribus latioribus, et pagis 18 nec 12-radiatis. A *V. Oleneae* Boiss. distat caule omnino glabro, foliis integris, corollis basi gibbos. nec calcariatis.

Compositae Adans.

Vis. fl. dalm. II. pag. 23-126 -

Ad *Echinopem* Ritr. L. Vis. I. c. p. 36. adde locum in agriis Cassione, Befanore, Cagnuccio (Dalm.) Tommas. veg. Vegl. p. 45.

Ad *Echinopem* Ritr. B. elegantem Vis. I. c. adde locum in tectoriis montis Lovcen et supra Sahovo (M.M.) Panc. et pl. vase. p. 50. — Addatur *Echinops ruthenicus* Bieb. fl. taur.-cauc. III. p. 597. Rehd. II. ex. p. 293. Vis. II. p. 593. Fl. 228.

E. caule ramoso foliisque pinnatifidij subhyposcapho-tomentosis rugis vividulis glauco-intervallis dulcis. his pinnulis lacinias ovato-lanceolatis, marginis pinnatis, involucri setis dimidiatis ^{superioribus} ~~inferioribus~~ ^{longioribus}, dorso labiatis velutinibus ~~velutinibus~~ ^{velutinibus}, marginis breviter utatis.

Jean. Adh. 1860. x 16. De continet agrestis.

- Syn. *Echinops bannaticus* DC. prodr. 1. p. 524. *Roch. pl. ban. var.* p. 22.
 Part. L. p. 50 (non *E. ruthenicus* Roch.)
 Icon. *Rchb. pl. crit. v. tab. 642* et icon. germ. XV tab. DCCXXXIII
 Hab. in Taxolis ad *Limbani* in valle *Cymnica*. H. caerulei. H. Augusti. Non vidi.
 " *Echinops sphaerocephalus*, L. sp. pl. p. 1314. *Hast. H. austr.* II. p. 523. *Rchb.*
W. K. p. 293.
*E. caerule subramoso, folij pinnatifidj, supra virido-pubescentibus hirsutis,
 subtus cano-tomentosis, laceris ovato-oblongis divergentibus runcinato-
 spinis involutis setis interioribus medium longitudinem representanti
 bus, medijs sub nullis, interioris dorsi pubescentibus, margine breviter ciliatis.*
 Icon. *Rchb. ic. germ. XV tab. DCCXXXIV.* *Gibb. et Son. gr. X tab. 923.* *Ced. H. dan.*
 " *Echinops sphaerocephalus*, L. sp. pl. p. 1314. *Hast. H. austr.* II. p. 523. *Rchb.*
(Bosnia) Sendl.
 XIII tab. 2129.
 Hab. in Transilvania nym Kisejek et Lepeniza usque ad Poenissa. H. coerulea.
 " *E. caerulea*.
 Ad *Calendularia arvensis* L. *Vit. fl. Dalm.* II. p. 26. adde locum in agric.
 circa Regusa (Dalm.) et Trstine (Herzeg.) *Pantk. adn.* p. 43, et in agris
 et cultis circa Veglia et Valle di Bona (Dalm.) *Pommer. I. c. p. 44.*
 Ad *Xanthemum cylindracum* *Tur. gr. p. 172.*
 Ad *Calendularia arvensis* B. rugosam *Vit. fl. Dalm.* I. c. adde loco circa Spalato
 Pett. et in ins. Lesina Bottari, *Syn. C. sublanata Rchb. f. on germ.* XV. p. 99
 et *Icon. XV. tab. 160. DCCXL. f. I. II.* — *Adde*
Xanthemum cylindracum *Tur. fl. gr. prodr. II. p. 172. Rchb. f. exc. p. 291.*
*X. involucris cylindricis, squamis exterioribus ovatis mutatis disco tomentosis
 margine late glabritis, interioribus lanceolatis exsertis.*
 Icon. *Rchb. pl. crit. VII tab. 862* et icon. germ. XV tab. DCCXXXVIII. *Moris. hist. pt. I. VI. tab. 12.*
 Hab. circa Cenija supra *Kelocin* ad *Katyunka* (Bosnia) *Sendl.* H. purpurea.
 H. aculeata. Annuum.
 Ad *Amphoricarpon Neumayeri* *Vit. I. c.* adde locum in agric. *Koristna*
Grada prope Kicia in Bjelagora (Herzeg.) et in 1801 p. Out Dzonov dictij
infra montem Kom (MN) Pantk. I. c. p. 43. et in ripis tributariis locis
Velika Istratica supra Grakovo in m. Durmitor versus Crvena Skijena
et in m. Kom ad Vrboke Grada (MN) Pantk. I. c. p. 54. Rchb. ic. germ. XV. et DCCXVI.
 Ad *Carlina vulgaris* L. *Vit. I. c. p. 29* adde locum in prasies et aridis *Caprius*,
Castelnuophio int. Veglia (Dalm.) Pommer. I. c. p. 45, et iconum *Rchb. ic. germ.*
DCCXXXVII. XV. tab. 8. DCCXXXVIII. *Adde*
Carlina longifolia *Rchb. pl. crit. VIII. p. 25.* *Gris. in Pantk. adn. p. 43.*
C. caerulea subspicata *floccosa* *folij linearis-oblongis integriformis spinoso-
 atij, involucris foliolis exterioribus bipinnatifidj interioribus lacerolatis
 mucronatis, radianibus ad medium ciliatis bracteis capitulo longioribus*
 Syn. *Carlina nebrodensis* *Guss. syn. 1. c. II. p. 433. Koch syn. germ. II. p. 464.*
 Icon. *Rchb. pl. crit. VIII. tab. 1008*, et icon. germ. XV. tab. DCCXLII.

- C. Centauraea longifoliae* Rehd. fl. cort. VIII. p. 25. Figs. in Panth. Ad. f. 43
C. caerulea subsp. *longifoliae* floccosa, foliis linearibus longioribus acutioribus, petiolis extrorsum excurrentibus
et ramulis ad terminali, raro etiam ad inaequilaterali, non capite lato, non capite lato, non capite lato.
C. Centauraea acanthothrix Willd. f. c. locum ad. locum.
- Syn. *C. nebrodensis* Guett. syn. II. p. 632. Note: syn. siccum Illyricum
Pan. - Rehd. il. germe XV. tab. DCLXVII. et fl. cort. VIII. tab. 1008.
- Hab. in agri vallis fluminis Tarn infra Kom. (M.N.) H. abit. Fl. mestala Bicunum. tab. 2008. t. 7000 m.
Ad C. romana L. dist. ab alio loco in monte Cyclophyllus (M.N.) Caput Thymos 65 et 6600 m. tab. 2008.
C. Centauraea acanthothrix Willd. f. c. locum ad. locum in Kacerevo, Lettingen, Cava
Skrbovo (M.N.) Pan. l. c. p. 52, et ad Begov Beg, et Kukla ad. Cava. (Bosnia) senecta et iuvenilis.
Ad *Centauraea acanthothrix* Willd. f. c. locum in præcipue monte Tric, Savojec et sub Rete
Jova (M.N.) Pan. l. c. et iuvenilis tab. il. germe. XX tab. 2000 m.
- C. Centauraea alba* L. V. c. p. 31 ad. locum in montibus, Stoka Skala, dicta Valley
Punica supra montes kom. (M.N.) H. abit. tab. 2008. t. 7000 m.
Dolop proprie Prizren in Polog (Horus) et circa Sandzjan (M.N.) Panth. l. c. in monte
Lettingen, Cava et Vir (M.N.) Pan. l. c. p. 53. et in agri Bacanovica et in Cava
Cavum (Bosnia) Vraca. l. c. p. 45 et ad Sieja fagri Bosnja, et Cava supra Ljuna (Bos-
nia) Sandzjan. Et hab. l. c. abe. in iuvenilis tab. l. c. iuvenilis tab. il. germe. XX tab. 2000 m.
- Ad *Centauraea cyanus* L. V. c. tab. 32 ad. locum in asperis Nikogiccia Rego
et ad Vir (M.N.) Pan. l. c. et iuvenilis tab. il. germe. XX tab. DCLIII. sub
C. amara L. et C. Webberiana Rehd. fl. cort. p. 213.
1. Ad *Centauraea cyanus* L. V. c. tab. 32 ad. locum circa Trivize (Horus) Panth. l. c. in rati ad Lettingen
Cava, Skrbovo (M.N.) Pan. l. c. p. 53. Juv. et ad Vlasici super Bakleni (Bosnia) Senec-
- Anticus 3. Cava et rati ad Lettingen. Cava circa Trivze et rati ad Lettingen et rati ad Cava
C. cyanus et rati ad Lettingen et rati ad Cava. Cava et rati ad Lettingen et rati ad Cava
et rati ad Lettingen et rati ad Cava.
- Hab. in præcipue cariis infra kom. (M.N.) Panth. Inferioribus præcipue rati ad Lettingen
et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen
- Ad *Centauraea cyanus* L. subsp. *trifida* C. cyanus l. c. ad. locum in Polog et in rati ad Lettingen
et distinguenda posteriori, postea cum permixta est. Cava et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen
et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen
- Ad *Centauraea montana* L. V. c. l. c. p. 33. Var. 2 integrifolia tab. ad. 170. C. heterophylla Panth.
l. c. et locum in agri monte Gora proprie Marica (M.N.) tab. 2008. l. c. et l. c.
in valle rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen
et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen
et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen
- Ad *Centauraea sibirica* L. V. c. p. 34 in graminis monte Sajak in Polog (Horus) Panth. l. c. et iuvenilis
in rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen
et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen et rati ad Lettingen
- Ad *Centauraea cinerea* L. V. c. l. c. p. 35 ad. locum Ahd. f. c. germe. XX tab. DCLXII.
- Ad *Centauraea salminana* L. V. c. ad. locum in agri rati ad Lettingen Panth. l. c. et in agri ad Cava et
Nikogiccia Rego (M.N.) Pan. l. c. p. 38. Ad. locum spina Rehd. fl. form. XX tab. DCLXIII.
- Ad *Centauraea lutea* L. V. c. 40 ad. locum Rehd. fl. 11. XX tab. DCLXVI. Et obs. præsumt. plantas 17 m. et
ad *Centauraea lutea* L. V. c. 40 ad. locum Rehd. fl. 11. XX tab. DCLXVI. Et obs. præsumt. plantas 17 m. et
- Ad *Centauraea lutea* W. V. c. l. c. p. 37 ad. locum Rehd. fl. 12. XX tab. DCLXI f. 1.

- Asterus
- 3) *Abdientus Centauraea phrygia L.* pl. p. 1287. Hort. H. auf M. Op. 519. fol. 117 r. p. 213
C. pulcherrima Röhl. ex Wigg. subsp. *hirsutella* (Wigg.) Spreng. *Centauraea capitellifera* subsp. *pilosella*.
varium spicatum e brach. lantebr. longe, velutinum primum - prolinum recurvum,
atque fetaceum, paxie arctiora brown
Icon. Pich. et Germ. XVI tab. 800LXXIII et pl. crit. tab. 58. C. L. B. t. 526
Syn. *C. nervosa* W. en. binn. II. p. 925.
Var. sinuata: foliis mediis revolutis - pinnatifidis. Sp. L. evoluta H. v. sinuata Griseb. in Pansh
1. c. p. 54
Hab. in pratis Carnia iuxta Konig (M. A.) Pannh
Obs. Accid. opinione et. Godr. et Pich. pl. paxie quez paxie ~~longioribus~~ per vim achenis
variat, nam in ^{aut paxie} ~~longioribus~~ istum paxie aequaliter, in pratis multo paxie brivior
variolos: hinc ^{varius.} s. p. Pannh. omnino evanescit inter C. phrygia et C.
nervosa W. est autem Pich. t. 800LXXIII ^{hirsutella} (Wigg.) Spreng. et ^{in hirsutella} *C. amplexicaulis* Willd. nostra est ^{Hirsutella} (Wigg.) Spreng. floribus longioribus
Reparatus 1. Oct. Briss.
- Chrysanthemum coronarium* L. Martius. I. c. 303
- Artemisia absinthium* L.
Senecio cineraria W.
Rivularia vulgaris Desf.
Verbesina buttona Cass.
Heliotropium peruvianum var. *carolinum*
Cocculus ignobilis Zott.
Cocculus laevigatus L.

Hab. in apricis vallis fluminis Dava infra Horn (M.N.) Holbi. Flora
acetosa. Bienn.

Ad carlinam corymboram L. Vis. fl. dum. t.c. ad locis in agnis et agri
cis Lappone, et Castellum p. m. Veglia (Dalm.) Tommasi
t.c. et in campis ad Lettinge, Vir. Gradovo (M.N.) Panici
c.p. 52, et ad iconem Rehb. f. in germ. XX tab. DCCXLIV.

Ad carlinam acanthopolioidem Will. Vis. fl. dum. II p. 30 ad locum
in saxonis ad Lettinge, Covo, Grabovo (M.N.) Panici t.c. p. 52
et ad Begir Beg et Kulla ad Scopia (Bohemia) Lenstr., et ad
de iconem Rehb. f. icon. germ. XX tab. DCCXLVI.

Ad carlinam acetalem L. Vis. t.c. ad locum in parvis monti
Svica, Savoje et sub Bjelagona (M.N.) Panici t.c. p. 52, et iconem
Rehb. f. in germ. XX tab. DCCXLVI et ad locum Var. simplex Vis
t.c. Rehb. f. t.c. tab. DCCXLVI f. 5.

Ad Centaurium album L. Vis. t.c. 31 ad locum in ripariis
Orlova Skala dictis, vallej Fenicia infra montem Horn (M.N.)
et iconem Rehb. p. 4 germ. XX tab. DCCXLVI. Et ad Vas. splendens t.c.
fl. dum. ad locum in apricis vallis Zastap prope Graueanov
in Bjelagona (Hercag), et circa Sutzen (M.N.) Panici t.c. in case
uf Lettinge, Covo et Vir (M.N.) Panici t.c. p. 53, in apricis Besia
rectis et aliis in ins. Veglia (Dalm.) Tommasi t.c. p. 45, ad Turza
infra Borovagata, et a Quer arque ad Livno (Bosnia) Lenstr. Et sub
C. alba Var. decisa Rehb. t.c. ad locum Rehb. ii. XX tab. DCCXLII.

Ad Centaurium Iacobaeum L. Vis. t.c. 32 ad locum in asperis
Nicksieka Dupa et ad Vir (M.N.) Panici t.c. sub Camara
(M.N.) et Trasnik et peior Vassieki (Bosnia) Lenstr., et ad locum
iconem Rehb. f. in germ. XX tab. DCCXLIII sub Camara L. et C.
Weldeniana Rehb. fl. ex p. 213.

Ad Centaurium cyanus L. Vis. fl. dum. t.c. ad locis circa Trebinje
(Hercag) Panici t.c. in saty ad Lettinge, Covo, Grabovo (M.N.) Panici
t.c. p. 53; in saty Veglia Dobrinje (Dalm.) Tommasi t.c. p. 45, et
ad Vassieki supra Baklari (Bosnia) Lenstr. Hunc subgenus
Var. p. marginata: foliis inferioribus pinnatisectis, quamvis
capituli non marginatis. Obs. Cl. Grisebach in Panth. ad.
hanc hybriden esse putat a C. cyanus et C. secaliorum et con-
stituunt duracione perenne (quod in specimenis authenticis
nihil obire, cui nihil deest, non corripit), foliis inus pinnate
rectis, lacinias oblongo-linearibus elongatis, involucrum spiculis
albus nigro marginatis.

Ad Centaurium Scabiosum L. Vis. t.c. ad locum in grossioris monte

Tephritis in *Bjelopora* (Herzg.) et in monte *Kom* et *Mali Durmitor*
nisi *Panth.* l.c.; in pratis montis *Luzia super Savine*, in domum
Provara superioris sub monte *Savojie*, et ad cocomem *Rchb.* l.c.
XV tab. I ad III sub C. *Scabiosa* et C. *coccinea* *Wittk*.

Ad *Centauream montanam* L. *Nic.* l.c. p. 38 l.c. a *Caligrifolia*
fl. salm. aida rya. C. *stricta* *hirt*. *Panth.* l.c., et locum in aperte
montis *Luzia* prope *Trebina*, vallis *Tajina* prope *Crakovac*,
et in vallis *Nadiv* *Brod* prope *Vucic* in *Bjelopora* (Herzg.), in ta-
xosif *Orlova Skala* in pza *Kom*, et in *Mujavine Planine*
(MN.) *Panth.* l.c., et ad cocomem *Rchb.* f. *genuina* tab. DCCXX
et DCCXXI. Ad *Var.* β. sinuatum *Nic.* l.c. adde locum in pugnate
vallis *Radov* *Brod* in *Bjelopora* (Herzg.) et in monte *Kom*
et *Mali Durmitor* ut C. *stricta* *Var.* a *Nic.* *Panth.* l.c. in ruge
tribus montis *Durmitor* iuga *Sijeme* (MN.) *Pani*. l.c. p. 53, et
~~C. stricta~~ locis relationibus montis *Diskarac* *enophyta* (Salm.)
Domino. sub C. *varilari* W.

Ad *Centauream tuberosum* L. fl. salm. II. p. 38, C. *nepaligenum* Rock
in Act. hung. Academice 1834 citatae *Rchb.* fl. n. gen. XV. tab.
2 Ad *Centauream sordidana* M. *Nic.* l.c. p. 38 adde cocomem *Rchb.* f. c. XV
tab. DCCXI f. 1.

1 Ad *Centauream rugosinam* L. *Nic.* *Pratin.* II. p. 38 adde locum in
insula *Bjelopora* (Salm.) *Marchesetti* descr. in *Bjelopora* Bull. Soc.
arbeit. teist. II. p. 302 + 303 et iconem *Rchb.* l.c. XV tab. DCCXCVIII
Ad *Centauream Frederici* L. l.c. locum aida speciem in insula
Bjelopora *piccole* (Salm.) *Marches.* l.c. et iconem *Rchb.* l.c.
XV tab. DCCXXXVI - C. *Pubes cinerea* *planta* *Sylvestris* cultio-
nario fit vel omnia evanescit.

Ad *Centauream incognitam* *Nic.* l.c. adde locum in rugosib. montis
Sutorman clivis *Mali Lonač*, et in *Bjelopora* inter *Vucic* *Zub*, et
Velika Tepetica (MN.) *Pani*. l.c. et aida iconem *Rchb.* l.c. tab.
DCCXXXVII fig. II.

Ad *Centauream Linariaea* L. *Nic.* *Pratin.* II. p. 35 adde cocomem *Rchb.*
l.c. xy. f. DCCXXXVIII

Ad *Centauream salmantinum* *Nic.* l.c. Vars. β. laevigatum adde locum
in aperte circa *Zakovo* (MN.) et in eiusdem ad *Levo* et ~~hinc~~
Niksicke iuga (MN.) *Pani*. l.c. p. 58. Adde iconem speciei *Rchb.*
f. l.c. tab. DCCXIII. Addatur

Centaurea phrygia L. sp. p. 1287. Hort. fl. austriat. p. 519. *Rchb.*
fl. exsp. p. 214.

C. puberula, caule exerto remoto caputato, foliis oblongo-ellipticis oratique
indivisijs dentatoflige capitulo subrotundis, involucris squamis
crista lanceolata longe subulata punto-fimbriatis recurvatis, aliis reticulis,
pappo achenio ~~multo~~ breviori.

Syn. *Centauraea nervosa* W. en pl. 1. b. vol. II p. 925

Icon. Rehb. filii germ. XV tab. DCC. XXIII et Rehb. pl. ex. cit. W tab. 554 Cod. p. Ann. t. 32.
 1 Var. *sinuata*: foliis mediis sinuato-pinnatifidis - Syn. *C. nervosa* Var.
sinuata Griseb. in Pantz. adu. p. 44.

Hab. in pratis *Carina* capra Kom (MN)

Obs. Cuius opinioni clt. Gedon et Rehb. fit, justa quod pappus in proportione
 sua cum achenis variet nam junior achenium sive aequalis et in
 fructu maturu fructu bimor variegatus: hinc quaevis differentia
 omnino fallax inter *C. glaucum* L. et *C. nervosum* W. Exemplar nos-
 trum semper juvenile - Hujus postremus Var. ambigua Rehb. f. in genu
 t. c. XV tab. DCC. XXVI fig. III similis varietati nostrae, sed a hac tec-
 niae foliorum longioris.

Centauraea Hauffelii Rehb. fil. i. germ. XV p. 27

C. caule sulcato singulis uniforme, foliis simplicibus petiolatis oblongis grossae den-
 tatis lyrate indivisiis superioribus sensibilius pinnatifidis, laciniis
 ligulatis dentatis, capitulo ~~dentato~~ ovoides-subrotundis subradiantibus,
 squamis marcescentibus laxis latissimis carunculam basius omnino te-
 gentibus longe ulicato-fimbriatis, aliis extorris ~~laminas~~ radiis anguste
 bus pappo acheniis cylindricis multo breviori.

Syn. *Centauraea Kotschyana* Hauff. ms. ex. nec Koch syn. pl. II p. 103. Pantz.
 t. c. p. 44. Panz. ex. pl. p. 53.

Icon. Rehb. fil. t. c. XV tab. DCCC I

Hab. in pratis vallis fluminis Tava inf. Kom et in pratis ad pedem montis Meli
Durmitor prope pagum Kovice (MN) Pantz. et in pratis sylvestribus ubi
 monte *Durmitor* versus jugum Stolac (MN) Panz. fl. atro-sanguine. Haustis.

Obs. Cl. *Panicum* in cl. pl. vere huic addit. *C. atropurpureum* Walst. et Kit. et locum
 indirect. in ripis tribus ad *Cetina* Stjena m. Durmitor in MN, sed haec non vidi.

* Ad. *Carduum acanthoides* L. vis. ft. datum supp. 56 ad locum in cultiis ad Nijegos-
 Cetinje, Vir (MN) Panz. t. c. et in agris ad Bokovica et m. Vlasich super
 Baklarji (Bosnia) Sestari, et floribus coloribus purpureum, florescentiam Julio
 et Augusto, et durationem biennem. Rehb. fil. i. germ. XV. tab. DCC. XXIII. Adh-
 queque locis in Vellebiti Podgora et circa Cetina (Dalm.) necnon in m. Drin.

Ad. *Carduum nutans* L. Vis. t. c. p. 46 ad locum in eris et populis ins. Veglie
 (Dalm.) ^{languis} in Cetinje, Vir. Veg. t. p. 45 et iconem Rehb. fil. t. c. XV. f. DCC. XXVII. Huic adlocum

Var. *b. macrocephalus*: caule lanuginoso, floribus squamisque nebulosis -

Syn. *C. macrocephalus* Desf. pl. 442. f. 245. DC. p. 134. VI. p. 621. Griseb. sp.

et in Pantz. t. c. p. 45 = Hab. in lacu v. prope Tschirnje (Herceg) Pantz. fl. querqueri. It. auctate
 Bienn.

Carduus pyramidalis Gay. Pl. austr. IV. p. 25. Nutt. Pl. austr. II. p. 438. Reichenb. exp. p. 283.
C. caeruleus apice angustissime lateo, foliis decurrentibus squamis sparsim pilosis,
 subulis arachnoideo lanatis, squamulis ciliatis, inferioribus late ovatis
~~lanceolatis~~ primo - parte, lacinia oblongis lobatis dentatis
 que, superioribus basi ovali lanceolatisque dentatis, capitulis aggre-
 gatis subtundit.

Icon. Schle. fil. 16. germ. XV tab. DCCCLXXIX. Gay. Pl. austr. IV. tab. 348. Hall.
 i.e. pl. tab. III.

Hab. in sylvestris montium Cna Planina et Koma (M.N.) Panth. I. c. p. 45
 infelix locis, sub m. Durmitor vesper jugaceae Strelac (M.N.) Panth. I. c. p. 51,
 et rixas Suilaga ad Kopilnica (Bosnia) Sendtn.

1 Ad *Cynodon* (*Vulpinastrum*) Vis. Pl. dalm. II. p. 42 adde obs. Inscius an
 sub hac specie lateat vel non *Cynodon vulgaris* Cassia eadem similit,
 a cl. Tommasini I. c. p. 46 indicate in ins. Veglia in campis et vineis
 (Dalm.), et a Sendtn ad Suiza nigra Borovaglava et a Giver ad Livo
 (Bosnia) cuiusvis taxa hanc omittere; neutrorum non visa

2 Ad *Centropyllum lanatum* DC. Vis. I. c. p. 43 adde locum in agris circa
 Graniacov (Herceg) et Bjelka et Bogeticu (M.N.) Panth. I. c. p. 45 ad mar-
 gines agrorum circa Kijev et Grahovo (M.N.) Panth. I. c. p. 53, et ad Genjaja
 supra Kalocsin usque ad Subyntka (Bosnia) Sendtn.

3 Ad *Sylibium meridianum* Gaertn. Vis. I. c. p. 44 adde locum in agris circa
 Trebenje (Herceg) Panth. I. c. p. 44, et in saxosis supra coemeterium
 Ostrog (M.N.) Panth. I. c. p. 51.

4 Ad *Oenopordon illyricum* L. Vis. Pl. dalm. I. c. p. 45 adde locum in campis ad Cet-
 nje et in saxosis supra Grahovo (M.N.) Panth. I. c. p. 52, et ad margines
 agrorum et viarum locis aridissimis, ins. Veglia (Dalm.) Tommas. I. c. p. 45
 Gyromonum leucocarpum Cass. Vis. I. c. p. 44 adde locum in muris civice
 Zara (Dalm.), ad Trebenje et Vraca in Bjelagora (Herceg) Panth. I. c.

5 Ad *Carduum candicans* Willd. Kit. Vis. I. c. p. 48 adde locum in agris Bjelje
 Supie dictis prope Dubrovac in Bjelagora (Herceg), in valle Virnia Dol infun-
 Cna Planina, et in valle Peruci et Dol supra Koma (M.N.) Panth. I. c., et
 sub C. collins C. candicans p. collins Vis. I. c. C. collins Willd. Kit. add. locum
 in clivo Graniac grope Lettinge, in saxosis nr. Ivica et sub Cnava Stijena
 ad Carduus chrysanthemum Lam. Vis. I. c. p. 42 adde locum in coliby turbido ad
 Blaca districtus Dobrojaci (M.N.) Panth. I. c. p. 51, et in pratis rixis Veglia, Papradz, Garize
 (Dalm.) Tommas. I. c. p. 45 et a Travnik ad Segac (Bosnia) Sendtn.

6 Ad *Carduum costatum* Lam. Vis. I. c. p. 42 adde locum in coliby turbido ad
 Blaca districtus Dobrojaci (M.N.) Panth. I. c. — Post hunc d. Panth. report
 t. c. suum *Carduum ramosissimum*, quem non videt, sed dicitur efformi C.
 Imoleo Boiss., a quo differt corymbis florum latioribus, squamis interioribus
 duplo latioribus, foliis propinquius rectis, et spinis caulinis ac foliorum copioribus
 tuis et validioribus. Moesium videolet.

7 Ad *Carduum pyramidalis* Gay. Vis. I. c. adde locum in saxosis sub m. Lovien (M.N.)
 Panth. I. c. p. 51 et ad margines viarum ins. Veglia (Dalm.) Tommas. I. c. p. 45 et ad locum Reichenb. exp. germ. XV tab. DCCCLXXIX.

- Ad. in agris vallis fluminis Tava infra Kom (MN). H. alti. Haereticae Bienn.
 ad Castinam corymbosum L. Vis. H. dalm. l.c. adde loco in agri et agricis Cognacio,
 Castellum phis ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. et in campis ad Lettinge, Vis, Gra-
 hovo (MN) Pan. l.c. p. 52, et iconem Reb. ic. germ. XV tab. DCCXLIV.
 Ad Castinam acanthopodium All. Vis. H. dalm. l.c. p. 30 adde locum in saxonij ad Lettinge,
 Covo, Grahovo (MN) Pan. l.c. p. 52, et ad Begir Beg, et Kulla ad Suiga (Bosnia) Sendo.
 et adde iconem Reb. ic. germ. XV tab. DCCXLVI.
 Ad Castinam aculeum L. Vis. l.c. adde locum in priscis montibus Vraca Savoje et sub
 Bjelagor (MN) Pan. l.c. p. 52, et iconem Reb. ic. germ. XV tab. DCCXLVII. Et ad Naturae
 Var. p. simplex Vis. l.c. Reb. ic. germ. XV tab. DCCXLVI f. II.
 Ad Centauriam altam L. Vis. l.c. p. 31 adde locum in vegetribus Oktava Skala dicitur
 vallis Peruna infra montem Kom (MN) et iconem Reb. ic. germ. XV tab. DCCXLVIII.
 et ad Var. p. splendens fl. dalm. adde locum in agris vallis Zastap prope Graue
 revo in Bjelagor (Herzeg.) et circa Sindzon (MN) Pant. l.c. in saxonij Lettinge,
 Covo et Vis (MN) Pan. l.c. p. 53; et in agris Berevaceilia etc. in ins. Veglia (Dalm.)
 Tommas. l.c. p. 45. Et ad Suiga supra Bjelagor et a Civer usque ad Livo (Bosnia)
 Festauer. Et sub l.c. alba Vis. multa Reb. l.c. adde iconem Reb. ic. germ. XV tab.
 DCCXLVII.

- Ad Centauriam Iaccam L. Vis. H. dalm. II. p. 32 adde locum in agris Neksiaka
 Luge et ad Vis (MN) Pan. l.c. sub C. amara (^{MN}) et a Dravnik ad pedem
 Vlastich (Bosnia) Sendo, et iconum Reb. ic. germ. XV tab. DCCXLIX (sub C.
 amara L. et C. Weldiana Reb. H. ex. p. 213.).
 Ad Centauriam Cyanus L. Vis. l.c. adde loco circa Trebinje (Herzeg.) Pant. l.c.;
 in satij ad Lettinge, Covo, Grahovo (MN) Pan. l.c. p. 53; in satij Veglia, Do-
 bringe (Dalm.) Tommas. l.c. p. 45, et a Vlastici supra Baklari (Bosnia) Sendo.
 Et huic subjungit C. Cyanum L. Vis. marginatum: foliis inferioribus primatis
 seculis squamis capituli nigro marginatis - Obs. Et Grisebach in Pant. l.c.
 hanc hybridam esse putat a C. Cyanus et C. Scabiosae, et distinguunt durationes
 perenni (quod in specimine authenticis nihil obiro, cui radix deest, non con-
 spiratur), foliis imis punctatim, laevius oblongo-lanceatis elongatis, involu-
 cri squamis latius nigro marginatis.

- Ad Centauriam montanam L. Vis. l.c. p. 38 Var. a. integrifoliam fl. dalm. adde syn.
 C. stricta Kit. Pant. l.c. et locum in agris montibus Glava prope Trebinje,
 ville Tuzina prope Orahovac, et in valle Radus Brodo prope Vraca in Bjelagor
 (Herzeg.), in saxonij Oktava Skala infra Kom, et in Sinjalina Planina (MN)
 Pant. l.c. et iconum Reb. fit **XV** tab. ~~DCCXLIX~~ et DCCLXXI: ad Var. B.
 sinuatam Vis. l.c. adde locum in pratis vallis Radus Brodo in Bjelagor (Herzeg.), et in
 monte Kom et Mali Demitor (sub C. stricta var. Vis.) Pant. l.c. in vegetribus mon-
 tibus Demitor iugo Sjeme (MN) Pan. l.c. p. 53 sub C. axillaris L. etiam in ^{Dalm.}
 Ad Centauriam Scabiosam L. Vis. l.c. in graminis montibus Sastrebie in Bjelagor (Herzeg.)
 Pant. l.c. et in pratis in Tivica supra Savnic, in dumet Morava susp. sub m. Turoje, et iconem
 Reb. ic. germ. XX tab. I-III sub C. Scabiosa et C. cerathea W. Kit.

Ad C. tuberosum L. H. dalm. p. 35. C. tuberosum H. d. in act. hunc.
 Et in Dalm. 1834. l.c. cetera. Sub. 1834. p. 35. C. tuberosum H. d. in act. hunc.

Ad Centauriam rugosum L. H. dalm. p. 35. adde locum in ^{parte} Tivica (Dalm.) Marchesini et C. Friderici sic locum
 in ins. Pelje Pelje (Dalm.) Marchesini et C. Friderici sic locum
 ad Centauriam rugosum L. H. dalm. p. 35. adde locum in ^{parte} Tivica (Dalm.) Marchesini et C. Friderici sic locum

- 6 Ad Centaurium incompletum Vif. l.c. in vegetib; nr. Lutorman, divo Mati Lonac et in
 Biela Gora inter Veliči Tab et Velika Sopobica (MN) Paní. l.c. et iconem Rehb. f. T. XV tab. DC
 CLXXXVII p. II.
- Ad Centauriam Cineraria L. Vif. f. dalm. II. p. 35 adde iconem Rehb. f. 1c germ.
 XV tab. DCLXXII
- Ad Centauriam salomonitanaum Vif. l.c. Var. ³ lanceolatam adde locum in agriq; circa
 Lukovo (MN), et in iisdem ad Čevo et Nikšićka Zupa (MN) Paní. l.c. p. 58. Adde
 iconem specie Rehb. f. c. tab. DCCXLIII
- Ad Centauriam Tricerii Vif. f. dalm. l.c. p. 40 adde iconem Rehb. f. c. tab. DCLXXVI
- Obs. Pubes cinerea plantae cylindrici cultum evanescit. Gr. Maseretti dice, si. Plagon in
 aff. C. dimidiatum Sch. p. 270. ^{Bullet. Soc. Agric. Zagreb. 1870. n. 2. p. 380.}
- 5 Ad Centauriam sordidaum W. Vif. l.c. p. 39 adde locum Rehb. f. c. XV tab. DCCXCI p. c.
^{Tumulis appendice ampliante undique rami}
- Ad Centauriam Post-Centauriam ³ laccaum L. addatur
 & datur
- Centauria phrygia L. p. pl. p. 1257. Hort. fl. austri. II. p. 519. Rehb. f. C. p. 214.
 C. pubula, caule erecto ramoso angulata, foliis oblongo-ellipticis ovatoque integrifoliis
 vix dentulatisque, capitulis subrotundis, in verticilli squarrosis e basi lanceolata
 longe subulatis, pinnato-pimbriatis recurvis, ciliis setaceis, poppe actinio brevior
 Syn. Centauria nervosa W. en. pl. h. ber. II. p. 925.
- Don. Rehb. f. 1c. germ. XV. tab. DCLXXIII et Rehb. pl. crit. IV. tab. 55k. Oed. feden. t. 520.
 Var. sinuata: foliis meisq; serratis-pinnatisq; — Syn. C. nervosa Var. sinuata
 Grise. in Panth. l. c. p. 44.
- Hab. in pratis ad Carina infra mortem Kom. (MN) Panth.
- Obs. Accedo opinioni cl. Godron et Rehb. fil. juxta quod populus in proportione sua
 cum aetherio variet, nam junior aetherium fere aequaliter, et in fructu
 maturi fructu brevior conspicitur: hinc ^{quasi} differentia omnino tollitur
 inter C. phrygianum L. et C. nervosum W. Hajek poterit Var. ambiguus Rehb.
 f. 1c. germ. l.c. t. c. XV tab. DCLXXVI f. III. Similis varietati nostre, sed in hac
 lacunae foliis ^{et} longioribus.
- Ad Crupinam Crupinastrum Vif. fl. dalm. II. p. 42 adde obs. Invenimus an sub hac specie
 lateat vel non Crupina vulgaris L. a cl. Tommasini, indicata in ins. Veglia in
 campis et vineis (Dalm), et a Sendtner ¹ et ⁴⁶ Tschitscherin super Borovnica et a ² Zizani ad
 Liven canting duxi hanc omittimus.
- Ad Centrophyllum laevulum D. Vif. l.c. p. 43 adde locum in agriq; circa Princiarovs (Hrav)
 et Fische et Božetić (MN) Paní. l.c. p. 45, ad marginem agrovum circa Negus et
 Štrbovo (MN) Paní. l.c. p. 53 et ad Ceniggo super Klobucem usque ad Subyunka (Bodine)
 sentia.
- Ad Stylbum marianum Gaertn. Vif. l.c. p. 44 adde locum in agriq; circa Robinoje (Hrav) Panth.
 l.c. p. 44, et 14801 supra ecuometorum Ostrog (MN) Paní. l.c. p. 51
- Ad Orozordon illyricum L. Vif. l.c. p. 45 adde locum in campis ad Lettinge, et in saxoriq;
 supra Štrbovo (MN) Paní. l.c. p. 52, ad marginem viarum, et locis arietinim in Veglia (Dalm)
 Donum. l.c. p. 45
- Ad Carduum nutans L. Vif. l.c. p. 46 adde locum in campis ad Lettinge et sub Danilevo Hrad (MN)
 Paní. l.c. p. 52, in ^{agriq;} incultis et praevis circa Veglia et Štrbovo (Dalm) Toman. t. 1. p. 45
- Ad Carduum canescens Wet. Kat. Vif. l.c. p. 47 adde locum in agriq; Biela Hrav dicti, prope Dubovac in
 Bjelovara (Hrav) et valle Vraca Dol supra Cura Marince et in valle Poniceva Dol supra Kom. Panth.
 (MN), et sub Cerdante, 3.000m. Vif. l.c. C. collino Wet. Kat. in duas praece proprie Lettinge, in saxoriq; montis
 Vraca et sub Cura Marince in Dubovitov (MN) Paní. l.c. p. 51; ^{Toman. t. 1. p. 45} in praece Vraca, Garice, Štrbovo (Dalm)

- Dominus, l. c. p. 45, et a Prunick ad Scopio (Boemia) tendit
② Cardium costatum Lam. Rupr. c. p. 93 ad locum in colline testiculis ad Blace
dicitur *Drobogaci* (MM) Pans. l. c. f. 1. Obr. Post hunc cl. *Panicum* refert loco citu
to suum C. romanescoanus, quem non vidi, sed dictar affirm. C. Donato Boiss. a grec
refert organis florum taxonibus, quanis indumentibus dulcis latitudibus, foliis pro
pendulis testis, et spinis caeruleis ac foliorum copiositate et velutinibus. Monachum
nudat.
- ③ Cardium pyrenaicum Lacy. Rupr. l. c. add. locum in Taxoii sub monte Lovien (MN)
Panic. l. c. cl. ad marginem viarum et in marginis ins. Vrgla (Dalm.) Pann. l. c.
881. Huius subjungit cl. *Panicum* l. c. C. multiflorum Gaed. in vegetribus ruporibus
tum. Orte involutus, qui tamen non differt a C. cretum L. nisi foliis subtilius lae
rentibus. (Pr. Reb. i. germ. XV tab. DCCCLXXX f. 1., sed neutrum vidi.)
- A) ④ Cardium austroideum W. K. H. Dalm. supp. p. 5b ad locum in agro monte Vermea
grape Cattaro (Dalm.), in passuibus alpinis montibus Kom., in valle Peneicea Dol infra
Kom et circa pagum Kovicee infra Mali Durmitor (MN) Pans. l. c. id ad Malo
Jandik, monte Vlastich rupor Baklari, et ad Veselac (Boemia) tendit.
- ⑤ Cardium acanthoides L. Rupr. l. c.

8 Additum

Centauraea Heuffelii Rehb. i. germ. XV. p. 27.

C. caerulea ^{imprimis unifloro} foliis insinuatis petiolatis oblongis ~~lanceolatis~~ grose dentatis lyrate
indivisiatis, ~~integerrimis~~, superioribus pinnatis petiolatis laevis, ligulatis, dentatis acutipetiolatis,
capitulo ovoides-patens subdistante, squamulis appendicibus lati, lati,
sinis exundans basin omnino tegentibus longe ciliata-fractibus, utrinque lanatis
medias agquantibus, passo achenis cylindricis multo breviores.

Syn. Centauraea Kobzheviana Heuffl. missr. nec Koch syn. pl. II. p. 123. Pans. l. c. p. 44.

Ikon. Reb. f. l. c. tab. 70 DCCCLXXXI. Panic. c. p. 53.

Hab. in gratis vallicis fluminis Tara infra Kom et in gratis ad pedem montis

Mali Durmitor grape pagum Kovicee.

Obr. cl. Peneice in Ali. f. 53 in tabulatione Centaurae atropurpureae Wetket, et locum indicat
in vegetate ad Cattaro Hispania in Durmitor ad hanc non vidi.

(A) Atolos

ad locum in cultu ad Nigros, Cettinijs Vr (MN) Pans. l. c.
et in aliis ~~in aliis~~ f. 51, et floris purpureis, florulatione foliis et angustis et durioribus brachium
et brachia ~~et~~ ^{et} foliis decurrentibus glabris vel subrugosis, profunde pinnatis, facies petiolatis
et foliis subpetiolatis, foliis dentatis, petiolis sparsis - ciliatis marginis valde spinosis,
capitulis, capitulis subrotundis ovalibus, pedunculis obtusis crassi spinosis
squamis lanceolatis agere petiolatis.

Ikon. Reb. f. l. c. germ. XV. tab. DCCCLXXXIII. Iacy. f. l. austri. f. l. tab. 249. Engl. bot. t. 928.

Hab. in montibus Velebit, Podgora et ~~Centauraea~~ Cattaro, nec non in monte Bienn
(Dalm.) H. purpurea. H. acetosa. Biennis

Cardium macrocephalum Desf. f. l. 2. p. 245. Coss. in Pans. l. c. p. 45

(B) Cardium petraeum L. p. macrocephalum Vr.
Var. caeruleum (Lam.) Pans. foliis rugosis majoribus - Syn. C. macrocephalum Desf. f. l. 2. p. 245. DCCXLIX p. 45
Vr. p. 621. 625. in Pans. d. m. p. 45
Hab. in Taxoii grape Trebinje (Herceg.) Pans. H. purpurea. H. acetosa. Biennis

- 1 Ad *Cistium monspeliacum* L. f. sp. ¹⁸⁰² p. 266 m. Horn, in Dalmatia. Dicitur etiam *prokaznik* (Bosnia).
2 Ad *Cistium antivirum* W. P. Nels. p. 152. ¹⁸⁹⁰ *Prokaznik* in Bergam. in agnus caeruleum. Verma prope Cetina (Slav.) in monte apennino.
2 Addit. ~~Ad Cardunc. foliis opacata~~ ^{it is Malva} *Cardunc. foliis opacata* Tsch. f. 1825. Holt f. 1825. p. 188. Achel. p. 283. p. 283.
- Cardunc. foliis opacata*
Cultivatus aegyptius p. 283. *C. foliis demissisibus* super speciem pellit subtiliter arachnoidea lanata, epicalyp. ciliata,
infundibul. late orbic. punctato-partit. faciebus oblongis totatis rotundig. superioribus
orbis lacinia subrotundig. capitulis aggregatis subrotundig.
Icon. Achel. p. 18. germ. tab. 142. ¹⁸⁰⁰ XXXIX Tsch. f. 1825. Holt. tab. 348. Hall. icon. tab. 111.
Hab. in tybericis montibus Cava Planina et Horn (MN) Pantl. t.c. p. 45, in tybericis
ad monte Diciniorum ^{ad monte} *Leupufjugeas* Habel (MN) Pantl. t.c. p. 51, et supra *Savijiga*
ad Kopitnica (Bosnia) Schindler.
- 3 Ad *Cistium laevistolonum* Tsch. Vis. H. Slm. 1825 p. 19 adde locum in sativis ad Singar.
Vis (MN) Pantl. t.c. p. 50, in incolis et frumentis Castelnuovo, Seglia (Dalm.)
Dominga. t.c. p. 45 et iconem Holt f. 18. germ. XV tab. DCCXXVI f. t.
- 4 Ad *Cistium eriophorum* Scop. Vis. t.c. adde locum in prati m. Syria sub m. Dur
nitior et ad Mericenu D. sub m. Horn (MN) Pantl. t.c. Holt. loc. cit. tab. DCC
Ad *Cistium avense* Tsch. Vis. t.c. in sativis ad Nijegoš, Grishovo (MN) Pantl. t.c. Holt. t.c.
tab. DCCXLII et DCCXLXXXVIII

Additores

- Cistium ferox* DC. sp. fr. ed. III n. 3092. Pantl. t.c. p. 50. Holt. t.c. germ. XV p. 50
C. foliis ampliexicardibus punctatis supra latis suberimis, subtiliter latis-
mentatis, capitulis sub involucratis squamis spinis papillulatis subguttulatis
Syn. *Cnicus ferox* L. Mant. pl. p. 109. *Cnidium ferox* Lam.
Icon. Holt f. 18. germ. XV. tab. DCCXXIV
- Hab. in peninsula ad Grozë (MN) Pantl. H. albida vel purpurea. H. t. p. 50. Bienn.
Cistium decipitatum Tsch. fidei ^{in Pantl. t.c. p. 45.}
C. foliis angustatis pilosatis apice rotundatis bipartit. late lanceolatis, remotis spinis apice
numeratis sicut subtiliter subtiliter capitulo aggregatis subrotundatis subguttulatis
Hab. sub monte Iwancicis speciebus, non raro sub tanacetinosis.
- Hab. in tybericis vallis Persecice Dalm. supra Horn (MN) Pantl. H. aestata. H. t. p. 50. Bienn.
C. angustifolium L. ^{t. 1802} *C. angustifolium* L. t. 1802. ¹⁸⁰² p. 250 - Et in Pantl. t.c. p. 45
C. angustifolium L. foliis ampliexicardibus punctatis expandit oblongis acuminatis sub
lanceolatis, numeris linearibus rimbata. ^{oblongis} ^{oblongis} ^{oblongis} ^{oblongis} ^{oblongis} ^{oblongis}
lanceolatis, numeris linearibus rimbata. ^{oblongis} ^{oblongis} ^{oblongis} ^{oblongis} ^{oblongis} ^{oblongis}
Hab. in tybericis vallis Vintgar Dol infra Cava Planina, et in valle fluvialis Dava supra Horn
(MN) Pantl. H. purpurea, sive gris. H. aestata. Bienn.
- Ad *Cistium Erisithales* Scop. Vis. t.c. p. 49 adde locum in grecinoris montibus Styraeana Phoenice
(MN) Pantl. t.c. et in prati tybericis sub m. Durrutio (MN) Pantl. t.c. p. 50
- ~~Ad~~ *Cistium parviflorum* Sp. 1811. veg. III p. 375.
C. caule rosato tomentoso angustis. foliis angustis. ¹⁸²⁵ ¹⁸²⁵ ¹⁸²⁵ ¹⁸²⁵ ¹⁸²⁵ ¹⁸²⁵
punctatis exerto, foliis infundibul. petiolatis ovatis replicato-lanatis,
super glabri subtiliter crenatis subspinosis, capitulis subrotundatis, squamis lanatis agnatis
apice leviter reflexi. ^{caulinis emarginatis utrinque annulariter obtusis}

Dopo - flaccidus. H. Apri. Peruvia. Ad genitum
Homogyn Cassin, finis a Norvidi - Doga v. 10

Ad Bellidiflora Michelii Cass. Vis. f. dalm. t. p. 55 ad locum in præcipiis alpinis monte
 Kom, circa Cosa Fejero insp et in monte Mali Durmitor (MN) Paath. l.c. p. 38,
 et in ripædibus in Sastriebi, Durmitor et Kom (MN) Pan. l.c. p. 45.

Ad afterem Amelanchier L. Vis. f. dalm. l.c. p. 56 ad locum in vicinis ad Boljevici
 rupi Crenulata (MN) Pan. l.c. - Ad latera

Ceris alpinae L. Vis. f. 1226. Host fl. austri. t. p. 485. Reb. fl. ex. p. 216. Pan. l.c.
 A pubescens ~~caule~~ foliis lanceolatis integris oblongis in petiolam alternatim, infraeis sparsis
 laevis, caulinis lanceolatis serratis, involucrum foliis lig. lanceolatis laxis.

Iponmea Lester hispida Host. l.c.

Icon. Reb. f. ii. germ. XVI tab. CMV. Tacy fl. austri. t. p. 88 Sturm deutsch. f. b. 2.

Hab. in saxonis elationibus montis Durmitor (MN) Pan. H. radii raculæ. H. aestate. &
 ad afterem Dipsosium L. Vis. l.c. ad locum in humido ad mare ins. Veglia (Dalm)
 Domus. l.c. p. 43.

Galatella rigida Cassin. dict. sc. nat. Sc. prod. typ. t. p. 256. Reb. f. l.c. p. 2.

G. glabri ^{sticta} foliis oblongo-lanceolatis triangulari-epunctatis, subbus marginatis rotulis,
 ramis rigidis, caule corymboso, involuci squamis lanceolatis marginis membranaceis.

Icon. Reb. f. ii. germ. XVI tab. CM VIII. in dumetis ad Dobre Stane ^{fl. p. 43.} Siprt. Cuci (MN)

Panic. p. 43. radii violacei. H. aestate. Peruvia.

Ad Erigeron alpinus L. Vis. l.c. p. 57 ad locum in præcipiis alpinis Bjile Carini, in mon-
 te Kom et Mali Durmitor (MN) Paath. l.c. p. 38, et in decliviis herbis montis

Tavrije et Kom (MN) Pan. l.c. et in Mali Sandik, Vlastich, et Opoljanik (Bojna) ^{tab. CMXIV.}

et in monte ^{tab. CMXV.} Ad locum in sylvestribus peruvianis Dol insp. Kom
 Vellebiti. Ad Erigeron acerum L. Vis. l.c. ad locum in sylvestribus peruvianis Dol insp. Kom
 (MN) Paath. l.c. et in aridis et muris Vegla, Bercanova, Verbeicos (Dalm) Domus. l.c.
 et ad locum ^{p. 43.} Reb. f. l.c. XVI tab. CMXVII f. II.

Ad Erigeron canadense L. Vis. l.c. ad locum in aliis circa pagum Sindžon et Cet-
 tinje (MN) Paath. l.c. et ad Njegos, Cetinje, Rijeka (MN) Pan. l.c. - Ad latera

Erigeron Villottii Bicknell. app. ad Fl. p. 38. Reb. fl. ex. p. 216.

E. glaucocephala ^{subfuscans} vel penicillata, foliis oblongo-lanceolatis inferioribus petiolatis, radios
 patente, fœminis internibus tubuloso-piñiformibus.

Ad Erigeron atticum Vill. fl. f. dalm. sup. p. 58-59 corrig. syn. E. Villottii in Villottii
 et ad locum in præcipiis sylvestribus montis Durmitor (MN) Pan. l.c. - Ad latera

Erigeron uniflorus L. sp. pl. p. 121. Host fl. austri. t. p. 484. Reb. fl. ex. f. 216. Pan. l.c. p.
 E. hispida, caule monochalo, foliis lanceolatis, inferioribus in petiolam alternatis glaucocephala, radios
 patente, involucro lanato-hispido, floribus fœminis omnibus ligulatis.

Icon. Reb. f. icon. germ. XVI tab. (MDIV - L. II lapp. tab. IX fig. 3.)
 Hab. in saxonis montis Durmitor (MN) Pan. H. aestate. H. radii obtusis dilute violacei. Peruvia.

et in sylvestribus montibus Dalmatiae, Durmitor et Kom (M.N.) Paní. l.c. p. 45.
Ad alterum Amelius L. Vis. f. dalm. l.c. p. 56 adde locum in cruce ad Bolgovici

Npr. Crassica (M.N.) Paní. l.c. - addatur

Aster alpinus L. Vis. f. p. 1226. Host fl. austriac. p. 485. Rehb. fl. exc. p. 246. Paní. l.c.
^{caule monopetalis} Ad pubescens (foliis terminis) integris oblongis in petiolatum alternatis, infraeis ligatis,
lati, caulinis lanceolatis sensibus, involucrum foliis lanceolatis laxis.

Ikon. Aster hispites Host. l.c.

Ikon. Rehb. f. ii. germ. XVI tab. CMV. Iug. fl. austriac. p. 88 Sturm deutsch. fl. h. 22.

Hab. in saxonis elationibus montibus Durmitor (M.N.) Paní. H. radii caerulei. H. aestate. P. venen.

Ad alterum Tripotium L. Vis. f. l.c. adde locum in humido ad mare ins. Veglia (Dalm.)

Domas. l.c. p. 43.

Galatella rigida Cassin. dict. sc. nat. DC. prodr. 141. p. 258. Rehb. f. l.c. p. 43.

G. glabra ^{instincta}, foliis oblongo-lanceolatis terminis ^{obtuse} emarginatis, radios marginis rotundatis,
ramis rigidis, caule corymboso, involucro squamis lanceolatis margini membranaceis.

Ikon. Rehb. f. ii. germ. XVI tab. CM VIII. in dumetis ad Dobre Kraue district. Cuii (M.N.)

Paní. sp. l.c. radii violacei. H. aestate. P. venen.

Ad Erigeron alpina L. Vis. l.c. p. 57 adde locum in præriis alpini Rijeka Karini, in mon-
te Kom et Mali Durmitor (M.N.) Paní. l.c. p. 38, et in declivity herbis montis

Tarvisje et Kom (M.N.) Paní. l.c. et in Mali Sandik, Vlastiv, et Orehovnik (Boisia) Srednja-

ct in monte ^{et ad iconem Rehb. n. p. 43. CMXIV.} Ad Erigeron acerum L. Vis. l.c. adde locum in sylvestribus Penicillace Dol infra Kom

Velebiti. (M.N.) Paní. l.c. et in aridis et muris Vrgo, Bescanova, Verberdes (Dalm.) Domas. l.c.

et adde iconem Rehb. f. l.c. XVI tab. CMXVII fig. II. p. 43.

Ad Erigeron canadense L. Vis. l.c. adde loco in cultis circa pagum Sindzon et Cet-
tinje (M.N.) Paní. l.c. et ad Njegos, Cetinje, Rijeka (M.N.) Paní. l.c. - addatur

Erigeron Villarsii Beckord. opp. ad fl. ped. p. 38. Rehb. fl. exc. p. 246

E. glandulosus pubescens, foliis oblongo-lanceolatis inferioribus petiolatis radio
patente, formicinis interrompibus tubulatis - piliformibus

Ad Erigeron atticum Vill. Vis. fl. dalm. supr. p. 58-59 corrig. 14a. E. Villarsii in Villarsi
et adde loco in præris sylvestribus montis Durmitor (M.N.) Paní. l.c. - addatur

Erigeron uniflorus L. Vis. fl. p. 1211. Host fl. austriac. p. 484. Rehb. fl. exc. p. 246. Paní. l.c. p. 46.

E. hispida, caule monopetalis, foliis lanceolatis, inferioribus in petiolatum alternatis glabrescenti, radio
patente, involucro lanceo-hispido, floribus formicinis omnibus ligulatis.

Ikon. Rehb. f. icon. germ. XVI tab. (MDIV - L. H. lapp. tab. IX fig. 3.

Hab. in saxonis montibus Durmitor (M.N.) Paní. H. aestate. H. radii obscuri aut dilute violacei. P. venen.

Ad Bellidem perennem L. Vis. f. dlm. p. 58 adde locum circa Zara (Dalm.) Dobroj
et Bittki (Hercz) Panth. l.c. p. 38, in graminis ad Cettinae (MN) Pan. l.c. p. 45,
ad Kopia, Passinkonak, Lebcha, Lubina, Dobroj prope ad Vranač (Bosnia) Lindner,
et ad Vranač ^{submonte} prope Vis. l.c. in locis herbis memoris ad Cagnicev, Besanovac, Šilene
in ins. Veglia (Dalm.). Tommas. l.c. p. 43.

Ad Solidaginem Virga aurea L. Vis. l.c. p. 58 adde Vranač ^{submonte} prope
Imperial, capitulo majoribus - syn. S. alpestris Waldb. et Kit. p. 1280 p. 439;
Leptophyllum ex. p. 241 ad locum in sylvestris Ponića Dol infra Kom et circa Kovice
infra Monti Durmitor (MN) Panth. l.c. p. 28, in saxo monti Kom (MN) Pan. l.c. p. 46
Kom. Reb. f. i. germ. XVI tab. CXIX f. 1. Waldb. et Kit. l.c. tab. 208 Hab. in Lykotici
Ponića Dol infra Kom et circa Kovice infra Monti Durmitor (MN) Panth. l.c. p. 38 et in
saxo monti Kom (MN) Pan. l.c. p. 46 et in Ponića Dol infra Kom et circa Kovice
alpinis monti Kom (MN) Pan. l.c. p. 46 et in Ponića Dol infra Kom et circa Kovice

Ad Chrysocoma Linosyris L. Vis. l.c. p. 59 adde locum in sylvestris saxo sub monte Durmi
tor (MN) Pan. l.c. p. 45 et ad Cagnicev, Besanovac, et monte Organi ins. Veglia (Dalm.) Tom
mas. l.c. p. 43, utique sub Linosyridi vulgari Cass.

Ad Phagnalon rupestre DC. Vis. l.c. p. 59 adde iconem Reb. f. l.c. p. CMXXI. f. 4.
ad Euadum pyramidalis Pers. Vis. l.c. p. 59 adde locum in monte Kraljevo ^{submonte} prope Vranač (Hercz) Panth. l.c. p. 38.
Ad Monspurum erectum L. Vis. l.c. p. 60 adde locum in aridissimo S. Maria di Castro,
Belpavulinia, Dobrinje, Mr. Tristkarev, Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. p. 42 et icon.
Reb. f. i. germ. XVI tab. 100 CMXLIII f. 1.

Ad Thulem Helenium L. Vis. l.c. p. 61 adde Reb. f. l.c. p. 11 (sub Coriaris), et i. germ. XVII tab. CMXXI.
et locum in sylvestris circa Sladovor Kapito prope Grada (MN) Panth. l.c. p. 38. et in sylvestris
ad rium Zeta sub Danica grad (MN) Panth. l.c. p. 46.

Ad Thulem longyz DC. Vis. l.c. p. 61 ad locum in dumetis vallis Morava superioris et
in sylvestris ad vis. (MN) Pan. l.c. p. 46 et iconem Reb. f. l.c. p. 100 CMXLIII f. 1. et in
sylvestris ad vis. (MN) Pan. l.c. p. 46 et iconem Reb. f. l.c. p. 100 CMXLIII f. 1.

Ad Thulem hastatum L. Vis. l.c. p. 62 ad locum in sylvestris montis Glava prope
Dobrinje et in valle Tazine prope Orkovec in Bjelagora (Hercz) Panth. l.c. p. 39. et in
Vrniš, Sveti Đača, ad Šamishovac han (Bosnia) Sveti Đača, et in locis herbis Besanovac, Mr. Organi,
Veglia (Dalm.) Tommas. l.c., et ad iconem Reb. f. i. germ. XVI tab. CMXXVII.

Ad Thulem semiamplexicaule Reut. Vis. l.c. p. 62 adde iconem Reb. f. l.c. tab. CMXXIX sub tab.
tenue I. squarrosa Reb. l.c. XXI p. 15, et Thulem squarrosa L. Vis. l.c. Ad locum in umbrosis ad
virium Šašica prope Danilov grad (MN) Panth. l.c. p. 38, in saxo sub monte Belovići diffus. (Vranica
(MN) Pan. l.c., et ad Dobrinje, Čapljimuglio, Veglia et alibi (Dalm.) Tommas. l.c., et in Prolog (Bosnia)
Sveti Đača.

Ad Thulem salicinum L. Vis. l.c. ad locum in sylvestris Nadž Brdo prope Držin in Bjelagora (Hercz)
in monte Lastva Čevska prope Vrniš et circa Danica grad (MN). Panth. l.c. in prati paludis
Valle di Belje, Panighe ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c., et iconem Reb. f. l.c. tab. CMXXVIII =

Ad Thulem ciliatum L. Vis. l.c. p. 63 ad locum in rugositas ad Savnicu sub monte Svetica (MN) Pan. l.
c. p. 46 et in P. Moč (Bosnia) Sveti Đača et iconem Reb. f. l.c. XVII tab. CMXXVIII - addatur

- ad Bellidem geranum L. Vis. f. c. p. 58 adde locum circa Zara (Dalm.) Trbojic
 et Bittkai (Herzeg) Panth. l. c. p. 38, in graminois ad Cetinae (MN) Panth. l. c. p. 45,
 ad Scopie, Passimkona, Lebache, Lutina, Dobrospolje ad Vrsatzk (Bosnia) Scudier,
 et ad Var. ^{Montem} Prostora f. l. c. in locis habens humorum ad Capriccio, Beranova, T. Elme
 in ins. Veglie (Dalm.) Tommasi. l. c. p. 43.
- Ad Solidaginem Virga aurea L. Vis. l. c. p. 58 adde Var. g. alpestre s. polycephala ^{f. laticephala} (Hedw.) P. g. p.
 simplicifolia, capitulis majoribus - syn. S. alpestris Waldb. et Kit. pl. var. hum. Th. p. 250 ^{et H. M. et} p. 499
 L. l. c. p. 38 f. 2, et ad locum in sybatico Perucica Dol infra Kom et circa Kovice
 infra Mont. Durmitor (MN) Panth. l. c. p. 28, in saxis montis kom (MN) Panth. l. c. p. 46
 Tom. Reb. f. i. germ. XVI tab. CMXIII p. 208. Hab. in sybatico
 Perucica Dol infra Kom et circa Kovice infra Mont. Durmitor (MN) Panth. l. c. p. 38 et in
 et in Vrhki Monti (Dalm.) Vrhki Kova ^{prope} Dobrospolje (Bosnia) Scudier (Croatia)
 ad Chrysocoma Linosyrii L. Vis. l. c. p. 39 adde locum in saxis montis kom (MN) Panth. l. c. p. 46
 et ad Capriccio, Beranova, et monte Ozar in. Veglie (Dalm.) Tom-
 masi. l. c. p. 43, utique sub Linosyrii vulgaris Cass.
- Ad Phragmites ripariae DC. l. c. p. 40 ^{Virg. Natur.} H. f. 1. c. p. 39 adde iconem Reb. f. l. c. p. CMXIX. f. 45.
 ad Gramineum pannonicum Pers. ^{virgatissimum} ad locum in excentrois Dalmatiarum (Hedw.) Panth. l. c. p. 38
 ad Moropus erectum L. Vis. l. c. p. 60 adde locum in arctifloris S. Marie d' Agap.,
 Belaventria, Dobrijci, M. Ristevac, Veglie (Dalm.) Tommasi. l. c. p. 42 et icon.
 Reb. f. i. germ. XVI tab. CMXIII p. 1.
- Ad Inula Helenum L. Vis. l. c. p. 61 adde Reb. f. l. c. p. 11 (sub Cirsium) et iconem XXI tab. CMXXI.
 et locum in sybatico circa Sladovo Kopito prope Gradec (MN) Panth. l. c. p. 58. et in saxis
 ad num. 2600 metra australi grad (MN) Panth. l. c. p. 46
- Ad Inula Tomiza DC. l. c. p. 62 ad locum in dampic. vallis Morava superiori et
 in saxis ad Vis (MN) Panth. l. c. p. 46 et iconem Reb. f. l. c. p. 11 (sub Cirsium) et iconem XXI tab. CMXXII
- Ad Inula hirtam L. Vis. l. c. p. 62 ad locum in sybatico monte Glavice prope ^{receptaculo} ^(Hedw.) ^{longo} ^{oblongo}
 Trbojic et in valle Tazine prope Orahovac in Bjelazora (Herzeg) Panth. l. c. p. 59. et in
 Vrlič, Salinathes ad Tamiš kovac han (Bosnia) Scudier, et in locis habens Beranova, M. Organ,
 Veglie (Dalm.) Tommasi. l. c. et n. d. iconem Reb. f. i. germ. XVI tab. CMXXVII.
- Ad Inula semianaphalis Reut. Vis. l. c. p. 62 adde iconem Reb. f. l. c. tab. CMXXIX sub tab.
 tenui I. squarrosa Reb. f. l. c. XXI p. 15, et Inula squarrosa L. Vis. l. c. Ad locum in umbribus ad
 rurum Lajica prope Danilov Grad (MN) Panth. l. c. p. 38, in saxis ad Dobrovic et sp. (MN) Panth. l. c.,
 et Dobrijci, Capljino, Veglie et aliis (Dalm.) Tommasi. l. c. et in Prolog (Bosnia)
 Scudier.
- Ad Inula salicaria L. Vis. l. c. Ad locum in sybatico Nadij Brdo prope Vrgin in Bjelazora (Herzeg)
 in monte Lajon Cevska prope Vrnići et circa Dantov Grad (MN). Panth. l. c. in pratis paludosis
 Valle di Belce, Panighe in Veglie (Dalm.) Tommasi. l. c. et iconem Reb. f. l. c. tab. CMXXVIII
- Ad Inula ensifolia L. Vis. l. c. p. 63 adde locum in rugosibus ad Savnicu sub monte Ljivica (MN) Panth. l.
 c. p. 46 et in Prolog (Bosnia) Scudier et iconem Reb. f. l. c. XXI tab. CMXXVIII. — Addatur
- Inula confusa* — *Ad hoc*
- Inula germanica L. sp. p. 1239. Host. f. austr. B. p. 493. Reb. Heresp. 29
 I. foliis 5-lobis lanceolate venatis dentatimodice subtruncatis pilosis, marginis
 scabris, ciliatis basi cordatis, coriaceo glomerata polycephalo, capitulis dorso
 pubescens, lobulis virgineo angustioribus, arachnoide glabris.
 Geor. Reb. f. XV tab. CXLXXXI. Iag. Kauktur. f. tab. 134
- Hab. in sybatico circa Grad et Dantov Grad (MN) et in Dalmatia. H. laticephala
 H. angustipetala
- Inula media Bieb.
- S. ad Inula murensi L. Ob. l. c. non L. murensis in Inula Buley Christi
 L. sp. p. 1237 et corr. syn. Grad. et label in Reb. f. i. germ. XXI tab. ^{G. A. S. tab.} Clap. 1952
 L. sp. p. 20 f. 2, et ad locum in sybatico valley Nag lap prope Vrgin in Bjelazora
 (Herzeg), circa Parice et in excentro Vrgin formae prope Grad (MN) Panth. l. c. et in
 litoria aquarum sub m. Lovcen (MN) Panth. l. c. et in Belce, Rijeka, Draga, Borovnica et
 litoria aquarum sub m. Lovcen (MN) Panth. l. c. et in Belce, Rijeka, Draga, Borovnica et
 litoria aquarum sub m. Lovcen (MN) Panth. l. c. et in Belce, Rijeka, Draga, Borovnica et

- Ad Inulam graveolentem Desf. R. f. c. p. 84 ad locum in cultis ad Megs., Gorjova et inter vineas prope Vrs (MN) Pani. c. p. 46. Capularia graveolens Griseb. et Jord. fl-de Vr in Litorali Panige, Valle di Bosco Negra (Dalm.) Dormus. f. c. p. 43 ad locum Rohrb. f. i. germ. XVI tab. CMXXXV (sub Capularia)
- Ad Inulam Virginae Bilt. R. f. c. p. 84 ad locum in ins. Vrgna, Punto Negrete, Cattione (Dalm.) Dormus. f. c. p. 43 ad locum Rohrb. i. germ. XVI tab. CMXXXV (sub Capularia)
- Ad Inulam orthodoxum L. Vri. f. c. p. 85 ad locum in solo argillaceo ad maris ins. Vrgna, ad Saline, Cagnone (Dalm.) Dormus. f. c. et Rohrb. f. i. germ. XVI tab. CMXXXV f.
- Ad Pulicariam vulgarium Gaertn. R. f. c. ad locum in humido circa Ricka (MN) Panth. f. c. p. 39; in fonte ad Vrs (MN) Pani. f. c. Cf. observationes nostrum f. c. p. 65 quod locum caputatis.
- Ad Pulicariam syrenicarum Gaertn. R. f. c. ad locum cum prion (MN) Pani. f. c. et in ins. Vrgna ad Caffalnughe et in Valle di Resce (Dalm.) Dormus. f. c.
- Ad Begoniam solitifolium L. R. f. c. p. 86 ad locum a Traunick ad pedem montis Stolark (Bosnia) Sendtn.

Ad Apericum aquaticum L. R. f. c. p. 67

- Ad Polygonum spinosum L. R. f. c. p. 67 ad locum in riperestribus circa Paguna, Cattane (Dalm.), Trbinje (Herzeg.) et Sindron (MN) Panth. f. c. p. 39; et ad marginem agrorum circa Danilov Grad et ad Savica dicta Gornja Nakija (MN) Pani. f. c. p. 46; et in agro Vrgna, Bekanovac, et Berkavac (Dalm.) Dormus. f. c. — Adnotatur genus

Telekia Baumgart.

f. c. transylv. III. p. 149

Char. H. radiati, radio unicolori, ligulis longis angustis, corolla tubo tenui basi attenuata.

Anthonae basi longe calvatae. Achenia linearis elongata multistriata & pappo coriaceo ornata — Clad. Syngenesia Bilt. Telekia f. c. p. 149.

Telekia speciosa Baumg. f. c. p. 150. Gris. in Panth. ad p. 39. Pani. f. c. p. 46. — Telekia cordifolia Dc. prodr. 191 et nat. V. p. 485. Bupleurum cordifolium Waltst. et Kit. f. c. p. 28. Schreb. f. c. p. 28. Telekia cordifolia Waltst. et Kit. f. c. p. 113. Schreb. f. c. I. tab. 6. Telekia cordifolia Waltst. et Kit. f. c. p. 113. Schreb. f. c. I. tab. 6.

Hab. in umbrosis humidi Peruvia Dol. et Tava Dol infra Rom, ad rivulum Bistrica Reka prope

Nizin Luk, et circa Kovice infra Mali Durmitor (MN) Panth. f. c. p. 46; et in alnetis ad Kolasin (MN) Pani. f. c. p. 46; et in Borovica supra montem Ponikva ad Varesch, Tisintana supra Kirelyak, Lepiniya ad Fojničko, et inter Traunick et Scopie (Bosnia) Sendtn. f. c. p. 46. f. c. auctate. Perenn.

Ad Lencionem vulgaris L. tip. l.c.p.68. ad locum in vallis circa Zaro (Dalm.)
et Grabovje (Herzeg) Panck. l.c.; in culto ad Cetinje Grakovs (MN) Panč. l.c. p. 49;
in tote ins. Veglia (Dalm.) Domares. l.c. p. 44.

Ad Lencionem nebrodensem L. tip. l.c. ad locum in glaciis ad Savicii, sub m. Poja
et ad Mostar. D. sub m. Kom (MN) Panč. l.c. et ad Vr. vapostrem fl. dalm. locis
in agriis monte Vermes prope Cetinje (Dalm.), circa Brkovo et Dubovac, in
Medos Dol, Olenibreg, et Begove Korite infra montem Taptubio in Bielagora
(Herzeg), et in tyberius area Nijegò. Reka, in Kviria Dol infra Cerna Planina, et
circa Kovice (MN) et iuxta Vr. genitrix fl. dalm. in Rebb f. il. germ. XVI tab. CMLXII
Vr. vapostris fl. dalm. l.c. tab. ead. f. II, et Vr. laciniata fl. dalm. tab. eadem f. III.

Ad Lencionem lemanthemioides Bur. tip. l.c. add. Obs. 1. Lemanthemioides Bur. adit
est in ipsis Vrgen Barb. W. p. 288 anno 1889, idemque anterior est S. exemplis
W. sp. pl. III p. 1982, quod quasi in lucum venit anno 1897. Haec species tamen
unam confinxit, testibus Moretto ex quibusdam fl. Ital. dec. V. p. 7, Moris.
fl. aust. II p. 423, et Bertoloni fl. Ital. IX p. 27-219, ex autopsia specimenum cather.
tiorum. Hinc huius plantae pertinent icones Rechb. f. il. germ. XVI tab. CMLXII f.
II et III. Haec quod locum, invenit in ipsis insula Pelago Dalmatiae ob. Marchi
sette, uti potest ex ipsis dager. is. Pelago p. 302.

Pr. 1. loc. 1. Vr. l.c. ad locum ad viuum Patera Voda prop. Kovice
dopo Sabotica

Lencio cordatus Koch in Bot. Zeit. v. XVIII. p. 612 et syn. ed. II. p. 428. B. auriculatus
totius puberulus, cordatis, dentatis, petiolatis, petiolatis regiorum basi
auriculatus auriculatus incisis dentatis, summis lanceolatis incisis, radio
patente, achenis glabris 49; in Dobro
Syn. Lencio alpinus B. auriculatus Rechb. pl. edit. II. p. 22. L. cordifolia auriculata
lata Jacq. fl. austri. II. p. 43. L. alpina W. sp. pl. III p. 208a. Hort. fl. austri. II. p. 419. S. sub.
alpinus Koch bot. Zeit. XVIII p. 613. et syn. fl. germ. II. p. 429. G. sp. in Panck. II. p. 43.
Icon. Rechb. pl. cv. tab. 155 f. 251. Rechb. f. il. germ. XVI tab. CMLXIX. Jacq. fl. austri. II. tab. 177. (cylindrica)
Hab. in tyberius Peruviana Sol infra Kom (MN) Panck. fl. testic. St. Julie, Auguste - Peru.

Syn. Rechb. f. il. germ. XVI tab. CMLXIX. Hab. er. n. l.c. 24. V. (no. p. 415. 11. 100. v. 11.

Hab. a Travnik ad Butkovica (Bosnia) Sestr. et in culto ad Cetinje, Sirkovo, campis Zeta,
sub Danilov Grad (MN) Panč. l.c. p. 49. fl. flor. fl. vere - Annus.

Ad Lencio crassifolium Huds. Vis. l.c. p. 70. Panck. add. locum et p. 49 in perenni saxo sub monte Velika
Tajnebien (MN) Panč. l.c. p. 49. et in locis in vallis rivi ad Capriccio, Capelmochio, Valle di
Berico, Veglia (Dalm.) Domares. l.c. p. 44.

Ad Lencio obrotanifolium L. tip. l.c. add. locum in peñuis sub m. Kom, Regnum dicty.,
forma uniflora (MN) Panč. l.c.

Ad *Seneccionem vulgaris* L. Vif. l. c. p. 68. ad locum in vallis circa Zara (Dalm.) et Gradišće (Herzeg) Pančić l. c. in cultū ad *Cetinje*, *Gračac* (MN) Pančić l. c. p. 49, in tota ins. Veglia (Dalm.) Dommer. l. c. p. 44.

Ad *Seneccionem nebrodensem* L. Vif. l. c. ad locum in glaciis ad Savici, sub m. Široka et ad Marjanov D. sub m. Korn (MN) Pančić l. c. et ad Vrav. rupestrem fl. dalm. locis in apenni monte Vermec prope Cetinje (Dalm.), circa Brčkovac et Dubovac, in Medov Dol; Oštric, et Begove Horice infra montem Tastubino in Biogradova (Herzeg), et in sylvestris aria Njegoši. Rieka, in Vravica Dol infra Crno Planino, et circa Kovine (MN) et icones Vrav. genuinae fl. dalm. in Reb. f. il. germ. XVI tab. CMLXIII
Vrav. rupestris fl. dalm. l. c. tab. ead. p. II, et Vrav. laciniata fl. dalm. tab. eadem p. III.

Ad *Seneccionem lemanthemifolium* Poir. Vif. l. c. p. 69 ad locum. S. lemanthemifolius Poir. - dilat. est in ipsis Vrav. en Barb. II p. 288 anno 1889, idemque anterior est. ex amplio W. sp. pl. III p. 1982, quod opus est in lucum venit anno 1897. Hac specie tamen unam confinxim, testibus Montello ex quibusdam fl. Ital. dec. V. p. 7, Monizio fl. Ital. II p. 423, et Bertoloni fl. Ital. IX p. 27-29, ex autopria specimenum datum. Hinc huius plantae pertinent nomes in Reb. f. il. germ. XVI tab. CMLXII ff. II et III. Quod locum, invenit in ipsis insulae Pelagop. Dalmaticae et Marche sette, uti foliis ex ipsis datur. in Pelag. p. 302.

Ad *Seneccionem Iacobaea* L. Vif. l. c. ad locos ad riuum Patru Voda prope Krovce, infra Mali Dvornik (MN) Pančić l. c. p. 43, in locis herbitis Zupanje, Dobrije, et aliis in ins. Veglia (Dalm.) Dommer. l. c. et circa Travnik et Bosnae undique. Ad locum. Seneccio exoptatus

Ad *Seneccionem cornutum* Bertol. Vif. l. c. ad locis in humecta circa Rieka et ad suicu virulenta circa Danilov grad (MN) Pančić l. c. in foris ad Vrav. (MN) Pančić l. c. p. 49; in lucibus Caprius et Parighe, in Valle di Besca insulae Veglia (Dalm.) Dommer. l. c. - Ad locum. Seneccio vernalis Walst. et Kit. fl. var. hung. p. 28. Host fl. aust. II p. 473. Reb. f. excep. 243

S. caule lanato, foliis pinnatifido-similiis sellatis, inferioribus petiolatis, caeruleis basi auriculata dentata angusticordatis, pininis ovalis, cuspide dentata, floribus corymbosis laxis, ciliatis, polyphyllis involucro multo breviori, radio patente acheniis cuneo-pubescentibus.

Ikon. Reb. f. il. germ. XVI tab. CMLXIX Walst. et Kit. l. c. tab. 24. Reb. fl. crit. IV tab. 513. -

Hab. a Travnik ad Butorica (Bosna) sendit, et in cultū ad Cetinje, Gračac, campis Zeta, sub Danilov grad (MN) Pančić l. c. p. 49. Fl. slav. Pl. vere. Annus.

Ad *Seneccio cornutifolius* Huds. Vif. l. c. p. 70. Pančić l. c. p. 49 in foris saxis sub monte Velika Jazrebića (MN) Pančić l. c. p. 49, et in locis in vallis riujs ad Caprius, Cappelmeuschio, Valle di Besca, Veglia (Dalm.) Dommer. l. c. p. 44.

Ad *Seneccio obrotanifolius* L. Vif. l. c. ad locum in peccinis sub m. Korn, Rogasem dictis, forma uniflora (MN) Pančić l. c.

- Ad Senecionem *Cacaliaster* Lam. Vir. l.c. p. 71. adde locum in sylvestris circa pagum
 Kovice infra montem Malo Durmitor (MK) Panth. l.c. p. 43. ubi cfr. Obs. — Ad Var.
 subdecurrente Gris in Panth. l.c. ad Var. p. 1 (Var. dalmatica Gris.) f. dolabrata p. 1 in 1902
 tunc Peruvica Dot infra Kom (MK) Panth. l.c. Gr. Obs. Gris. — Adde icon. Robt. f. l.c. XVI
 tab. CMLXXIX (sub S. sarmentosus); Robt. l.c. CMLXXXI f. 1-2 (sub S. nemorensis et S. acuminatum),
 et Robt. l.c. tab. CMLXXXII (sub S. fischerii) Vis. p. 102. L. Cacaliaster B. nemorensis Robt. sub
 Ad Senecionem *Doronicum* L. Vis. ff. delm. l.c. adde locum in glaucophyllum excelsioribus montibus kom
 supra fogam (MN). Panth. l.c. et S. arachnoides Schb. statut in Robt. sub S. Doronicum
 Var. p. 102. — Adde icon. L. Doronicum et S. lanata in Robt. germ. XVI tab. CMLXXV.
 Ad Senecionem *Hypoleium* Robt. adde Typ. Ligularia thyoides Gris. var. *hianiana* Gris.
 cum Obs. ejusdem aucti. — Adde genus
~~caeruleum~~
 non Bieb. nomen non in D. corollatum Sternb.
 Ad *Doronicum caeruleum* Virg. l.c. p. 72. ex S. Lanatum L. var. *caeruleum* Tournier p. 199. p. 200.
 Denkschr. J. Bot. ges. in Regensburg 1818 p. 111. Host. fl. austri. II. p. 49. Typ. D. orientale
 Robt. f. 10. — Adde Typ. Robt. f. 10. — Adde
 Robt. f. 10. Germ. XVI tab. CMLV f. 1. Denk. Herbar. I. p. 70. Column. ephyr. 2. tab. 36.
 Adde locum in regeribz m. kom., et circa lacum Corvo iheros infra montem
 Malo Durmitor (MK) Panth.; in regeribz ^{n. lat.} ~~m. lat.~~ Tatomer (MN) Panth. l.c.
 c. p. 49, et in Ustipic et rym. Bellari ad Ovanches (Bonni) Lendva. — Adde
 A. *Doronicum Pandionis* L. sp. pl. p. 124. Robt. fl. austri. II. p. 49. Robt.
 f. ex. p. 234. Panth. et ff. p. 49
 D. radice stolonifer, stoloniis ruberrimis apice incarnatis foliis rufis, iteranteque
 stoloniferis, foliis ovatis ^{lanceolatis} ~~ovatis~~, inferioribus longe petiolatis, profunde
 cordatis, mediis auriculato-petiolatis, superioribus sessilibus angusticlavatis,
 simpliciis acheniisque villosis.
 Typ. *Doronicum Matthioli* Jaenisch bot. recit. XI. 1. p. 182. Robt. Herbar. p. 234
 Flora Robt. f. in. germ. XVI tab. CMLV. f. 11.
 Hab. in glaucophyllum Vis. oke Grise sub monte Kom (MN) Panth. fl. hirta. fl. Mayo Augusto.
 Perenn. Non vidi.
 2. *Doronicum lucidum* Bercht. ex pl. cult. h. Gotting. fid. Gris. in Panth. l.c. p. 42
 D. radice haud stolonifer, collo glabro, foliis inferioribus petiolatis
 sessilibus cordato-angusticlavatis serratis, receptaculo acheniisque villosis.
 Typ. *D. leucophaea* Willd. sp. pl. ^{var. leucophaea} C. Koch. f. 10. Gris.
 Hab. in sylvestris montis Jastrebice in Bielagora, in monte ¹⁹⁰² Cova Planina in Perusice
 et in monte ¹⁹⁰² Cova Planina (Vratko) Panth. ¹⁹⁰² et fl. hirta. Herbar. ¹⁹⁰²
 Obs. (ATA) Specific distinction ¹⁹⁰² ~~not~~ of a *D. leucophaea* W. Thigonate omniaque glabra
 et a *D. cordifolia* Stevng foliis in aliis breviter cordatis serratis, nec profunde cordatis
 et inciso-serratis. ¹⁹⁰² Alii satius?

B. Doronicum austriacum Jaq. f. austri. II. p. 18. Host. fl. austri. II. p. 197. Ridd. ^{p. 23} Stev.

Panth. adn. p. 42. Panč. Cep. p. 59

D. ~~in villousum foliis linearibus acuminatis, petiolatis, acutis, sanguineis, rubeo-purpureis, foliis inferioribus ampliatis, ciliatis, linearibus, acuminatis, petiolatis, acutis, sanguineis, rubeo-purpureis, foliis superioribus oblongo-~~

linearibus, receptaculo arachnoidis que villosis.

Syn. Doronicum Parisianum C. L. S. p. pl. p. 1253.

Icon. Ridd. f. in. germ. XV. tab. CLVII. Jaq. fl. austri. tab. 130. Obs. Kit. pl. I. IV. p. 281.

Hab. in typhatae ad pedem Mala Sarmitor (MN.) Panth. Et codem loco Panč.
Et ad Borovica supra montem Ponikva ad Varish (Bosnia) Senčić. H.
lutei. Fl. Jul. Aug. Perenn.

Avanti i Doronicium Cineraria L.
gen. plan. p. 47

Flor. av. senecionem Vistaninum Papaf. Vi. t. p. 72 adie syn. Ligularia the
zoides Gris. var. Vistaniana Gris. in Panth. adn. p. 42, et locum in typhatae montis
Tosticeva in Biograd (Herzeg) et circa Rijegus (MN.) Panth. L. Vistani Panč.
in saxo a rocente levico ad Biograd (MN.) Panč. Cep. - - - - - Acaules.

Senecio umbrosus Walst. et Kit. pl. var. hung. Ill. p. 232. Host. fl. austri. II. p. 59
I. inferior pilosus, foliis inferioribus reticulatis ovali-petiolatis ciliatis oblongi cordata-
amplexicaulis acutis dentato-lever, numero ^{densissimum} integerrimum, floribus
corymbosum capitulo oblongo-ovali, quemque maxime membranaceis apice ciliatis oblongo-
arachnoidis glaberrimis pleniorata.

Icon. Ridd. f. in. germ. XVI tab. CLXXXIII fig. II.

Hab. inter Travnick et Scopia (Bosnia) Senčić. H. aestate. H. lutei. Perenn.

3. Cineraria ~~leptophylla~~ ^{diversifolia} ~~leptophylla~~ Stev. sp. nat. p. 365. Det. Botsch. N.

I. caule simplici, foliis crassi, inferioribus longo petiolatis dentatis oblongo-
ovali, foliis inferioreibus rotundatis dentato-lever, numero ^{multo} integerrimi,
superioribus ^{in petiolam obtuso-concentrica} linearibus, floribus brevipedatis
recurrentibus ^{in foliis} petiolatis, capitatis, terminali, capitatae squamu*m* linearibus acuminate, ^{oblongis}
obtuse, bidentatis.

Syn. Cineraria crassifolia Kit. Sp. 14 H. II. p. 548. Host. fl. austri. II. p. 182. Ridd. H. ex. p. 246

Icon. Ridd. f. in. germ. XVI. tab. CLXXXIII. Det. Botsch. sp. 42. C. alpestris V. obverseis. Host. H. ex. p. 244.

Hab. in graminif. montis Sušnjava Planina (MN.) Panth. Et in Mala Sarmitor (MN.)
H. aestate. H. lutei. Perenn.

2. Cineraria spathulaefolius DC. prod. 1486 nat. VI p. 365

I. floroso-arechnoideus, foliis inferioribus caeruleis inferioribus spathulatis corda-
tis petiolatis regardis superioribus rigenter acutis, floribus umbellato-corymbosum
capitulo oblongo-ovali, ovario non hispido-
foliis inferiorebus petiolatis, ^{longo} petiolatis, ^{longo} petiolatis,
Sync. Cineraria spathulaefolia Juss. H. tab. II. p. 454. Host. fl. austri. II. p. 481. Ridd. H. ex. p. 241

Icon. Ridd. f. in. germ. XVI. tab. CLXXXIII. Det. Botsch. sp. 42. Flora austriaca p. 146. Bocan. miss. 148
Fl. in Bosnie. Senčić. H. ^{majo} lutea H. lutei. Perenn.

Ad *Gnaphalium lepto-album* L. Vis. l.c.p.73 adie locum in arenosis
ad lacum Bodruncum (M.N.), et in prædictis Panic. l.c.p. 47, et in polvare
Panighe in ins. Veglia (Dalm.) Dommer. l.c.p. 45. Adde iconem Rehbe. f.
l.c.XVI tab. CXLVII fig. 6.

Ad *Gnaphalium uliginosum* L. Vis. l.c. adie locum in herbis circa Cetina
(M.N.) Panth. l.c.p. 46, in arenosis rivi Rječka, et in foris ad Vis (M.N.) Panic. l.
c.

Ad *Gnaphalium sylvaticum* L. Vis. l.c. adie locum circa Rječka, et ad lacum
Rječko Peščero infra Mali Durmitor (M.N.) Panth. l.c., in sylvestris sub monte
by Durmitor, Korn et Taffrobica (M.N.) Panic. l.c. — Adde

Gnaphalium Hippocrateum Koch syn. fl. germ. t. p. 399. Rehbe. f. in germ. XVI p. 29
Panth. l.c.p. 46.

G. simplex, foliis lanceolatis basi obsoleto trinerviis, utrinque dense ciliatis,
caulinis hirsutis, aculeis, petiolis lanceolatis subaequalibus, floribus spicatis
14, a involucro foliis exterioribus capitebus, triplex univiribus.

Syn. *Gnaphalium superinum* Hogue in *Sturm* deutach. fl. H. 38 non L.

Icon. Rehbe. f. in germ. XVI tab. CXLI. et *Sturm* l.c.

Hab. in parvis alpinis montibus Korn et circa Crno Peščero infra montem Mali
Durmitor (M.N.) Panth.; in taxois montis Taffrobica et in Korn (M.N.) Panic.
l.c. est cfr. observationes Rectoris H. pallidi. fl. Jul. August. Perenne.

Gnaphalium superinum L. 1753. nat. t. p. 234. Host fl. austri. II p. 465.

Grise. in Panth. adn. p. 46. Panic. l.c.p. 46.

Gn. - capito sum multicaule caulebus feliformibus caro-lanatis, folijs ornati
bus sublineariibus lanuginoso-tomentosis, floribus breviter longiusculis
ciliatis aut solitariis, foliis exterioribus involucri lanceolatis capitebus
medio longioribus, achenis puberulis.

Syn. *Gnaphalium alpinum* Oed. fl. dan. VI p. 6. Gr. pectinatum Haenck. Iud. p. 93.
Korn. Rehbe. f. il. germ. XVI tab. CXLI f. II. Oed. fl. dan. VI tab. 332.

Hab. in parvis alpinis Biele Carini prope Korn (M.N.) Panth. et in taxois
prope Savoje et Korn (M.N.) Panic. Flores involucro fulvo. fl. Jul. Aug. Perenne.

Ad *Gnaphalium dicoccum* L. Vis. fl. dalmat. c.p. 47 adie locum in parvis alpinis
Biele Carini distis prope Korn et in ipso monte (M.N.) Panth. l.c. sub antennaria
diccia Gris. Vis. australis Gris.; in parvis hogam sub m. Korn (M.N.) Panic. l.c.; et
in monte Vlašić supra Baklari (Bosnia) Sondtn. Adde iconem Rehbe. f. l.c.XVI
tab. CXLI fig. II. III.

Ad *Helichrysum angustifolium* DC. Vis. l.c.p. 35. adie locum in apice circa Tagaste
(Dalm.); infra opidum tereticum Larissa prope Bergalo, et circa Velikiye (Hercy) Panth. l.c.; et
in taxois ad Boljevići dist. Crničica (M.N.) Panic. l.c. et in capillis ins. Vegla (Dalm.) capite
Tromet. l.c.p. 44.

Ad *Vilaginem germanicum* L. *Vig.* l.c. (excl. *Vari.* d.), adde locum in agroj ad pedem montis Vorone prope Cattaro (Dalm.), cum *Sindjor* et *Danilov grad* (MN) *Panth.* l.c. p. 42; ad *Haus Tellach* prope Trawnik (Bosnia) *Semlin*; et in locis aridis Bečevacchie, Caucione, Vrgo et alibi (Dalm.) *Panth.* l.c. p. 43. Ad *Syn. Gilota germanica* *Rohb.* f. et icon. germ. XVI ~~tab. cxlv~~ f. 1 — Ad *Vari.* 3 canescens *Gris.* ~~in~~ *Karlsruhe* locum in campis ad Savica Rete Ljescem ka Nadjija regn. *Danilov grad* (MN) *Panić* adn. p. 46. — ~~var.~~ ^{Post} *E. em.* cephalam *Pant.* *Vig.* l.c. adde *Vari.* n. (pathulatae: capitulis argenteis pentagonis, paleis flavis, foliis pathulatis) — *Syn.* 7. (pathulata *Prest.* del. pug. p. 93. *Gris.* in *Panth.* adn. p. 42. *Icon.* *Rohb.* f. l.c. tab. CXLV f. III. *Hab.* circa Drževanje (Herceg) *Panth.* — Addatur

Vilago Iussieui *Coss.* et *Germ.* in ann. d. sc. nat. XX iur. 2. p. 283

P. lanuginosa — canescens rami dichotomis, foliis lanceolatis — obvolutis ^{involutis} numerosatis, capitulis subhexangularibus a *lanceagine* exsertis multifloris, involuci foliatis *lanceagineis* planiusculis capitulo sublongioribus.

Syn. *Vilago germanica* *Vari.* 3 decumbens *Vig.* f. dalm. t. p. 35

Icon. *Coss.* et *Germ.* atl. de la Pl. de Paris pl. XXVI A.

Hab. in agrois locis ins. Cuzola (longa nigra) ⁱⁿ Dalmatia. It. atque. *Obs.* An *Vari.* 7. *germanica* L. 3. habet usus diversus, et caules a base ^{annuis} ramosi et decurrentes, sed unicum specimen ob oculis habet?

Ad *Vilaginem gallicam* L. *Vig.* f. dalm. l.c. adde *Syn.* *Lophia gallica* *Coss.* et *Germ.* atl. de Par. pl. XXVI E. et iconem *Rohb.* f. ii. germ. XVI tab. CXLVI f. 1, et locum in vegetribus circa Biče (MN) *Panth.* l.c. et in glaciis ad *Danilov grad*, et regni Ljubljani dist. Lomnica (MN) *Panić* l.c. p. 46; et circa Cattaro et inter Stagjevich et Barum (Dalm.). — Addatur

Vilago minima *Pries.* d. II. nov. vcc. p. 268. *Gris.* ~~in~~ *Karlsruhe*.

V. subspicata genitib ramosa, ramis dichotomis, capitulis axillaris terminatis longe ^{ramulis numerosis} paucifloris, foliis lanceolatis exsertis, involuci foliatis, carinatis, apicibus ^{angustis} *Guapoleum minimum* *Syn.* f. britan. p. 825. *G. montanum* *Huds.* *Angl.* p. 362. L. 14. f. p. 1311. *Oylea minima* *Rohb.* f. l.c. ~~tab. CXVI~~ p. 27.

Icon. *Rohb.* f. l.c. tab. CXLVI. *Sturm.* deutsch. f. tab. 38 tab. g. *Coss.* et *Germ.* atl. pl. XXVI C. *Hab.* in agrois vallej Zeta prope *Danilov grad* (MN) *Panić*.

Ad *Anacyclum clavatum* *Pers.* *Vig.* l.c. adde iconem *Rohb.* f. l.c. tab. CXLIX fig. II. et dictum *Pantelej.* l. Stefano prope Spalato (Dalm.) *Doct.* *Bellomini*.

Ad *Anacyclum radiatum* *Lois.* *Vig.* l.c. ^{ad} adde iconem *Rohb.* f. l.c. tab. eadem fig. III.

Ad Anthemidium arvensem L. Vis. l.c.p. 28 adde locum in agro circa Cattaro
 (Dalm.) Drebinje, Bilekki, Vucin in Bjelozor (Herz.) et Savnik (M.N.)
Panth. l.c.p. 39; in cultiv ad Cattino (M.N.) Pani. l.c.p. 48; in Pollog (ad Talatin)
Travnik, Vlaicich et alibi (Bosnia) Sendra; et in cultiv in Vojna (Dalm.) Domus.
 loc. cit. p. 44. Ade iconem Rebb. f. l.c.tab. M.V fig. II.

Ad Anthemidium Cota L. Vis. l.c.p. 28 adde locum in agro circa Trebinje (Herz.)
Panth. l.c.p. 39 et locum in Novi Vinodolski (Dalm.) Panth. l.c.p. 39 et syn. A. altipinnae
L. Panth. l.c.p. 39 adde iconem Rebb. f. l.c.tab. M.VII fig. II.

Ad Anthemidium vegetaleum Denov. Vis. fl. Dalm. t.p. 61 adde syn. A. brechycentrum
 Gay et iconem Rebb. f. l.c.tab. M.VIII fig. II.

Ad Anthemidium austriacum Jaeg. Vis. fl. Dalm. t.p. 39. adde syn. A. triquetrum
All. Pani. l.c.p. 48, et locum in saxon sylvestribus montibus Durnitor sub Brveni
Stijena (M.N.); et Sendra ad Zoinica et Vlaicich (Bosnia). Ade quaque
syn. A. rigescens W. Panth. l.c.p. 39 et locum in sylvestribus Radij Brada in
Bjelozor (Herz.), circa Danielov Gred, in Perunica et Dara Dol iupa m. Kom.
 (M.N.) Panth. — Addatur

Anthemis montana L. sp. pl. p. 1361. Koch 149a. fl. gom. t.p. 413.

A. caerulea monophylla, foliis pinnato-multipartiti, lacinia superiorum longe
 vi-lanceolatis obtusatis mutatis, rectangulis hemisphaericis, foliis line-
 ari-oblatis apice laevi dentatis reticulis dentatus major supra mucronatis,
 florae diu subfragantibus.

Syn. Anthemis Kitaibolica Spv. syst. veg. III p. 592. Rebb. fl. cxc. p. 222. A. styriaca
 Vest. syst. veg. bot. ratib. I. p. 12. A. carpatica W. sp. pl. III p. 2188. Panth. l.c.p. 38.
 A. grandiflora Hort fl. austr. II. p. 60. A. saxatilis W. sp. pl. p. 910. Hort fl. austr.
 II p. 507. A. mucronulata Rebb. fl. cxc. p. 227 (non Bertol.)

Icon. Rebb. fl. i. gom. XVI tab. M.VII fig. I-II. Rebb. fl. cxc. II tab. 230. Column. phyt. II tab. 33.
 Hab. in agros rupes rupes montibus Kom et Male Durnitor (M.N.) Panth. Radij albus. fl.
 Augst., Septembri. Perven.

Ad Anthemidium chiam L. Vis. l.c.p. 79. adde locum in Lepidop circa Regije (Dalm.)
Panth. l.c. et iconem Rebb. fl. l.c.XVI tab. M.VII fig. III.

Ad Anthemidium Cotula L. Vis. l.c. adde locum in agro circa Trebinje (Herz.) Panth. l.c.
 p. 38, et ubique in ins. Vegia (Dalm.) Domus. l.c.p. 44. — Addatur

Anthemis tinctoria L. sp. pl. p. 1363. Hort fl. austr. II. p. 508. Rebb. fl. cxc. p. 227

A. caerulea ramosa, superius tormentosa, foliis puberulentibus bipinnato-partiti, runcinatis
 dentatis, lacinia punctatis dentatis, rectangulis subhemisphaericis, foliis lanceolatis in non
 connexum rigidum acuminatis, achenis concreta-tetragonis anguste oblongis

Icon. Rebb. fl. l.c. tab. M.V fig. I. Ord. H. dan. t. 741. Clas. hyst. fl. p. 332.

Hab. a Travnik ad Grenica et ad pedem m. Vlaicich (Bosnia) Sendra, et in collibus asperis ad Danielov Gred
Pani. l.c.p. 48. fl. Augst. Radij lateg. Perenniat. Biennif.

- Ad *Diotis maritimam* Hork. Vif. l.c.p. 80 adde iconem Rchb. fig. 20 tab. CM.
XL VIII. fig. 22.
- Ad *Santolinian Chaenocyperis* L. Vif. l.c. adde syn. *Achillea Santolinae* Rchb. f. l.c.
 p. 24, et iconem ejusdem l.c. tab. LXII fig. 22.
- Ad *Achillea Plavnerae* L. Vif. l.c.p. 81 adde locum in repositibus montibus Cinae
Planae, Bicula Canina, Carina, Kom et Mali Durmitor (M.N.) Pautk. l.c.p. 39,
 et in monte Durmitor, ad Mirinov Do sub m. plom, et in Velika Teplice
ca (M.N.) Pauč. l.c.p. 48 - Ad Var. ^B argentea Vif. l.c. adde iconem Rchb. photob. p.
- Ad *Achillea abrotanoides* Vif. l.c.p. 81. adde locum circa Orvieto in
Cina Planina, in Peruccia Dol in Orsova Skala ca m. Kom et in Mali Durmitor (M.N.) Pautk. l.c. et in repositibus montibus Durmitor ad Mirinov Do sub m. Kom
 et in Teplice ad Bicula Gora (M.N.) Pauč. l.c. p. 48 - sed hinc nomen premette
 nomen anterioris *Achillea abrotana* L. ex pl. p. 1267. Hork. fl. aust. II. p. 513. Rchb.
 fl. ext. p. 229. A. Cleopatrae Dacne bot. crit. IV. 2. p. 551 Rchb. fl. crit. III. p. 1 et
 et A. multiplicae Gris. spic. fl. rur. II. p. 212 - Quod icon, genita nostra,
 adde Rchb. fl. crit. III. tab. 368 opt. 1. Daig. fl. aust. I. tab. 88. Clus. hyst. pl. III.
 p. 336. Bach. hist. pl. tabr. XXVI p. 131 ^{1/2}. Obs. foliorum laciniarum in nostra plana
 ta ut plurimum laticornis et remissoris, et cornutus compositus: quae quidem
 variare conperi in specie ad modum hedibunda, quid confirmant icones
 modo citatae.
- Ad *Achillea Millefolium* L. Vif. l.c.p. 82 adde locum in graminibus circa Tribi
nje (Hervey), in præcipi Canina ipsa Kom, et una pagum Kovice infra Mali
Durmitor (M.N.) Pautk. l.c.p. 40; in campis ad Cetinje et Grobno (M.N.) Pauč.
 l.c.p. 48; et in ins. Veglia (Dalm.) Domino. l.c. - Adde Var. Velaccanum: lacinia
 hispida, foliorum laciniarum angustissimis, levipennis ochroleucis subargenteo-albo - syn. C. 162
 ca Walost. et Kit. fl. rur. hung. II. p. 20 tab. 2. Hork. fl. aust. II. p. 512 - Icon. Rchb. fl. l.c.
 MXXXVIII. Waldst. et Kit. l.c. tab. 80 - Hab. in graminibus circa Tribinje (Hervey) Pautk.
 l.c. et in Quippe, prope Kalocsin, ad Tutynska (Bosnia) Sandrušev. - Ad Var. Y.
Canadum Vif. fl. dalm. II. p. 82 adde syn. A. canatae Sp. et locum in m. Vlastivich
 ad Bukovizza, Mali Sandick, Velika Ravan et aliis.
- Ad *Achillea tanacetifolium* All. Vif. fl. dalm. II. p. 82 adde iconem Rchb. f. l.c. tab. MXXXVII fig. 1. et locum in præcipi montibus Kom, in Peruccia Dol ipsa Kom, et
 in Mali Durmitor (M.N.) Pautk. l.c.
- Ad *Achillea nobilis* L. Vif. l.c. adde iconem Rchb. f. l.c. tab. MXXXIV fig. 22 et
 locum in asperis ad Vif. (M.N.) Pauč. l.c.p. 98.

mi mena Agrostis olivetorum Godr et Grise

long. nigr. apicis ad Punto d'oppo in ins. Cossia.

24 June 1873 - leg. K. Studnicka.

Juncus Tonkinensis Part. in montibus prope Melinje

mi mena Eruca Biebersteinii Grise. in saxonij May 1873
non differt ab E. tetrasperma quod idem cum V. grisea prope Punto d'oppo

mi mena Bromus macrostachys Desf B. kabiniense May 1873. K. Studnicka

non differt a B. spicatus
B. pubescens pedatae in saxonij sub castro "Fort Apio" dicto ins. Cossia

Vicia scrophularia Koch syn ed. III p. 72 Boreale unters 33 p. 73. I.
Gmelin ed. 12. 52! I. Heyne

Ad *Gnaphalium luteo-album* L. Vis. t.c. p. 23 add locum in arboris ad locum
et longi glauco foliis Parvum in v. Vigin (Dalmat.) Panth. t.c. p. 43.
Sodanum (MN) Pahl. t.c. p. 17 ad locum Rech. f. VI Tab. CX LVII f. 1.
 Ad *Gnaphalium uliginosum* L. Vis. t.c. ad locum in herbis circa Cottiae (MN)
 et locum Rech. f. t.c. fig. II

Ad *Gnaphalium sylvaticum* L. Vis. t.c. ad locum in præcipiis circa Rech. et ad locum
 Ristic Tezro infra Monti Durmitor (MN) Panth. t.c., in sylvis sub montibus
 Durmitor, Kom et Pashubica (MN) Panth. t.c. — Ad locum

Ad *Gnaphalium dicinum* Panth. t.c. p. 29.
Gnaphalium Hoppeanum Koch syn. fl. ger. p. 399. Rech. f. c. germ. XVI p. 29.
 Gr. complex ~~taeniatum~~ foliis lanceolatis basi obsolete trinervis utrinque
 dense tomentosa, caulinis mediis rufis, petiole laminas subaequali flexuosis
 spicatis, involucrum foliis exterritoribus capituli triplex brachioribus.
 Syn. *Gnaphalium sylvaticum* Hopp. in Stevian. H. 38. non L.

Icon. Rech. f. c. germ. XVI tab. C MN. II.

Hab. in præcipiis alpinis montis Kom et circa Covo Tezro iuxta montem Mati-Djura
 etor. (MN) Panth. in saxis montis Pashubica et montis Kom. Panth. t.c. et sp.
 Observatio acutior. Pl. pollici et sub. Augusto. Perenne —

Gnaphalium sylvaticum L. f. sp. syst. nat. III p. 234. Rech. f. c. germ. II p. 465. Gris. in Panth

Florae p. 41. Panth. t.c. p. 48.
~~Gr. complexum~~ ^{com. laevifol.} simpliciter subfleiformis foliis ornatis sublineariis lanceolatis - tomentosis,
 floribus breviter spicatis aut subracemosis solitariis, foliis disticterioribus meritis
 eti capitulo dimidiis longioribus, achenis pubescentibus

Sp. *Gnaphalium alpinum* Oed. fl. Dan. p. 6. In p. 11. Hanc. Ind. p. 93. Gr. f. c. Germ. p. 152. Rech. f. c. Germ. p. 152.

Icon. Rech. f. c. germ. XVI tab. C MN. II. Ord. fl. dan. t. 332. ~~tab. C MN. II.~~

Hab. in præcipiis alpinis Biele Lariæ prope Kom (MN) Panth. in saxis montis Savoie
 et Kom (MN) Panth. t.c. Pl. ^{partim} sub. Augusto. Perenne.

Ad *Gnaphalium dicinum* L. Vis. t.c. p. 17 ad locum in præcipiis alpinis Biele Lariæ
 dicti prope Kom et in monte Kom (MN) Panth. t.c. sub Autunno in vicina Gris. Dan.
 australis gris, et in præcipiis Regae sub monte Kom (MN) Panth. t.c. et in monte Mati-
 rich neva Belkari (Bosnia) Sestnica. Ad locum Rech. f. c. germ. XVI tab. C MN. II.

Ad *Gnaphalium angustifolium* DC. Vis. t.c. p. 28 ad locum in apicibus circa Regae (Balcan)
 supra oppidum Lascium Carina prope Bergato, vicina Meliceti (Herceg) Panth. t.c.
 in Savoie ad Belcivici distra Gruische (MN) Panth. t.c., et locis supra montibus in Balcan
 apicibus Ternavas. t.c. p. 46. (exd. David)

Ad *Gnaphalium germanicum* L. Vis. t.c. ad locum in apice ad pedem montis Savoie (Balcan)
 circa Savoie et Danielas grad (MN) Panth. t.c. et in monte Mati-rich neva Belkari
 Lascia dicta Lazarilla Nahiya circa Danielas grad (MN) Panth. t.c. ad monte Tellaich prope
 Drinik (Bosnia) Sestnica. et in locis aridis Provenetius, Cottiane, Veglie et ab aliis (Balcan) David.
 — Ad *Gnaphalium germanicum* Rech. f. c. Germ. p. 152. — ~~ad locum in apice ad pedem montis Savoie (Balcan)~~
 — ~~ad locum in apice ad pedem montis Savoie (Balcan)~~ — ~~ad locum in apice ad pedem montis Savoie (Balcan)~~

et syn. *Gifola germanicae* Rehd. et icona idem f. il. nom. XVII tab. XLV f. 1. - Ad Var. E. cana
cent. ~~lens~~
Gris. in campis ad Savice dist. *Ljubljanska Nizina* super Danilev Grd.
(MN) Panč. v. p. 46: ~~ad var.~~ Var. n. *opposituleum*: capi-
tuli *argentei pentagoni*, foliis *flavis*, foliis *oppositulis* - Syn. T. *opposituleum*
Prestol. beli. prg. p. 93. Gris. in Partk. Zm. p. 42. Leon. Rehd. f. 1. c. tab. ^{CMXVII} f. III.
Var. E. *erectoglossum* Part. Urs. l. c. add. ~~lens~~ f. 1. c. f. 2. f. 3.

* *Filago* ^{lupinus} *minima* Miers. nov. spec. p. 268. Part. l. c. p. 47.
Filago minima Miers. nov. spec. p. 268. Part. l. c. p. 47.
et fil. *Rehd.* pl. ^{xxvi} f. 2.
Ad *Vieginius gallicam* L. Urs. H. Dalm. II. p. 26 add. syn. *Luglio gallicus* (Linn.) Germ. et Linn.
Rehd. f. il. nom. XVII tab. ^{CMXLVII} f. 1. et locum in respectibus circa Bisie (MN) Partk.
l. c. et in glororiis ad Danilev Grd. et regio Lingau dist. Crnicia (MN) Panč.
circum Cattaro et in Stagovici et Budrov (Dalm.) Clementi
l. c. p. 47. ~~addit.~~

Filago minima Miers. nov. spec. p. 268. Part. l. c. p. 47.
T. *sulcifolia* ^{gracilis} *ramosa*, ramosa, ramis dichotomis, capitulis ^{lanceolatis} ^{languidis} terminalibus que per
capitula minima excurrent, foliis ^{cavatis} ^{oblongis} glabris ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis}
Syn. *Euphorium minimum* Sm. tab. ^{CMXLVII} f. 1. *fil. britan.* 815. *Cylista minima* Rehd. f. 1. c. nom. XVI p. 3.
Leon. Rehd. f. 1. c. tab. ^{CMXLVI}. Sturm. deutsch. II. 38 tab. 9. Linn. et Germ. atl. de Par. pl. ^{XXVI}.
Hab. in rupibus vallej Zeta prope Danilev Grd. (MN) Panč. H. atrini. H. Pet. dug. annua.

No vidi - Addit.

Ad *Anthemidum arvensem* L. Urs. H. Dalm. II. p. 28 in aux. de sc. nat. XX IV. 2. p. 1.
Filago Turiciana Coss. et Germ. tab. 16. f. 1. ^{at. de leg. de Po.} Partk. pl. ^{XXVI} f. 1. aux. de sc. nat. XX IV. 2. p. 1.
T. *languinosa* ^{ramosa} ^{ramosa} ^{ramosa} ^{ramosa} ^{ramosa} decumbens, foliis ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis}
conspicuus capitulis subhemisphaericis exsertis, in foliis planis ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis} ^{lanceolatis} ^{oblongis}
ribus.

Syn. *Filago germanicae* Var. 5 Decemberus Urs. l. c. p. 75

Non. Coss. et Germ. ^{at. de leg. de Po.} pl. ^{XXVI}. A.

Hab. in agriis inuidae *Cuculo* (*Corynephaga nigra*) Dalmatiae. Kristius. *Austriaca*. Annun.
Obs. En Var. *germanicae* L. ? Habitus raro diversus, et raro a basi ramosa et decumbens,
et in agro in cultis ad oculos habet!
Ad *Anacyclum radiatum* Lors. Urs. l. c. p. 77 add. iconem Rehd. f. il. nom. XVII tab. ^{CM}
XCIX. sicut ad *A. clavatum* Pers. Urs. l. c. iconem Rehd. f. 1. c. tab. cad. f. II. et locum
Purita di S. Stefano prope Spalato (Dalm.) Beltramini.

Ad *Anthemidum arvensem* L. Urs. l. c. p. 28 add. locum in agri circa Cattaro (Dalm.)
Trubing, Bilecki, Katica in Bielagora (Herceg.) et Stavnicki (MN) Partk. l. c. p. 39;
in cultis ad Littinge (MN) Panč. l. c. p. 48; in cultis vns. Veglia (Dalm.) Tommas. l. c.
p. 48 et ic. Rehd. f. 1. c. tab. ^{MVIII} f. I. - Ad *anthemidum Cota* ^{Partk. l. c.}

Ad *Anthemidum Cota* L. Urs. l. c. p. 78 add. locum in agri circa Trubinga (Herceg.) ext. syn.

et add. locum in agri circa Trubinga (Herceg.) et iconem Rehd. f. 1. c. tab. ^{MVIII} f. 1. Addit.

Ad *Anthemidum vegetale* Urs. H. Dalm. suppl. p. 61. add. syn. A. brachyceras Juss. sive
et iconem Rehd. f. 1. c. tab. ^{MVIII} f. II. - Ad *anthemidum Cota* ^{Partk. l. c.}

Ad *Anthemidum austriacum* Jacq. Urs. H. Dalm. II. p. 29 add. syn. A. triumphali All. Panč. l. c. p. 48 et
et locum in saxos sylvestribus mortis Durmitor iub. Cuccia Nigra (RN), et Serdica ad Trubinga et

Vlašić (Bosnia); id syn. A. vegetale Juss. ^{partk. l. c. p. 39} et locum in sylvestris Raduš Brdo in Bielagora (Herceg.) vns. Danilev Grd.

* add. syn. A. triumphali L. Partk. l. c. in primum p. circa Trubinga (Herceg.) in locis et vns. Danilev Grd. ^{Partk.}

Addatur

Anthemis montana L. sp. pl. p. 1361. Koch syn. fl. germ. II. p. 415.

A. caulis simplicibus monochylebus, foliis pinnato-multipartitis, lacinia superiore
num linearis-lanceolatis obtusatis mutatis, receptaculo hemisphaericis, foliis linearibus
oblongis, apice laceris dentatis rotundatis majora, aequaliter mucronatis,
flores viridi subaequalibus.

Syn. A. Kitaibelii Sp. Lyth. veg. III. p. 392. Richb. fl. exc. p. 227. A. Styriaca Vest. 14th.
Sol. bot. Ratisb. I. p. 12. A. caryoptica W. sp. p. 177. p. 218. Pantk. I. c. p. 38. Argentea
flora Host fl. austri. II. p. 606. A. mucronata Richb. fl. exc. p. 227. non Beckst. A. taxifolia
Wenckebach. p. 90. Host fl. austri. II. p. 507.

Icon. Richb. f. in germ. XVI tab. MXXXI fig. I-II. Richb. fl. crit. II. tab. 230. Column. phytot. II. tab. 33.

Hab. in agris vegetribus montibus Kom et Meli Durmitor (MN) Pantk. Radius altius. Pl.
Augusti, Septembris Perquinis. — XVI cor. Novem. pag. III.

Ad *Anthemis* Glauca L. Vif. I. c. in agro viri Trbinge (Herzg.) Pantk. I. c. p. 38
et ubique in ins. Vegla (Salon) Bosnian. I. c. p. 44 — Addatur

Anthemis tinctoria L. sp. pl. p. 1363. Host fl. austri. II. p. 508. Richb. fl. exc. p. 227.
A. angustifolia glauca L. monilifera,
foliis puberulentibus bipinnatis-partitis, ruficiliis dentatis, lacinia percurrentibus dentatis,
receptaculo subaequali, foliis linearibus in mucrone rigidum recessis
tum, achenis conigris tenuisimis angustis alatis, longis

Icon. Richb. f. in germ. XVI tab. MX. fig. I. Bed. fl. dent. 741. Ober hift. pl. p. 332.

Hab. a Drinik ad Crnije et ad pedem montis Vlasici (Herzg.) Srednji. Pl. Aug.
Sept. Radius latius. Bienn. aut perenne.

CXLVIII.

Ad *Diotis maritimam* Hook. Vif. I. c. p. 80 adde locum in vegetribus montibus *Cone Plant*
na, Biela Carina, Carina Kom et Meli Durmitor (MN) Pantk. I. c. p. 39, et in vegetribus
m. Durmitor, ad Meliorum Dobro m. Kom. sed et in m. Velika Jastrebica (MN)
Pantk. I. c. p. 48.

(Addit. locum in vegetribus circa Tavice in *Cone Plant*na in Pinie
et in Drinje Skala in m. Kom et Meli Durmitor (MN) ut dictum est in *Bot. hift.* p. 1267.
et Achilleum abrotanoides Vif. I. c. p. 81 et praeiecta nonne anterior. A. atrovire L. sp. p. 1267.
cum syn. Host fl. austri. II. p. 513 Richb. fl. exc. p. 229 et A. Clusiacea Dacog. bot. crit. IV. 2 p. 551
et A. multifida Vif. sp. fl. rum. II. p. 212. Adde locum Richb. fl. exc. p. 229 et Pantk. I. c. p. 38
fl. austri. tab. II Richb. fl. crit. III. tab. 368 sp. of. of Dacog. fl. austri. I. tab. 77. — Obs. foliorum
laciniae in nostris plantis rarissimae et raro in compositis; quae quidem variae compari in
specie admodum indistincte, utrumque modo utatas.

Ad *Achilleum Millefolium* L. Vif. I. c. p. 82 adde locum in graminibus circa Trbinge (Herzg.), in p.
cuius lacinia infra Kom et viri pagum Kovice infra Meli Durmitor (MN) Pantk. I. c. p. 40, in cuius
ad Lettingi et Gravora (MN) Pantk. I. c. p. 48. Note Var. 1. laciniam ^{stans} ^{angustifoliam}
laciniae in nostris plantis rarissimae et raro in compositis; quae quidem variae compari in
specie admodum indistincte, utrumque modo utatas.

Ad

- Anthemis montana* L. sp. p. 1361. Koch syn. gl. II p. 413
cariota angustifoliae multi-petala
a plante paucitaria parvula campanula latifolia, fascia superiorum foliis
latif. nutans obliqua, velutina h. campanulae, petioles linearis. Stomachus apicis latior
dentatus dentatus major, ex parte innumerales, foliis dorsi subangustifoliae,
- A. Kiliaibicus* Lgr. 141 p. 592. A. Steviana Vest 144 tab. 161 p. 12
A. carpatica W. H. sp. III p. 238. Panth. 1. c. p. 38. A. grandiflora Host ff. austri. II p. 566
A. multilobata Hrb. f. 16 tab. 22 non Reichenb. a. exaltata Wahlenb. p. 910. Host ff. austri. II p. 559
in Hrb. f. 16. p. 592 non Reichenb. M. tab. 111 p. 11. Rchb. ff. exalt. II tab. 230. Col. p. 566. I. tab. 333
b. in agris vegetabilibus in Kom et Meli Durmitor (MN) Panth. Radicans album.
El Aug. Sept. Primav.
- A. Anthemidum* Stev. 2. His. II p. addit. locum in Lapidariae circa Drinograd (Selon)
Panth. 1. c. et iconem Rchb. f. 1. c. XVI tab. LXVII fig. III.
- A. Anthemidum* Colete L. V. 1. c. in agro circa Drinograd (Horvay.) Panth. 1. c. p. 38
et ubique in ins. Vegia (Selon) Bonnem. 1. c. p. 44 — Additum
- Anthemis tinctoria* L. sp. p. 1363. Host ff. austri. II p. 568. Rchb. ff. exalt. p. 227.
a. angustifolia amara supra Comitatu
i. foliis pubescensibus hyperboreis, petioli, rufioides dentato, lacinia petiolaris dentata,
rugosa subangustifoliae, petioles linearibus in mucronem rigidum racemos
tip, acheniae coniformis tenuiorum angustae obtusae, ligule
- Icon. Rchb. f. agrot. XVI tab. LX. fig. 1. Rad. ff. den. t. 741. Chir. h. p. 232.
- Host. a. Drinograd ad Gernige et ad pedem montis Vlasac (Horvay.) Sendeur. W. Aug.
Sept. Radicans heteroz. Brevis aut perennans. CMXLVIII.
- A. Diotis maritimam* Host. His. 1. c. p. 80 addit. locum in vegetabilibus montis Cvejna Planis
na, Biele Cevine, Cevine Kom et Meli Durmitor (MN) Panth. 1. c. p. 39, et in vegetabilibus
m. Durmitor, ad Nivelor Do. sub m. Kom. f. 1. c. et in m. Velika Sastrebica (MN)
Pan. 1. c. p. 48. (Addit. locum in vegetabilibus m. m. Iazovice in Cvejna Planina in Bačići
vuln. 141. Et in Cvejna Skala m. m. m. Meli Durmitor (MN). Host. ff. austri. II p. 569.
ff. austri. f. 16 tab. 22 Rchb. ff. exalt. p. 229 et *A. Clusianna* Taeg. bot. Zeit. IV. 2. p. 551
et *A. multifida* His. sp. p. 161 ff. exalt. p. 212. Addit. locum Rchb. ff. exalt. tab. 368 p. 552 ff. exalt. p. 553 ff. exalt.
ff. austri. f. 16 tab. 22 Rchb. ff. exalt. III tab. 368 opt. of Taeg. ff. austri. I. tab. 77. Opt. foliorum
lanceolatae in rotunda plantae rarois et corymbus compositus; quae quidem variis comparsis in
specie admodum sedidit, uta formis mole citatis.
- A. Achilleum* Millefolium L. sp. 1. c. p. 82 addit. locum in graminibus circa Drinograd (Horvay.), in p.
cuius Cuvina infra Kom, et line pagum horae in pra. Meli Durmitor (MN) Panth. 1. c. p. 40, in cunei
ad lettina et fraxino (MN) Pan. 1. c. p. 48. Adit. Var. 1. Staceum ^{et} c. Horae lanceolata angustifolia
ligulis rufis oblongis rectis alterat, ^{et} lanceolata Walst. et Kit. pf. vnu. Horae II p. 82, tab. 80. Host ff.
ausfr. II p. 512. Rchb. f. 1. c. LXVIII. Walst. et Kit. tab. 80. Tab. in graminibus circa Drinograd (Horvay.) Panth.
ausfr. II p. 512. Walst. et Kit. tab. 80. Tab. in graminibus circa Drinograd (Horvay.) Panth.
et Rchb. f. 1. c. LXVIII. Walst. et Kit. tab. 80. Tab. in graminibus circa Drinograd (Horvay.) Panth.
et Rchb. f. 1. c. LXVIII. Walst. et Kit. tab. 80. Tab. in graminibus circa Drinograd (Horvay.) Panth.

Ad Achilleum tanacetifolium Obl. Vig. f. 82 et ad id iconem Rchb. f. 60 tab.
MXXVII f. 1. et locum in partibus Korn, in Pennicula Dol infra Korn et in Mali Durnici
(MN) Pantk. f. 1.
Ad Achilleum notabile L. Vig. f. 1. ad id iconem Rchb. f. 1. et MXXIV f. 2 et locum in epe
rit ad vir. (MN) Pantk. f. 1. f. 48.

Ad Achilleum odoratum L. Vig. f. 1. ad id iconem Rchb. f. 6. f. 1. tab. MXXIV f. 1. Dominat.
f. 1. et in vegetib. Capriccio, I. Maria d' Cape, Veglio, Pagodoro (excl. A. ligustrinum Alli.) et in
monte Radostak supra Caducovo et Cetina (post Weiß) et in ageris prope Celvija in
Korvorice (post Kischkow) in Dalmatia.

Ad Achilleum ligusticum All. Vig. f. 1. ad id iconem Rchb. f. 1. (f. 1. tab. MXXIII f. 3? 10)
Gomera albituba opifex notitia spat. part. angusti et latifolia
pinnulas profundi unicus in specie Dalmatia. Post id est

Achillea citharinifolia Waldb. et Kit. pl. hung. v. 1. tab. 68 Host f. austri H p. 511

Rchb. f. 60 f. 229. Gris. in Pantk. adn. f. 40 (excl. ex parte syn.)

A. citharinifolia pubescens, caule erecto teretiforme, foliis inframarginalibus bipinnatis partitibus
caulinis petiolatis bipinnatis partitibus, lacinias lineares oppositae apicibus subtriangularibus,
subcordatis concretae, ovatae
Corolla, caerulea quamvis obliqua rotundata

Leon. Rchb. f. 1. c. XVI tab. XXIV Waldb. et Kit. f. 1. tab. 68.

Hab. in graminibus Ragusa, Cattaro (Dalm.) et circa Dabarja in valle Fadis Brod prope
Viria in Bjelagora (Herz.) et circa Danilov Grad (MN) Pantk. H flavescens. H
Tunio, Tulio-Penna.

Achillea helvetica Schleicht nass. Rchb. f. 1. c. XVI f. 16.

A. pubescens, caule erecto abrupto, foliis bracteatis bipinnatis partitibus, caulinis semilobatis
pinnotatis partitibus, lacinias linearis pinnotatis partitibus auctius apices subtridentatis radiatae
latifolias dentatae, corolla composta, involuci subrotundis quamvis oblique-
rotundata

Icon. Rchb. f. 1. c. tab. MXXVIII fig. II ubi legg. Janus et Pavia.

Hab. in sylvaticis montibus Velletib. H acutata H. albi- Penna.

Obs. Planta nosta in Rchb. f. 1. iconibus optime exhibita. Non videtur hybride, seus ac
autumnat et Rchb., nam res A. acuta ne et macrophylla in Dalmatia, aut
sartem in montibus Velletib. autem vira.

Achillea lingulata Waldb. et Kit. pl. hung. 1. tab. 2. Host f. austri H p. 509. Rchb. f.
excl. f. 228. Gris. in Pantk. f. 1. c. 39

A. hispida, caule erecto angustifolius dentatus, foliis integris in petiolum attenuatis,
lingulatis sessilibus, corolla longitubosa compacta rimulata, involuci quamvis ovato-lanceolatis
margine fusca, ligulis apice totidematis.

Leon. Rchb. f. 1. c. tab. MXV f. 2 Waldb. et Kit. f. 1. c. tab. 2, attingens foliis integris

Hab. in graminibus Carića infra Korn, civis Tavora in Cyne Planina, et in monte Sinjaljina-
Planina (MN) Pantk. et in monte Velebit supra Bekler, Bršnik, Mali Sandik, Velika
Cavna et alibi (Bosnia) Serdica H. albi f. acutata Pennin.

Ad Matricariam Chamomilla L. vif. l.c. p. 84. ad locum in montibus circa
Cattaro (Dalm.) Pantk. ad p. 40. et ad Traonik, Scaga, Karangjew, et Cet
jet usque ad Lione (Bosnia) servata.

Ad Chamaemelum inodorum (Brach.) Vif. l.c. p. 85 ad locum ad Traonik, fratre
super Lidjhan, Kobilna glava ad Dusinthona. (Bosnia) Pantk. in collis ad Ljajic
Ad Chamaemelum myrtoides (L.) Pantk. l.c. ad locum in partibus (MN.) Pantk. l.c. p. 48 ad Chrysanthemum
Kovice usque montes Meli Dobrovitor (MN.) Pantk. l.c.

Ad Chrysanthemum Leucanthemum L. Vif. l.c. p. 87. ad locum in partibus circa
Danilov grad, in Vraca Dol usque (vra) Planina, in Posavina et Tarn
Dol usque Kom, et circa Kocice (MN.) Pantk. l.c. in pratis sub monte
Dobrovitor et in valle Zeta sub Danilov grad (MN.) Pantk. l.c. et in pratis
et Teplici, Parigrad, Gavje in ins. Vegia (Dalm.) Pantk. l.c. p. 41 / sub
Levantinum vulgo DC; et in Vlasic, super Bakar, Traonik, Gora
ad Sutinska et alibi (Bosnia) sed non ad Var. E. graminifolium Vif. l.
l.c. p. 88 ad locum in sylvaticis circa Dubrovnik, et in valle Hadice Brodo prope
Vicia (Herceg.) Pantk. l.c. in vegetribus m. Lovien et Taphreba (MN.) Pantk.
l.c. - Ad Var. p. 89. Leontopodium Vif. l.c. ad locum in partibus montium
Dobrovje, Zapalje, Vrgorac (Dalm.) Pantk. l.c. ~~ad locum in partibus montium~~
~~ad locum in partibus montium~~

* *Chrysanthemum pallens* Gay in Guill. annals bot. 1833 II. p. 565. Gris.
in Pantk. adp. p. 40.

Chr. sparsum setosum, caule subciliatiss., foliis inferioribus longo petiolatis subro-
tundatis ~~oblongo-peltatis~~, superioribus ~~oblongo-peltatis~~
subrotundatis, squamis semianulariis integris, capituli squamis ob-
longo-ovalibus, obtusis, acuminatis, ^{B. 1833. p. 565. 2.} Rarus albus.
Non. Robt. p. 1833. p. 565. f. 1. ^{f. 1.} Hab. in g. montibus circa Kicha (MN.). H. estatae perenne. Pantk.
Obs. Ann forme aut varietas Chr. Leucanthemum L.?

Chrysanthemum laratum Gris. in Hofst. bot. zeitschr. 1871 p. 266,
et in Pantk. l.c. p. 41.

Chr. sparsum setoso-pubescentem caule simplici monopetalio, foliis inferioribus
triplinerviis multispinis, linearibus cuspidiatis, summis bipinnatis lessi-
bus, capituli squamis ovatis marginis nigris, apice acuminatis, acumen cylindrica
perfoliato - Non. Robt. p. 1833. p. 565. f. 1.

Hab. in vegetribus montibus Kom (MN.) Pantk. l.c. et ~~et~~ idem locis in montibus
Dobrovitor et ad Vraca Dol sub monte Kom (MN.) Pantk. l.c. pl. p. 48.

Involucrum non ad albus. H. estatae perenne.

Obs. ^{griseans} *Antennaria montanae* L. quae diff. praeter receptaculum nudam,
tempore bipinnatisectis, umbella oblonga non ovata. Habitus sicuti Antennariae -

- Ad Chrysanthemum cirsinaefolium Vif. l.c.p. 88 ad locum in sato
in circa Regrea et in monte Vermei prope Cetinam (Dalm.) in vnde
grec prope Trbinje in valle Savina prope Brkovo et in Kostrena
grec prope Ucica in Biograd (Herzeg.) et circa Kameni (MN) Pauli.
f. 40 (sub Pyrothos) et in satois sub monte Lovcen ad Cetin, super gra-
hov et in m. Sappabica - Bijela Gora (MN) Pauli. l.c.p. 48 XII tab.
Ad Chrysanthemum pulchrum L. Vif. l.c. ad locum Rabb. f. 1799. sub tab. 100
ad Chrysanthemum corymbosum L. Vif. l.c. in sylvestribus monte Durne-
tu et demetij Morena superioris (MN) Pauli. l.c. f. 42 (renata rupor-
e) et iconem Rob. f. 1799. sub tab. 100. ad locum Rabb. f. 1799. sub tab. 100
Kolacina usque ad Sutomore, et Pravnik usque ad Steffice (Bosnia) Sechtaw.
f. 1799. sub tab. 100. ad locum Rabb. f. 1799. sub tab. 100. ad locum Rabb. f. 1799.
et in Bosnija, super montem Ponikka ad Varap et Tellach. (Bosnia)
Scdta. Ad locum Rabb. f. 1799. sub tab. 100. ad locum Rabb. f. 1799.
Hab. in pratinis monte grec prope Trbinje (Herzeg.)
- Ad Chrysanthemum macrophyllum Walst. Kef. f. 80. ad locum in vnde
in monte Veternik prope Brkovo, in Oviroj Dol in pro Crna Pla-
nina et in Perucic Dol in pro Korn (MN) sub Gymnocalycina macrophylla
B. f. Pauli. l.c. p. 40, in sylvestribus ad Kolacina (MN) Pauli. l.c. p. 48.
et in Bosnija, super montem Ponikka ad Varap et Tellach. (Bosnia)
Scdta. Ad locum Rabb. f. 1799. sub tab. 100. f. 1.
- Ad Chrysanthemum Tanacetum Vif. l.c.p. 89 ad locum iconem Rabb. f. 1799.
XVI tab. CM XCVI f. 1. ad locum in vnde Petanj (Dalm.) sub Chrysanthemum tanacetum Malches. l.c.p. 323.
* Ad Chrysanthemum tanacetum Malches. l.c. ad locum Rabb. f. 1799. sub tab. CM XCVI f. 1.
Ad Chrysanthemum segatum L. Vif. l.c. ad locum Rabb. f. 1799. sub tab.
CM XXXVI. f. 1. ad locum in vnde Petanj.
- Ad Pinardia coronaria Less. Vif. l.c. ad locum Rabb. f. 1799. l.c. tab.
cad. fig. II. et locum in vnde Petanj (Dalm.) sub Chrysanthemum tanacetum Malches. l.c.p. 323.
- Ad Artemisia Absinthium L. Vif. l.c.p. 91 ad locum in sylvestribus circa Bil-
ek (Herzeg.), in parte monte Turzavino Planina Kratko ritam negra pagum (Dalm.)
(MN) Pauli. l.c. p. 41; in vnde ad Nijegos, Danilov Grad (MN) Pauli. l.c. p. 42; a
Suiza ad Borovoglave, et a Zivici ad Livno (Bosnia) Scdta. et in agri, et ad
Domjat et vnde, Berca, Veglie (Dalm.) Tommasi. l.c.p. 44.
- Ad Achillea arborescens L. Vif. l.c.p. 91 ad locum in vnde Petanj (Dalm.) Dalm.
Malches. l.c. et iconem Rabb. f. 1799. sub tab. MXXXIX f. 1.
- Ad Artemisia campestris Vill. Vif. l.c. ad locum in satois m. Sibra prope Trbinje,
in Kostrena grec prope Ucica in Biograd (Herzeg.); circa Manastir Duga, Bicic,
Stronisti et Slavje (MN) Pauli. l.c. p. 41; in satois super Gračevu (MN)
Pauli. l.c. p. 47; et in vnde collina Berca, m. Brgas et Veglie (Dalm.) Tommasi.
l.c. Et ad Vrdi. B. Biogradianae. f. 1799. l.c. ad locum in sylvestribus agri Ciricic, Ca-
prio, Bokanov (Dalm.) Tommasi. l.c. et iconem Rabb. f. 1799. sub tab. MXXXIX f. 18. sub tab. 100. sub tab. 100. W.

- Ad *Asternipham paniculatum* Lam. Vis. l.c. p. 92 ad locum ^{observez} (Rchb. f. l.c. tab. MXXXVII opt! ope).
- Ad *Asternipham sepiarium* Waldb. et Kit. Vis. l.c. ad locum (Rchb. f. l.c. tab. MXXXVII opt! ope) locum in canyis ad Cetinje (MN.) Panč. l.c. p. 48.
- Ad *Asternipham capistratum* L. Vis. l.c. ad locum (Rchb. f. l.c. tab. MXXXV. f. 1).
- Ad *Asternipham vulgaris* L. Vis. l.c. ad locum in dumetis circa pagum Koviće (MN.) Pančk. l.c. et in canyis valley Lete sub Danilov Grad (MN.) Panč. l.c. et ad Caprije, Lestelmaški, Vrgić, Paprda (Dalm.) Donau. l.c.
- Ad *Asternipham crenatopetala* L. Vis. l.c. p. 93 ad locum in arvillis, salicis ins. Vrgić, Laniće, Val Saline (Dalm.) Donau. l.c.
- Ad *Panacium vulgare* L. Vis. l.c. p. 98 ad locum in solentis ad rivum Moraca et Jare (MN.) Panč. l.c. p. 48.
- Ad *Bidens tripartita* L. Vis. l.c. p. 94 ad locum in forestis ad Sinjac, et Vis (MN.) Panč. l.c. p. 46, et iisdem locis ad Panichaea laciniata Caprije ins. Vrgić (Dalm.) Donau. l.c. p. 46. et ad alterum
- Ad *Bidens cernua* L. sp. pl. p. 115 Host H. austri. II. p. 451 Rchb. f. ex. p. 268. B. flui lanceolatis serratis basi subcordatis, capitulis cornutis, squamis involucrariis foliis longioribus, acheneis obvolutis marginis subfusca acutatis, quadratis, margine retrosum levigatis
- Syst. Bidens minima L. sp. pl. p. 115. Coccoff. Bidens L. sp. pl. p. 1281. Icon. Rchb. f. ex. geru. XVI tab. CXLI. f. II. III. Schult. handb. f. 285. Bed. H. dan. f. 312.
- Hab. in arundinatis ad Sinjac (MN.) Panč. et. gl. p. 46. H. austri. H. austri. Bienn.
- Ad *Sedum hispanicum* L. Vis. l.c. p. 95 ad locum in arvillis circa Trebinje (Herceg) et in Bjela, Sindžor (MN.) Pančk. l.c. p. 46; et in arvili et vicis agrestibus ins. Vrgić (Dalm.) Donau. l.c. p. 46.
- Ad *Lampranthus communis* L. Vis. l.c. p. 96 ad locum in dumetis ad Cetinje, Vis (MN.) Panč. l.c. p. 54; et ad rupes et loca umbrosa circa Vrgić et Dobrinje (Dalm.) Donau. p. 46; et ad Klanci et Duvnik gorge (Zenjile) (Bosnia) Šendri. - Ad alterum Rchb. f. ex. p. 249.
- Lampranthus grandiflora Bieb. H. taur. come. in supp. n. 1630 DC. prod. Syst. nat. VII p. 77. Griseb. spic. fl. rum. p. 257 et in Pančk. ad. p. 46.
- L. inferne puberula, superne glandulifera, capillis squamis nigro corollinae dulcis brionivibus.
- Syn. L. adenophora Boiss. Diagn. fl. orient. 1. p. 23 et H. orient. L. lyrate W. en. h. ber. p. 832. L. grandiflora Var. adenophora Griseb. l.c. Pančk.
- Hab. ad rupes circa Danilov Grad (MN.) Pančk. H. austri. H. austri. annua - Var. intermedia Griseb. l.c. foliis longioribus nummatis, capitulis glabris. - Syn. L. intermedia

Bieb. l.c. p. 50. Gris. l.c. Panth. l.c. — Hab. in sybericis monte Svera prope Tschirje (Tcherz) et in Vrigne Dol infra Cno Planina (MN.) Panth. Obs. Vir qua variancy antecedentij habenda. — addatur genus

Oporinus Neck.

clam. l. p. 57 (non Cassin.)

Char. Involucrum capitulo exterio triphylo interior peltifolio.

Receptaculum medium ciliatum coriaceum quinqquistrigato ante agum contracte calva. — L. Lygazurus Ord. Polygaliaeq. sylvestris

Oporinus foetida L. syn. p. 128. (excl. ch. gen.) DC. prod. 1911. eg. VII p. 82.

A. Scapif monopodialis, foliis nemato-pinnatifidis, ^{Lagurus} tuberosis et
terminali triangulis ^{lyb.} tubo. Koch. syn. fl. helv. II p. 411.

Syn. Hyoseris foetida L. 47 gl. p. 1137. Lagurus foetida Willd. 4 gl. II p. 622.
Koch fl. austri. II p. 430.

Icon. ^{19 tab.} Reichenb. f. D. Waldb. et Kiri. pl. rar. hung. I. tab. 48. Michel. gen.
pl. tab. 28. Column. cypri. 2. tab. 31.

Hab. in nemorosis a Magdeburg Moscice et Doboi (Bosnia) vendita.
H. latei. H. aestiva Prennii.

Ad Hedysarum creticum W. Vir. fl. delm. II p. 98 add. generimon H. cret.
deformis Reichenb. f. ex. p. 251 et ^{19 tab.} Vir. p. 54, et locum Reichenb. f. D. gerim.
19 tab. ^{19 tab.} ~~MCCXLVII~~ p. 18 ad. Ad Hedysarum tubaeformem Den. Vir. l.c.
add. iconem Reichenb. fil. l.c. 19 tab. MCCXLVI. et locum in insula circa Zara
(Dalm.) Panth. sub H. Thagadistoides Sm. et in cultiv. Veglia, Dobrinje (Dalm.)
Tommasi. l.c.

Ad Hypochaeridium radicatum L. Vir. l.c. add. locum in graminisq. Viruge Dol,
infra Cno Planina (MN.) Panth. l.c. p. 46, et in gratis ad vir. (MN.) Pan.
l.c. p. 54 et iconem Reichenb. f. l.c. 19 tab. MCCXLVI

Ad Hypochaeridium maculatum L. Vir. l.c. add. locum in postiq. circa Orshover in Biele
Gora, in Viruge Dol infra Cno Planina, in Ponica et Tora Dol infra Kom.
in monte Trnjavina Planina, et circa pagum Kovice infra Mali Durmitor (MN.)
Panth. l.c. et in forestis sub monte Kom (MN.) Panth. l.c. — Dein addatur.

Hypochaeris glabra L. sp. gl. p. 1140. Reichenb. f. ex. p. 268. Tommasi. l.c. p. 16.
H. foliis caulinis caeruleis renoso glabris involucro ligulatis subaequaliter ^{caeruleis} ~~caeruleis~~
acheneis centralibus longe rostratis, marginatis mutatis, vel rostratis

Icon. Reichenb. f. 19. tab. MCCXLVIII. f. II. — Rec. fl. den. t. 924. Gaertn. de fr. sec. II tab. 160
Hab. in loco herbose, et in agri. Dobrinje, Papova i. Veglia (Dalm.) Tommasi. l.c. H. latei.
^{VIII} annua