

di due nuovi generi di piante fossili
Nota
al prof. dr. Virgini

Le cose d'annunzi e d'importanza d'ogni organico che si trovano
lungo il torrente Chiaravola, e più samente a Sestri Levante
presso la via di Orte, sono già note a paleontologi fin da che d'
infatti ed oscuro spettore a Mascalzoni pubblicò la sua
prima ^{della sua} ~~scoperta~~ ^{scoperte} fatta. Queste le nuove e molte decine di cui oggi
vedono le nuove specie di Palme, che mi vanno tolte di
ritrovare ed esaminare, poiché gli scienziati tanti di sopravvivere
di gran lago tutto ~~fatto~~ ^{fatto} punto fino lontano in ogni parte
e flente del mondo. I due soli esemplari che tutta fi escozzano
di palme intere, cioè senza di tutte le loro parti, sono
quelli qui per dimostrare, e che ora formano un nuovo
genere unico che signifia delle collezioni paleontologiche dei
dotti di Com. Porro e me. A questi ultimi s'aggiungerà
otto le Palme, due generi di piante frutti ancora ignoti alle
scienze, e almeno tre esemplari n'sono già già pubblicati, ed
questi ho creduto anteporre un buon motivo, considerando
la importanza quest'Occasione e rispondendo ad alcune lunghe
e più diffusa ^{richiesta} di illustrazione.

L'una di queste importanti, che di prima tutto venne con prefissi
è leggermente sopraffusa la frutta, il pericolo - i caratteri di quelle
specie erano di alto prezzo, le cui pietre hanno ilusione di non aver
mai esplorato ne tempo, ognuna di quali son da le d'aperto - Altre due hanno
frutta liscia, quella marginale delica, apice attenuata ma non acuta, mossa
no le braccia dell'arco sotto del teatro di cui sono fatta, come si vedrà
si riconosce dall'insolita profondità dell'arco che prosegue ^{nella lunghezza} alla base con cui
si allarghiano, e per tutte le loro lunghezze sono segnate di sfrie leggermente
numerose e profonde - In queste pietre si vedrà il morso gremo di piante
monocotiledoni frutti, che per la grossezza loro colte leggermente dev'essere segnato le
nuove addette già della lunghezza, chiamarsi

Agaortes Vis.

Char. Folia elongata lanceolata crassa, basi excurrente margini integrum, apice
alternata oblique recta undique striis tenueibus parallelis numerosis
longitudinibus conformibus lineata.

Hab. Quiria ^{optima} et affluens Chiacon, loco Sestijo ^{quadrato} in parvissim Melan-

L'altro frutto da disegnarsi, e che non è sufficiente un doppio, conservando tracce

della sottosuola, di cui comprenderà, e un tronco cilindrico, alto m. 1.74 ^{grado} ^{cm. 7-8} ^{altezza}
lunghezza circa 25 ^{gradi} ^{cm. 25} foglie ciliatissime

Se ne seguono visibili di tronco, che porta alla cima con gruppo di 25 foglie ciliatissime
cavate in forma liscia larghe null. 14-20 lunghe al più cm. 35 attese ^{gradi} ^{cm. 35} a tempo non ancora fiorite
e leggermente rosate, le foglie ^{gradi} ^{cm. 15-20} in parte estenuata ^{gradi} ^{cm. 10-15} sono visibili. I gradi
di grande rispondente sua con alcune specie d'aloe corrispondenti ^{gradi} ^{cm. 15-20} ^{altezza}
Alloe floribente, mi perdonate a riportare al genere d'aspetto, le quali si trovano
le piccole frutti non altro avendo un genere che lo rappresenta. Tal genero
dovrà chiamarsi Aloitex

Folia elongata linearis lanceolata imbricata confusa e basi concava apice lineata plana,
margini dentato-^{gradi} ^{cm. 1-2} ^{altezza} ^{gradi} ^{cm. 1-2} ^{altezza}, striis longitudinalibus numerosis
rectitudinibus rarus parallelis tenuebus, fructus simplex cylindricus, irregulans
rugosus, circinatus numerosis -

sp. Aloitex italicus Vis.

Hab. cum precedente.

Padova 1. Febbr. 1869.

Index plantarum in Boemia a. 1848 collectarum a
cum plantis in Mares Moravensis servatae

Sect. nr.

Plantaginaceae

Plantago lanceolata L. Dolz, Dravnik, Vlastich

— *media* L.

— *maritima* L. *p-ciliata* Koch Berger-Bog., Kulta ad Suja

— *canceolata* L.

Oenaria dentata Pers. m. Prolog.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L. Staphys ssp. *Balkarii*, Mali Sandik, et ssp. *Balkarii*

montana L. a Sutynska ssp. *Miane* prope Borovica

triploifolia L. Vlastich ssp. *Balkarii*

Pedia dentata Pall. var. *laciniata* Koch. a Dravnik ad Buchovice, Haus Dellaing, et prope Sutynska

— *acriula* D. L. *p-laciniata* Koch a Dravnik ad ssp. *Vlastich*

— *carinata* Loir a Vraňany ad Šebliche, a Novářich, Dobří, Katorška vesp. ad
a Pašina Konak ad Dobřípolce vesp. ad Vraňany, et ad Dravnik Totsche

Dipsacaceae

Scabiosa caucasica Desf. Beg. ex. ^{rigida} Vlastich, Vlastich vesp.

— *hirsutissima* Brot. Beg. - Beg., Kulta, et Šeja, Vareš, Vlastich ssp. *oversetosa*, ^(rigida) *oversetosa* ⁱⁿ

Vincetoxicum hirundinaria L. vesp. *versicolor* Koch Suja vesp. Borovnice, et ^(rigida) *rigida* ad Číčov.

— *versicolor* Codd. Šenovia vesp. *halocina* vesp. ad Sutynska, Prolog.

— *sylvatica* Dub. ssp. *hirta* vesp. ad Koprnicka, et Sutynska

— *longifolia* Koch Borovica

Compositae

Astragalus alpinus Reichenb. Mali Sandik, et ssp. *Balkarii*

Potentilla alba Scop. Šeja a Žižkova ad Dravnik, m. Vlastich vesp. Borovice

Pentaphylloides fruticosus L. Vraňany vesp. Šenovice et Šebliche ad Dravnik, Vlastich ^{versicolor} *Balkarii*

— *alpinus* L. Mali Sandik, Vlastich, Dravnik

Bellis perennis L. Scopia, Paličkovice, Šebliche, Lubina, Dobřípolce ad Vraňany

Solidago Virgaurea L. vesp. *alpina* Koch. Vlastich, Mali Sandik, Velká Račov, Dobříšskému

Štola *lignosa* L. Prolog.

— *canescens* L. Prolog.

— *medicinalis* Bieb. Buchovice v. agns

— *histo* L. Vareš, Šavniště ad Šemnickovážan

— *Crinita* Christi L. Beger-Beg., Kulta ad Šeja, Borovnice, Číčov ad Číčov, Prolog.

Buphthalmum salicifolium L. Dravnik ad Šenovice m. Vlastich

Veltheia spinosa Boiss. Borovice vesp. *montana* Ponikov ad Vareš - Žurintan, vesp.

— *Kiseljek* Lepčenka ad Žižkova, inter Dravnik et Šenovice

Anthemis arvensis L. Prolog., Dravnik ad Vlastich, Ebenádka, Vareš et alibi

— *tinctoria* L. Dravnik ad Šenovice et a Žižkova m. Vlastich

Picris hieracoides L. Dravnik ad Buchovice, Vlastich, Mali Sandik, Velká Račov, et alibi

— *Medikofolia* var. *racemosa* Koch et Šenovice vesp. *Kalocina* ad Sutynska

— *rotundifolia* L. et Dravnik ad Buchovice, et Haus Dellaing, Beger-Beg., Kulta, Šeja

— *ligulata* K. Koch Vlastich vesp. *Balkarii*, Šenovice Mali Sandik, Velká Račov et alibi

- Matriaria inundata* L. Sierpiwo ręgi Borowagliava, Kętka Grawa ad Nienicka
Matriaria Chamomilla L. Trawnik Sierpa Borowagliava, Czirr ręgi ad Livo
 Pyrola minor L. wąsakówka W. a Genicja ręgi Kaligium węge ad Sutyska, Trawnik ad Livo
 Aegopodium podagraria L. Trawnik, Ułapie
 Pyrola minor L. Borowagg, ręgi m. Ponikwa ad Warszaw, et Polonia
Chrysanthemum Leucanthemum L. Ułapie, ręgi Boklari, Trawnik, Czirr, ad Sutyska et alii
Artemisia Abrotanum L. a siedla ad Borowagliava, a Czirr ad Livo
Enophaelis diocia L. Ułapie, ręgi Boklari
Pilea germanica L. Hairs. Polana, gosp. Trawnik
Dominium cordifolium Scop. Ułapie, et ręgi Boklari et Breszcz
 — austriacum Jacq. Borowagg ręgi m. Ponikwa, Rzadz ad Warszaw
Anemone spathulata Gaertn. Ułapie ręgi
Anemone nemorosa L. Boklari et Breszcz
Senecio nemorensis L. ręgi Wk. Boklari ręgi Trawnik
 — ręgi rynaly kit(?) a Trawnik ad Boklary,
 — umbrosus kit inter Trawnik et Ponikwa
 — Jacobea L. Trawnik
Ethiopis phoenicea L. ad Turmietka ręgi Kętka et Legnicka, ręgi ad Trawnik
Hennionia cylindrica L. Genicja ręgi Kalocin ad Kętka
Carex acutiformis All. Borysz. Bieg, Kętka ad Sierpa
Centaurium officinale L. Sierpa ręgi Borowagliava, Czirr ręgi ad Livo
 — certophyllum Desv. id. Ponikwa ręgi Kaligium Breszcz
 — exaltata B. Carex desv. Hott. Ułapie ręgi Boklary
 — calciphila W. idem et ręgi ponurki ręgiem Czirr ręgi Breszcz
 — williamsii W. Ułapie, Mała Sandek, Ulica Darsen
 — stricta W. a Trawnik ad gosp. Trawnik
 — Cyperus L. a Ułapie ręgi Boklari
 — Junc L. a Trawnik ad gosp. Trawnik
Congea vulgaris Pers. Rzadz ręgi Borowagliava, et a Czirr ad Livo
Centaurium Leichtlini L. Trawnik
Heuchera Serratifolia L. ad Czirr ręgi Kalocin ręgi ad Sutyska.
Lappa communis L. Ułapie, Trawnik gosp. Genicja
 ? Carduus collaris L. a Trawnik ad hajce
 — arachnoides L. ręgi ad Boklary, m. Ułapie ręgi Boklari
Cirsium arvense L. Mała Sandek, ręgi Boklari, et ad Breszcz
 — arvense Scop. Ułapie ręgi Boklari
 — paniculatum Kit. Ułapie ręgi Boklari
Ceratodon purpureus L. ręgi Sutyska ad Kętka
Succowia mollis DC. Ułapie ręgi Boklari, Sutyska, Sierpa ad Borowagliava, Czirr ad Livo
Apolinis fructus L. a Maglar ad Monach et Dobos
Cichorium intybus L. Trawnik ad gosp. Ułapie
Hypochaeris maculata L. Trawnik ad Samochowice
 — divaricata L. Trawnik ad Hairs. Polana, et Genicja
Leontodon saxatilis L. Boklary ręgi Sutyska, Sobole, Lubin, Dol. Czirpka gosp. Krasnik
 — incanus L. Sierpiwo ręgi Boklari

Leontodon hispidus L. in Ceniza ssp. Kotschiesi usp. Sutynska.

Vlastich, Tugra Oreschay

hispida var. intermedia Boiss.

Drymocallis prolata L. in Ceniza ssp. Kotschiesi usp. Sutynska

undulata Jacq. p. orientalis DC. ssp. ssp. Borzogluwa, et ad Cisj ad Cisjana

varifolia L. Vlastich ssp. Oreschay, in agri ad Bokovica

Polygonum hybridum B. gmelini ~~Hoffm.~~ Wallr. ssp. Baklari ⁱⁿ Sutynska

rosea Whit. idem.

Gilia ssp. *Capo Begir-Beg*, kulta usp. Sieja

Pink himalayensis Ceniza ssp. Kotschiesi usp. Sutynska

Sordidus ssp. Vill. ad Varesch, Savniethel, Semishovatka Traunick ad pedem Vlastich

Mutzedium alpinum Tass. Mali Sandich, Baklari, ssp. Sutynska usp. Kotschiesi

Dianthus officinalis L. ad Prusac, Traunick usp. Bokovica

— — Ecorchum Koch Traunick, Bokovica

— — ~~x~~ alpinum Hope Tongtien

nigricans Kit. alpinum Hope Kotsch., ssp. Baklari

Penstemon nemorosus L. (Birkengroß) Wunduk ssp. Gratiotii, et ssp. ssp. Sieja ssp. Borzogluwa, et Cisj ad Livno

Bokovica-felds. L. Traunick ad ped. Bokovica

— — Ictero L. illin et Ceniza ssp. Kotschiesi usp. Sutynska et aliis glauco

Cryptomeria Jaceph. Tellaius

Hemicordia flexuosa Willd. Prologh, Ceniza ssp. Borzogluwa, et Cisj usp. Livno

— Nestler Vill. p. hispidum Koch Vlastich, ssp. Bokovica

— posture Jaceph. Tellaius ssp. Kotschiesi et Ceniza, usp. ad Cisjana

— gracilior Koch Vlastich ssp. Baklari, Ceniza ssp. Kotschiesi usp. Sutynska

— pallidior? (sic?) Mali Sandich, et ssp. Baklari

— Coccophyllum Koch Mali Sandich, Vlastich ssp. Sutynska

— pilosum L. Mali Sandich

— Petrosella L. Bokovica, Ceniza ssp. Kotschiesi usp. Sutynska, a Tuginttan usp. Kotsch., Traunick ad montem Starosc

— Apium L. Traunick in Roth

— Cicerbita Bieb. Traunick, Tellaius Ceniza ssp. Borzogluwa

— mucronatum B. incisum Hope in agri usp. Bokovica

— mucronatum L. Sutynska

Succowia montana Monn. Vlastich ssp. Baklari, Oreschay

Campanulaceae

Campanula rapunculus L. Traunick

— Rapunculus L. Ceniza ssp. Kotschiesi usp. Sutynska, a Varesch, Savniethel

— rotundifolia L. Begir-Beg, kulta usp. Sieja

— pectinata L. Ceniza ssp. Kotsch., Savniethel, Borzogluwa usp. Bokovica-Kotsch., Mali Sandich

— foliosa Raus. Traunick

— perfoliata L. Traunick ad ped. Vlastich

— lingulata Kit. Vlastich, Traunick ad Ceniza, Sutynska Varesch, Savniethel, Semishovatka

— glomerata L. Prologh — var. spicata Horn. Baklari ad Vlastich

— Vaseyi Roth f. 12 - a Grodner ssp. spicata usp. Vlastich.

Campanulaceae

Edraianthus kotschoubieanus D. Vriesius ssp. *balkanicus*, et *orientalis*, Meli Sandich, Veltke
graminifolius L. a suja regis Borovaglava, a Giro ad Lione, Sibylle
ssp. *balkanicus* ad Borovaglava

Specularia speculum Hort. Traubell bei Genf, Tschingg ssp. *borsigiana* prostrata et alba
Phyllum Pictum L. Vriesius ssp. *balkanicus* et *orientalis*, Meli Sandich

— *obtusatum* L. Vriesius ssp. *balkanicus*

— *spicatum* L. Tschingg ssp. *borsigiana* usque Tschingg, Vriesius usque Balkan

— *lanceolatum* a suja ad Borovaglava, Giro ad Lione

Rubiaceae

Jalica Apennina L. Sibylle usque Poljane usque ad Borovaglava, Tschingg ad Tschingg.

— *turcica* Lag. Vriesius ad Balkan, a Monast ad f. Vriesius

— *veronica* Stev. Tschingg usque Biela ad Gradecie, Tschingg bei Schrebe, Maglae ad Monast, et Tschingg, et alibi

— *cruciata* Stev. Tschingg prope Schrebe Tschingg prope Balkanica et alibi

— *pedunculata* All. Ebensteiner, Gurzow, Vriesius ssp. *balkanicus*, Tschingg et Vriesius et ^{et} Balkanica.

— *polystachya* L. Tschingg in hosti, Tschingg ad Sibylle

— *purpurea* L. Varesch, Saviothel usque Samischovazhan, suja, Borovaglava, et Giro ad Lione

— *taidana* All. In aplo ad Balkanica, Varesch, Saviothel, usque Samischovazhan, Varesch ad Balkan

— *Mollugo* L. a Monast et Vriesius, et Tschingg

— *aurum* L. a suja ad Borovaglava, a Giro ad Lione

— *bona* L. Begir-Beg, Kulta usque Kiro

Ageratina edentata L. Gradiška usque Tschingg usque Tschingg

— *cyathophylloides* L. Tschingg ad f. Vriesius, Vriesius ad Gradiška

taurina L. Maglae usque ad Monast, Doboi, Tschingg, Vriesius ad ^{et} Balkan et alibi

longiflora Kit. Sibylle ad Kopitnij, Prolog, Varesch usque Balkan

arvensis L. Vriesius usque Balkan —

Thessalonia annua L. idem

Solanaceae

Lycium europaeum L. Vriesius usque Balkan

— *Hydrophyllum* idem

Vitex agnus-castus L. inflor. mōst. idem Tschingg usque Gradiška et Biela usque Tschingg

— *Oxybelis* L. a Varesch, Saviothel usque ad Samischovazhan

Sambucus racemosa L. Vriesius usque Balkan

Oleaceae

Ligustrum vulgare L. Tschingg

Kirovgrad Biely L. Tschingg usque ad Balkanica, m-Vriesius usque Balkan

— *excelsior* L. a Monast ad Doboi, Kotor, usque ad Tschingg, a Gradiška, Špička, Špička ad ^{et} Balkan

Apocynaceae *Vincetoxicum* L. Tschingg, Vriesius, usque Gradiška

Vincetoxicum L. in aplo ad Balkanica, Tschingg, Vriesius, usque Gradiška et ^{et} Balkan

Gentianaceae

Gentiana lutea L. Tschingg usque Gradiška et Biela, usque Tschingg Vriesius usque Balkan

— *reticulata* (angustip.) Poem. et al. idem, et idem

— *achillea* L. Borovaglava, Vriesius

— *occidentalis* L. Vriesius usque Balkan

— *lutea* L. suja usque Borovaglava, et Giro ad Lione

Gentianaceae

Menyanthes trifoliata L. a Voinjy rupr. Borsat, Vilem., rupr. Tsvant.

Labiatae *Sylvia glutinosa* L. a Gruber, Spicijevi, rupr. Tsvant.
— *verbenacea* L. a Tsvant ad pedem Vlasic

— *rotundifolia* L. a Berger-Beg, Kulta et rupr. Sija

Thymus vulgaris L. Vlasic rupr. Orsak et Boklari

Satureja montana L. a Toma rupr. Borovnjaca, et Cvet ad Livno

Metaphysciae Benth. idem et Vlasic rupr. Orsak, et ad pedem montis
alpine Benth. Tsvant ad ped. mont.

Castilleja Benth. in agro ad Boklari

Prunella alba Pall. p. pauciflora Tsvant ad ped. m. Vlasic, Tellaric ^{ad canum}
— *vulgaris* L. a Vlasic ad Savineth rupr. et Samishevachan

— *grandiflora* ^{var.} L. bego-Beg, Kulta, rupr. Sija

Scutellaria peregrina Beg. Guicciard. Cenija rupr. Kalacija rupr. Lukavica

Glechoma hederacea Bge - Dolar Hause Telleric.

— *virginiana* Wh. Kit. Tsvant ad Boklari et Cenija

Neglecta var. L. Prolog. a Vlasic ad Savineth rupr. Samishevachan, Hause Telleric
Sija rupr. Borovnjaca, et Cvet ad Livno

Melittis grandiflora L. Hause Telleric, Guicciard. Vlasic rupr. Boklari, Borovnjaca
Goloborac between thud. Parcien Konak rupr. Sandrovic, Lebice, Lubine, Dobrijevo
Lamium maculatum L. Boklari rupr. Tsvant ^{Vlasic}
— *purpureum* L. idem

Betonica officinalis Tsvant

Stachys alpina L. Tsvant, Vlasic rupr. Boklari

— germanica var. pectinata Guss. ad. Subyanki

— *phytolacoides* Ten. Sija rupr. Borovnjaca, Cetin ad Livno, Prolog

— *satureioides* R. Prolog. Sija rupr. Borovnjaca, Cetin ad Livno

— *recta* L. Tsvant rupr. Cenija, Hause Telleric

— pubescens Ten. Guicciard. ad Boklari, Subyanki rupr. Poljane ad Borovnjaca

Marshallia purpurea L. Sija rupr. Borovnjaca, Cetin ad Livno, Prolog

Dennstaedtia Bge L. Tsvant ad pedem Vlasic

— *Chrysosplenium* L. inter Boklari et Tsvant

— *montana* L. Vlasic ad Orsak

Oxyria reuteri L. Guicciard. Spicijevi ad Tsvant. Tsvant

— *guerneensis* L. Guicciard

— *Chamaesyce* L. Prostokwiat rupr. Sandrovic, Lebice, Lubine, Dobrijevo et alibi

Verbenaceae

Verbena officinalis Guicciard ad Subyanki, Vlasic ad. Cenikay rupr. Samishevachan

Globulariaceae

Globularia vulgaris L. Guicciard ad Subyanki

— *odifera* L. Vlasic rupr. Boklari, in agro Boklari

Apocynaceae

Ceratina minor L. Magyar ad Karavich, Doboi, Vlapis ad Orestes
Oenothera luteola L. Trinick ad Bokorija, Vlapis ugor Baklan et Czepka
— whorlii L. Bajer-Bog, Kelle ad Szegez
Quinchia aurea Scand. Magyar ad Karavich et Doboi
Molophilus summa Bork.

Ethiaca vulgaris L. Borovia

Polygonum officinale L. Scapae, inter Schubke et Magyar

— mollis W.L. Wimark ad Schubke, Magyar ad Karavich et Doboi, Trinick
sugra Priske ad Zselza

Lithospermum officinale L. Guicciardii Trinick sugra Priske ad Schubke, Trinick ad Bokorija
— angustatum Trinick ad Bokorija

Ranunculus officinale L. f. glaucus Trinick, Hora, Tschirch, ^{2 pd. Vlachy} Sugra Kalocsia ugor ad Szegede
— Borsigiae L. Bajer ugor Baklan, Sugra Borsigiae, Czeg ad Lungs

Hypoxis alpestris Schrad. Trinick ad Bokorija, Vlachy ad Baklan et alibi

— spathacea Bajer, Trinick prope Schubke, Trinick sugra Priske ad Schubke et alibi

— intermediata L. Trinick ad Bokorija et prope Csajko, et ugor Baklan

— hispida Schlecht. a Grindelia, sugra Gjergja et Schubke, Trinick et alibi

— versicolor Schlecht. a Pastinakonek ugor Bajer, Schubke, Trinick et alibi

— quinquefolia Willd. a Gjergja sugra Kalocsia ugor Szegede, a Borviga et Vrash

Sympathyrum latifolium L. Trinick, Schubke, Trinick, Magyar, Karavich, Doboi et alibi

— officinale L. Gjergja sugra Kalocsia ugor Szegede

Cynoglossum officinale L.

Comandra umbellata W.Kit. a Gjergja sugra Kalocsia ad Szegede

variegata Borovia

Ceratomea canescens L. Trinick, Szegede

Solanum dulcamara L. Schubke, Savitch et Samischovszky.

Solanum Dulcamara L. Schubke, Savitch et Samischovszky.

Datura Stramonium L. Trinick et pedem Vlachy

Hippocratea nigra L. a Trinick ad Bokorija

Phytolacca Atropurpurea (Gjergja sugra Kalocsia ugor Szegede)

Sympetalineae

Veronica persica W.K. Trinick ad ped. Vlachy

— Blattaria L. Trinick prope Gjergja

— Lychnitis L. Bokorija

Amphibolium Scoparia Hoffm; a Tschirch prope Kirchbach, Legenica ad Gjergja, Vrash, Malo-
jewo, Tschirch ^{Tschirch et alibi}

— rotundifolia L. Trinick prope Gjergja

Gheretelli (A. Mayr. Trinick (equatica?)

laciniate W.K. Szegede prope Poljan prope Borovica

canina L. Bokorija, Trinick ad Bokorija

Linaria vulgaris Hilt. Trinick

minor Desf. a Gjergja sugra Lipjan, Robilnoglavu ad Ruffintan

Onobrychis brontes L. Hass & Tellinger

Digitalis grandiflora L. Drorwijk ad Haas Tellais, ad Vlaafij, Ossenhoek
varius spicata L. begin-Bij, Kelen ad Siega

— annua L. Drorwijk, fabrik Drorwijk d'Heikens

— Chamaedrys — Drorwijk ad Bokhove

— agrestis —

— angustifolia L. Gosselijnen, Geijster ad Bokhove

— austriaca L. — Vlaafij, Metz Sandrik, Oudeke Paven

— latifolia L. Gosselijnen Kotschin ad Latynska

— sativella L. begin-Vlaafij, Metz Sandrik, Oudeke Paven

— partitella L. Prinsen tegen Bokhove, Nieuw ad Drorwijk

— Buxbaumia? non Boissie Bokhove ad Drorwijk

Hedera helix L. — et Gradenkij, et spicata ad Bokhove

Baardgras? Gradenkij spicata ad Bokhove, Ettenheim

— superba L. Gradenkij Bokhove?

Cymbalaria muralis Brusse?

— officinalis L. Bokhove tegen Bokhove enkele Tadde

— uliginosa L. Drorwijk, Haas Tellais

— angustifolia L. Ettenheim

Pedicularis verticillata L. Vlaafij tegen Bokhove

Hartgras? ssp. galloapenninae acetosa integrifolia

nov. sp. g. b. L. spec. dentata salicifolia? angustifolia, tuba ex recto, dent. lab. superius abtruncata nec rotata ^{ut papa} Vlaafij tegen Bokhove.

Lemmon ssp. Vlaafij tegen Bokhove

flexuosa L. Vlaafij tegen Bokhove

Rhinanthus minor Drorwijk Bokhove tegen Drorwijk

— — angustifolius Drorwijk ad pedem Bosdries

— Rhinanthus pall. Drorwijk, Haas Tellais

Scleropodium polystachyon

— eriostachys } Drorwijk grot (renissa?) ad pedem Vlaafij

— barbatum Drorwijk gegen Bokhove

— nemorosum L. Varsch, Saviescher ad Semichovskien

— cylindricum Varsch, Metz Sandrik, Oudeke Paven et alibi

Brassicaceae

Brassica nasturtium L. a Genippe ad Bokhove

Orobanchaceae

Orobanchus laticaulis 1336 Borovogla

1336 b) 1780 Vlaafij, Ossenhoek

2169. ssp. rugosa Borovogla, Giel ad Liven

1731 ssp. Medicago Drorwijk gegen Genippe

1413. id - subcaulis Wallr. Varsch ad Semichovskien

1599 aut. Caudex procta Koch? Drorwijk ad ped. Glasnig

1233. 1515 auf Quibus? Genippe gegen Bokhove

Orobanchus Salviace 1798 Vlaafij ad Ossenhoek

— Caryophyllaceum 1730 Schult. Drorwijk Genippe, Kotschin vel by Tafjinska Varsch

— Galii? 508 Drorwijk ad Bokhove, L. v. v. Gosselijnen, ad Galium Bokhoveij, Vlaafij, Ossenhoek

Bromaceae

Lathra squamaria L. Tavnik, Biela, Gradište

Primulaceae

Corydalis cornuta L.

— venosa L. Tavnik, Biela, Lepenje grove Tavnik

Centauraea leucanthemoides L. Vlasnik ad Bercher, Karas, Malo Sandik, Velika Pavon

Lychnis mucronata L. var. suaveolens vspf Kelpinski

— mucronata L. Tavnik vspf Kelpinski et Lepenje grove Tavnik

Potentilla argentea L. Biokovica grove Tavnik

— gracilis Bert. idem et idem

Modicella alpina L. Vlasnik ad Orsch et Baklari, Malo Sandik

Antennaria officinalis Willd. Vlasnik ad Orsch et Baklari

Vaccinium myrtillus L. Vlasnik ad Baklari.

Erica carnea L. ab Orescu ad Kirogak, Tuna, Berg Bodolovo vspf Parkia Konak

Hoppea ad Orsch

Calluna vulgaris Solist. Tavnik, Biela et Maglae.

Umbelliferae

Seseli europaeum L. Biokovica

Astrantia major L. Vlasnik vspf Baklari

Eryngium smyrniifolium H. Beyer-Beg, Kubla vspf Kubla

— campestre L. vspf Kubla vspf Kelpinski

— alpinum L. Vlasnik ad Orsch, Baklari, Malo Sandik, Velika Pavon

Drimia salsifolia DC. Vlasnik, Malo Sandik, Velika Pavon

Carum carvi L. Biokovica, Tavnik in horstig

Pimpinella saxifraga L. Vlasnik ad Orsch

divisa Bge Tavnik grove Tavnik

Bupleurum gibbosum Pay. Biokov

— tenuissimum L. Vlasnik ad Orsch

— anisopterum Bge Biokov

— rotundifolium L. Cernive vspf Kalocsin vspf Kelpinski

Renouardia pedunculata Tavnik, Vlasnik

— paniculata DC. Cernive vspf Kalocsin vspf Kelpinski

Scandix

974

763, 1735-1836

Ceratostigma Varsch, Savnitche ad Samistowatzhan
Sibirskij montana? Vlasnick vspf Baklari

Athamanta cretensis L. idem et Vlasnik, Malo Sandik, Velika Pavon

Argemone Poterioides L. Vlasnick ad Baklari

Nasturtium officinale Beg. idem et Kelpinski

Athamanta monspeliensis Biokov

Papaver somniferum L. Tavnik

Laserpitium latifolium Tavnik ad fedon Biokov

— marginatum Kit. Vlasnick vspf Baklari, Malo Sandik

— arachnoides Wolf idem idem

- Osmundaceae - *Osmunda cinnamomea* L. ssp. *europaea* Vries ad Borkovi ad Salgatka, Borovs¹⁹⁰⁴
 ssp. *orientalis* ad Ovocok
 — statum Tacy. ssp. rugosa Borowoglava, Cicer ad Cene.
- Anemone nemorosa L. a Borkovi ad Tramik, rugosa Biela ad Gredziek, ad Orefice
 Kielgat, Denic, Petelov, et Pashkin Korot et alibi.
 — nemoralis et Orefice ad Pantin Korot, Denic, Biela, Gredziek
 Hepatica triloba Chie Persaez
 Adonis asteroidea L. Vlasiev ad Baklan, Genija, Kalocsia, Ketyntka.
 Hemerocallis cyathiformis Schmid, Prok'ad Tula, Denic, Haas Tschirch
 — minima L. ad Orefice, Kielgat, Denic, ssp. Petelov ad Pashkin Korot
 — annua L. Vlasiev ssp. Baklan
 — Thun L. id id
 — montana L. id id var. hirsutifolia Steffens ad Oreszad
 — acutilobata L. Borovs, ssp. m. Ponikta, ssp. Verush var. g. Steffens ad
 — versicolor Orel — id id Steffens ad Oreszad
 — avul L. forma alpina unicolor Steffens ad Oreszad
 — foliifolia L. id
 — luteo-purpurea L. Vlasiev Doboi, Kotovska prope Totska
 — bullosa L. Genija, Kalocsia, Ketyntka et alibi.
 — sepius L. Guergiagora et Tschirch?
 — auricoma L. Vlasiev, Doboi, Kotovska ad Potocka
 — var. alpina pumila Vrancik, Gredziek, Biela usque ad Morav.
 Plantae ruminantiorum Borovs, Kotovska, Doboi ad Potocka et alibi.
 Calluna palustris L. Vrancik ad Schreber, Guergiagora, Vlasiev ad Baklan
 Drosophyllum europeum L. Vlasiev ad Baklan
 Helleborus odorus White Presse Scopio, Borkovi ad Morav.
 — stramineus 189 Vlasiev, Doboi, Kotovska ad Potocka, Morav, Vlasiev prope Doboi
 — multijugum 1904 Steffens ssp. Borowoglava, Cicer ad Lince
 Dryopteris filix-mas L. Borkovi ad Morav, Vrancik ssp. Gredziek et Biela
 Dryopteris marginalis L. Vlasiev ssp. Baklan, ssp. Oreszad, et ssp. Baklan et alibi.
 Delphinium hybridum W. Blattfisch ad Oreszad
 — Cassottii L. Vrancik ad ped. Vlasiev, et ssp. Baklan
 Aconitum lycoctonum L. Meli Sande et ssp. Baklan
 — integratum Steffens ssp. Baklan
 Cetaria spicata L. 1920 Steffens ssp. Baklan
 Berberidaceae - *Epimedium alpinum* L. Borkovi ad Morav, Vrancik ad Totschayev, Seltschick
 Pagaroniaceae *Chelidonium majus* L. Majlád ad Morav, Doboi, Dolac et alibi
- Corydalis ochotensis
 — tenuis Dr. J. Vrancik ssp. Kielgat, ssp. genjua ad Tschirch
 — tenuis Schr. Vrancik prope Schreber
 — solida Son. Morav, Haas Tschirch, Vrancik ssp. Gredziek, et Biela
- Dianthus barbatus L. a Morav et Borkovi et alibi
 — Vaillantii Loj. Vlasiev ad Oreszad
 Papaver Rhoeas L. Morav ad Borkovi, et ad ped. ad Steffens -

Cannabaceae *Cannabis sativa* L. Vlasiev rupr. Bakken, Tsvetnik ad Vlasiev

Betula grandiflora L. Bokoviz

Dipsacus fullonum L. Vlasiev rupr. Bakken

Doronicum austriacum Grub. rupr. Svetozar rupr. Kozulinijev

Bistorta officinalis L. Bokoviz, Vlasiev ad Bakken et alii.

tauricaformis Bokoviz, rupr. Svetozar, ad Tsvetnik, Tsvetnik ad Bokoviz et alii.

laevigata 871 /

a novitate Bokoviz 86 Bokoviz

Stachys officinalis

et var. glabra Vlasiev ad Vlasiev et ad Vlasiev

lychnitis Hoffm. Haas Tellierich, Vlasiev ad Bakken

Chamaephyllum auratum L. Vlasiev ad Bakken, Varesch, Tsvetnik ad Kuznetova et alii.

linophyllum var. glabrum Eberhardtin, Varesch

balticum Bokoviz, Kolesov, Kuznetova

temulum Vlasiev ad Bakken

Polygonum odoratum L. idem Tsvetnik ad Gennijo

Heuchera austriaca Huds. Borovička rupr. mont. Počekan, Varesch

↑ *Tinguevia perfoliata* Mill. Tsvetnik rupr. Svetozar et Vlasiev ad Tsvetnik, Bokoviz

Bistorta vivipara Gennijo rupr. Kolesov rupr. Kuznetova, Tsvetnik ad Olegius

Araliaceae

Hedera Helix L. 163 Maglar ad Tsvetnik, 8.601

Adoxa moschatellina 1023 Vlasiev ad Bakken

Angelicaceae

Vitis Labrusca 258 Svetozar rupr. Svetozar var. ssp. sylvestris ad Tsvetnik

Cornaceae Cornus mas L. 39 Bokoviz ad Tsvetnik

— sanguinea Vlasiev rupr. Bakken

Loranthaceae Loranthus europaeus L. rupr. Gremillion ad Cepins ad Kuznetova, rupr. Bokoviz
Piper album L. Litske Schleicher et Maglar rupr. Kuznetova-Kost.

Crassulaceae Sedum sexangulare Bokoviz

— emarginatum Tsvetnik rupr. Kuznetova et Lepesne prosp. pionirov

— capense idem idem

— dasyphyllum Mati Sandich, et rupr. Bokken

— obtusum Vlasiev, Mati Sandich et Volko Tsvetova, Debetskij

— mucronatum Tsvetnik

— album Tsvetnik

— hispanicum idem

Taxifoliaceae Chamaecyparis alternifolia Eberhardtin, Vlasiev rupr. Bakken

Saxifrage Caprifolium rupr. Kuznetova rupr. Polycarpus prosp. Borovička, Vlasiev ad Tsvetnik

— Crataegus monogyna rupr. Tsvetnik ad Bokken et alii

— Crataegus monogyna Koch — — Tsvetnik ad Bakken et alii

— cornuta Tsvetnik — — Vlasiev ad Bakken, Haas Tellierich

— thunbergii Tsvetnik, Bokken, Tsvetnik ad Bokoviz

— officinale var. minor Koch. Svetozar ad Kozulinijev, Vlasiev ad Bakken

— tridentata L. Bokoviz ad Tsvetnik, Dolay

Rubiaceae Rubus ulmifolius Vlasiev ad Bakken, Mati Sandich rupr. Volko Tsvetova

— polonica Wulf. Steyer ad Bakken, Mati Sandich rupr. Volko Tsvetova

— Grossularia L. Vlasiev ad Gennijo

Rhamnaceae Clematis vitalba Vlasiev rupr. Bakken

Staphyleaceae

Staphylea pinnata Mayr., Moravie, Dobříš

Celastrinaceae

Gymnosporia europaea Cogn. ssp. *Kalocin* ad Sutynsko

varius Dravnick, Těšovice, Sutynsko ssp. *Polyana* prope Horovice

Rhamnaceae *Ribes alpinum* Vries ad Bakšan. Malé Sandec.

cathartium id.

saxatilis id. Sutynsko ^{ad} ^{ed} *Polyana* et Horovice, Dravnick a
Vlčkovice id.

Euphorbiaceae *E. Cyparissias*. Moravie, Dobříš, Klobouky ad Dobříš

— *rotunda* Cogn. ssp. *Kalocin* ad Sutynsko a Táborian ssp.

— *salicifolia* Host. *leptophylla* ssp. *Lobijana*, Klobouky ad Dobříš

— *platyphylla* Vlčkovice ad Bakšan, id. Moravie, Dobříš, Klobouky ad Dobříš et obec.

— *angustifolia* idem ^{et} *Dravnick*, ^{et} *Klobouky* Vlčkovice ^{et} *Bakšan* et obec.

— *epiphyllum* idem ^{et} Moravie, Dobříš, Klobouky ad Dobříš et obec
Vlčkovice ^{et} *Bakšan*

— *Cyparissias* Moravie etc.

— *angustifolia* Dravnick ad Bakšan, Švýcary

— *carinata* ab Oupřiv ssp. *Klobouk*, Tábor, m. Přelouč ad Lázně Bohdaneč

— *myrsinoides* Vlčkovice

Muricaria pinnata Vlčkovice ad Orlick, Sutynsko

ovata Dravnick ad Bakšan, Vlčkovice ad Bakšan

Myrsinaceae *Nigra* Vlčkovice ad Bakšan

Anacardiaceae *Phillyrea* Dravnick ad Bakšan

Dioscoreaceae *Dictyosma* Dravnick ad Sutynsko

Serruriaceae *Erodium cicutarium* — Scopio, Dravnick ad Bakšan, Těšovice ^{et} *Vlčkovice*
Serrurium nobile Dolní, Černá voda ad Dravnick

Phaeum Dolní, Těšovice ^{et} *Černá voda* ad Dravnick ^{Dobříš} *Staphylea*

Obioneum Černá voda ad Dravnick, Vlčkovice ^{et} *Černá voda* ^{obioneum}

Sanguineum Černá voda

P. trichotrichum Vlčkovice ^{et} *Černá voda* ad Bakšan, ad Orlick

pyrenaicum? Vlčkovice prope Orlick

Munieri Bakšan

difforme Vlčkovice

Linaceae *Linum catharticum* Dravnick prope Černá voda

tenueifolium ibid. Černá voda ad Sutynsko

flavum Černá voda ad Sutynsko, ssp. *luteum* ad Kralovice

viscosissimum ibid.

- Lineae L. perenne Begir-Bz. Kultiv varif. hirsuta
 — capitanum — Vlasov ad Boklan
- Oxalidaceae O. acetosella Vandek prop. Lebedeva, Vlasov ad Boklan
- Benotheraceae Circaea lutetiana super hiemata veget ad Kozintsev
 Epilobium trigonum Willd. Vlasov ad Boklan, Mati Sandrik
 — montanum Tschitschian super Kozintsev et Ligunov ad Pionovsk
- Lythraceae L. salicaria Monnik ad fructuosa tomatis
- Ponaceae Cydonia vulgaris Vandek prop. Grindelkova et Bjela
 Pyrus malus L. inter Lebedeva et Maytzev, a Monnik ad Boklouw
 — communis inter Lebedeva et Maytzev a Grindelkova ad Kozintsev
 — amurensis Lebedeva, Savniatkin, Samisch vaskava
- Sorbus aria L. Vlasov ad Boklan
 — domestica Vlasov, Mati Sandrik, Vrleka prava
 — amurensis a Pavlinkovsk 100% Savniatkin, Lebedeva et alii
- Amelanchier vulgaris a Monnik ad Boklouw
- Cotoneaster vulgaris Gurjewson
- Crataegus monogyna Pavlinkovsk super Sandrov et al. Vlasov ad Boklan
 — pyrifolia Grindelkova super Spivakoff ad Kozintsev
- Rosaceae R. pumila (L.) (swartz) Vlasov ad Boklan, et Boklan
 — pumila idem
 — alpin L. var. pyrenaica idem
 — canina Czerny ad Satyske, et Doruff ad Monnik
 — gallica Monnik ad Czerny
 — armeniaca idem
- Rubus saxatilis L. Mati Sandrik, Vrleka prava
 — itacina Mati Sandrik
 — caesius Czerny prop. Monnik
 — hirtus Willd super hiemata veget ad Kozintsev
 — thaytorides Wimmer idem
- Prunus cerasifera Sch. Vandek prop. Lebedeva, Vlasov ad Boklan et alii
 collina Sch. idem Vlasov etc. et alii
- Rosa L. Vandek prop. Lebedeva, ab Bujino ad Pavlinkovsk et alii
 Potentilla micrantha Leon. Vlasov, Boklouw, Pavlinkovsk, Lubin
 alba L. Vandek ad Lebedeva
 — idem Maytzev ad Kozintsev, ab Bujino ad Pavlinkovsk
 Clematis serrata ad Boklan
 cuneata idem

- Potentilla rupestris. Grindelberg ad Traminick
 gründl. v. Mati Sandk.
 aurita Hamng ad Bakkari.
 alpestris Hall. idem salisburgensis Hanck. Mati Sandk.
 subacaulis Scop. Bakkari ad Traminick
 argentea Dolz. Traminick, Tellerberg in Vlasig et alii
 hirsuta (sugr. hirsuta) v. sp. Koprivnica. Tragk
 (subgenus firs.) Hamng ad Bakkari
 septemloba Cenq ad Subgruska
- Ebenalpin
- Primula elatior Vrandl ^{ad} sibice, ab Ursino ad Pfeilstein-Kronk,
 Alpenrose annua a Traminick v. p. Freshke v. sp. Tute Ebenalpin
 — alpina Hamng ad Bakkari, Mati Sandk., ^{Mati Sandk.} v. sp. v. sp.
 Sanguisorba offic. Ursino
 Potentilla argentea Ditz
 Geum rivale Mati Sandk., et ad Bakkari in Vlasig
 involuta Schleier. Hamng ad Bakkari
 mortonii L. Hamng ad Bakkari, Mati Sandk., Veltka form
 urbana a Traminick ad Bakkari, ~~Subgruska~~
 Spinaria alpina ^{ad} v. sp. idem et Subgruska
 — uliginosa (L.) Vrandl v. sp. Grindelberg et hirsuta v. sp. Traminick
 — annua Borovička v. sp. a. Prostokor v. sp. Varsch
 — Filipendula Murrk forma Cenq
 Primula auricula ab Ursino v. sp. Koprivt. ad Pfeilstein-Kronk., et Vrandl ad sibice
 — Monochia. Vrandl ^{ad} sibice
 — Malibet ^{ad} sibice
 — spinosa a. Morozia ad Prostokor
- Ranunculaceae Onosma anagyrus Begir-Bey, Kullen ad Tuja
 Pentire radiata Vlasig ad Bakkari
 — Galanthus nivalis v. sp. Borovička, (v. sp. v. sp.) (v. sp.)
 scariosa ab Ursino ad Pfeilstein-Kronk., a Traminick ad Bakkari
 petra Vlasig idem Ebenalpin ^{Veltka ad Bakkari}
 primulina W.H. Vlasig idem
 evata v. prostrata ab Ursino ad Pfeilstein-Kronk., Borovička, Varsch
 septentrionalis Ebenalpin Traminick ad Tellius in Vlasig
- Cyathula nigricans L. intus Bakkari et Traminick
 hispidus ab Ursino ad Pfeilstein-Kronk., et a Pfeilstein-Kronk. ad Vrandl
 — B. pilosus Traminick, Tellius
- Anthoxanthum montanum L. Vlasig, Mati Sandk., Veltka Narva et alii

Medicago sativa Begio-Beg, Kulta usq; Suija
falcata } Tuvorik ad pedem Vlasiv, }
Hyperborea } Tuvorik ad pedem Vlasiv, }
minima } Tuvorik usq; Subgaster et alii

Medicago officinalis id.

Daphne mezereum Tuvorik, Tellerius, Geijera
pratensis id.

ochroleuca id

Aruncus sylvester (Dolmokra) id. et Geijera usq; Subgaster, Tuvorik ad ped. Vlasiv
repens id Tuvorik ad Geijera

montana id Tuvorik ad Geijera ad ped. Vlasiv

Panax quinquefolius id, Tuvorik ad ped. Vlasiv, Subgaster et Borsigia, Varesch
arruncia id, Tuvorik et alii

incarumatum id Tuvorik ad Geijera

procumbens id Tuvorik ad Geijera, et ad ped. Vlasiv

Platycodon id, Tuvorik ad Tuvorik

pandurifolius id

galeum id Tuvorik ad Geijera, Tuvorik ad Geijera

Lotus corniculatus Vlasiv ad Baklari, et Tuvorik et alii

- ciliatus Kotsch id

gracilis hispidus Desf. Tuvorik usq; Borsigia ad Tuvorik

Zygophyllum heterophyllum Vlasiv ad Baklari

Veronica tetrasperma Tuvorik ad Geijera, Tuvorik ad Geijera

hirsuta Tuvorik ad Baklari, Tellerius

Vicia sativa ab Bajino ad Baklari

sativa Tuvorik ad ped. Vlasiv

angustifolia folia Baklari, Vlasiv ad Baklari

Cressa Vlasiv ad Baklari Geijera usq; ad Subgaster

- var. sinica (forma alpina) Tuvorik usq; Baklari, Tsvingara, Vlasiv
pannonica Pay. Vlasiv ad Baklari, Varesch, Tsvintchay usq; Subgaster

Septem Pachinkonak usq; Sandrich, Schibe, Lutina usq; Tuvorik
Mali Sandrik et usq; Baklari

latifolia Tuvorik usq; ad Geijera) Tuvorik ad ped. Vlasiv

prosternon id

Tuberosa Tuvorik ad ped. Vlasiv, Tsvipri usq; Tsvintchay, et Kobitnaylar

Cephalaria Vlasiv usq; Baklari

Ostrya vulgaris Tuvorik ad Tellerius

verneyi Varduk prope Schibe, Vlasiv ad Baklari

variegata Den. Vlasiv ad Baklari, Tuvorik prope Geijera

Chionanthus ad Baklari Mali Sandrik

Gomphrena Sabynska (Trevir ad Subgaster)

montana varia Tuvorik ad Vlasiv

virginica Vlasiv ad Baklari, et Tellerius

virginica Vlasiv ad Baklari, et Tellerius

Hippocratea Tuvorik ad Baklari,

(Geijera ad Subgaster)

Ostrya vulgaris Begio-Beg, Kulta ad Suija

Cruiciferae

Nasturtium officinale Willd. Kunkel ad lobische, Derna, Passau-Konst., Eberstein ^{statis.}

- sylvestris Hör. *Rupinius* nigr. Kiebitz et Legeniv, prop. Dresyje
Trnka ad par. Vlasic et aliis.
- pyrenaicum HB. a Gordeler nigr. spicata usq; Biskovick.
- officinale d. Vlasic ad Baklan

Barbarca graciosa HB. Kunkel d. Dotski, Katschko ad Tschirn, a Gordeler ad
Dermits glabra L. Bonni

Anthrax alpinus L. Vrnik ad Savniates usq; Samitkovych

— eriopoda W? Vlasic ad Baklan. Mati Sandrik

— muralis Sch. Vrnik etc.

— hispida L. Guziazova, Vlasic ad Tschirn

— Dumet L. Kunkel prop. Tschirn

— aculeolata Lam. Buhrius, Guziazova

— hispida p. glaberrima ^{W?} Vlasic ad Vrnicka et Ravnik prop. Ceniga,

— praeemula Kit. Passau-Konst., usq; Sandrinec, Lobische, Lubina et aliis.

— thalictroides L. inter Trnka et Dotski, Eberstein et aliis.

— arenosa L. Passau-Konst., Savndinec, Lobische, Lubina et aliis. Trnka

Cardamine amara L. Passau-Konst., Savndinec, Lobische, Lubina et aliis.

— rotundifolia L. abbayae, Kunkel, Dotski.

— sylvestris (L.) casta glabro, n. sp? Baklavick ad Morav.

— LK. Prokunskoek etc. Vrnick, Mati Sandrik

Myosoton idaeum etc. (var. varath) Trnka prop. Ceniga

Dentaria bulbifera, Prokunskoek etc. Brunn ^{spur.} Kunkel, Tschirn, Podolovo ad Pandinsko.

— canescens L. Vlasic ad Baklan ^{Vlasic ad Baklan, Mati Sandrik}

— trifolia Kit. Bonnigus nigr. m. Ponikov usq; Vrnick, Vlasic ad Baklan

Fallertia incana Br. Trnka.

Alyssum edentatum Kit. Selynskia nigr. Polyanus ^{nigr.} Bonnigus, Vlasic ^{ad opacitas} prop. Ponikov

— petraeanum Ard.

— calycinum L. Vlasic ad Baklan, Trnka prop. Ceniga et Vlasic

— campestris L.

Peltaria alliacea L. Sijer super Borovlava, Cijev ad Ljuna

Draba australis L. Vlasic ad Baklan ad Oreshar, Mati Sandrik

— muralis L. Han Koprivnica, Trnka prop. Ceniga, Gradenec nigr. spicata usq; Biskovick

— ocrea L. Han Koprivnica, Trnka nigr. grisea ad Biskovick usq; Trnka.

Anciferae

Capella *bunia* *Pastor* *Vassilievi*, Doboi, Kotovsko, Tavnik ad Butkovijs
Thlaspi *praeox* *Tavnik ad Butkovijs* *Ouras* *ugor* *Kedrik* *Duria*, ^{m.} *Pod.*
— *ulvaria* *ad* *Passion*-*Konat*, Vlastiv, Baklin *Lob.*
— *perfoliatum* *Tavnik ad Butkovijs*, *a* *Tavnik ad Bile* *ugor* *Gordikha*
— *arvense* *Vlastiv* *ad* *Sobki* *Maffioli* *ad* *Baklin*.

Lepidium campestre *a* *Tavnik* *ugor* *Priske* *ugor* *Tasha* *Chudikh*,
Brutellia leavigata *a* *Tavnik ad Butkovijs*, *Vlastiv ad Baklin* *et ali.*
Hesperis matronalis *Vlastiv* *et* *onechaz* *cult?*
— *nivea* *Bauv.* *Vares*, *Vlastiv ad Baklin*, *Mali Sandik*
Syngnathus Albus *Vlastiv ad Baklin*
— *oficinalis* *Dilar*, *Butkovijs*

Cryptanthus *Vlastiv*, *Mali Sandik*, *Debischijane*

Erysimum odonton *Butkovijs* *Tavnik ad Baklin*

— *vandatatum* *Butkovijs* *a* *Tavnik ad Vlastiv*, *Vares*, *Tavnik* *ad* *Tranquillitha* ⁱⁿ
Hutchinson *petraea* *Borne* *Vlastiv ad Baklin*

Lepidium Draba *Borne*

Aethionema saxatile *Vlastiv ad Baklin*

Matthiola incana *Mayac ad Tavnik et Doboi*, *Vlastiv ad Oreshaz*

Nerita pavonina *Tavnik ad pedem Vlastiv*

Biscutella *Napus* *ad* *Stepen* *Tavnik*

Lunaria annua *Vlastiv ad Baklin*

Calepina coriacea (*ad* *floriferum* *lyrata*) *Amuricus*, *Doboi*, *Kotovsko* *ad* *Totche* —

Raphanus raphanoides *a* *Tavnik ad Butkovijs*

Senecio Coronopus *Genip* *ad* *Sutyske*

Pteridaceae

Nelumbo *phytaea* *Butkovijs*, *Maruthan*, *Lepenje* *ad* *Fomjaj*

— *tulca* *idem* *Tavnik ad Butkovijs*

Cistaceae

Heleanthus vulgaris *campestris* *Koch* *a* *Tavnik ad Butkovijs*, *Genip* *ad* *Sutyske*

— *B. grandiflor* *Vlastiv ad Baklin*

— *Heleanthus*

colombianus *p. hirtum* *Koch* *Vlastiv ad Oreshaz*

vineale *Perf.* *idem*

alpinum

Violaceae

Viola biflora *Vlastiv ad Baklin*

— *odora* *Tavnik ad Gordikha*

B. Mallo *Genip*

— *canina* *L.* *Butkovijs ad Tavnik*

— *Ruppiae* *all.* *Tavnik ad Sellenitschi*, *Gordikha* *ad* *Kotovsko*

~~Pod.~~
~~tie~~
Vitis sylvestris Lam 208 Subvariegatae Pruske ad Tute
var. tricolor Schlecht ad Tronick, Grindelk ad Tronick, Vining
var. avensis Tronick ad Vining
var. inaequale Lach Vining ad Balkan
var. vulgaris Lach Supradicem var. Polana ad Vining
tricolor Olympica Sip test Hauge Vining ad Balkan

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Ley Hornig, Dobr, Kotsko ad Potocki

Pothosaceae

Momordica foetida Pachin Konak ssp. Sandwicensis, hololeuca, Lubina, ad Wandelt

Caryophyllaceae

Hedionia incana Prokoch

Paronychia segetum Leptlin Prokoch

Scleranthus annuus Borkovi ad Tronick, Grindelk ad Tronick, Ospina ssp. Kirilovskij
— perennis idem ab Ospine et aliis ad Tronick Konak et aliis

Sagine apetala L. Tronick ssp. ad Genige, Kotschka ad Tronick

— tubulata Wissm Dujardin ad Tronick

— grossularia L. Vavsek, Dujardin ad Tronick, Meliensis, Vining ad Borkovici

Mohringia trinervia Ebinck

Renanthes serpyllifolia L. a Tronick ad Borkovici

Reline lanicephala Prokoch

— retusa Vondrik ssp. lobata, ab Ospine ad Tronick Konak, Vining ad Balkan
— rotulae a Tronick ad Borkovici, et ad gen. Vining et aliis

Tacchini a Suja ssp. Borysthenica, a Gvoz ad Liova

Möhrenia nudula idem, Namys ad Balkan et aliis

Stellaria nemorum Dolay, Bonnig ssp. montana Tronick ad Varsch

— media Vondrik ssp. lobata et aliis vulgaris

— gracilis in hortis Tronick, ad Genige, Kotschka, ssp. Kirilovskij, ad Tronick

— Holosteum inter Tronick et Magdeburg, inter Tronick et Kotschka ad Tronick et aliis

Moehringia mantica Ebinck, Tronick, Haus Tellinick, Serjew ad Kotschka et aliis

Ceratopteris syllochaum Kit Genige ad Saburka, ad Serjewa ssp. Lopukhan Kotschka et aliis

— gracilis Vondrik ssp. lobata, Tronick ad Borkovici

Senecio quadridentatus idem, Ebinck, Tronick ad Borkovici

glomeratum idem Tronick in hortis

Triviale a Tronick ssp. Brunowii, Vining, ad Tronick et aliis

repens Vining ad Balkan, et Oester

- Dianthus prostratus* Fellbach prope Travnik
 — cultivis Sengier, Hugo Lübsen, Kotschubaeus ad Zelenkhan, et Tchiriqui
 — annua a major etc, Travnik ad Travnik, et Tchiriqui
 — collinus Schlecht. super monte Kogitnaja, super rupi Borovojave,
 — Dianthus gris 1618 strobilus Ad. Travnik ad ped. Vlasic, Tchiriqui ad Lino
 — atomatus Opiz, Vlasic prope Baklan (Dianthus gris) Vlasic Malibandik
 — var. diutinus Regel-Heg. Kotsch ad Suja
 — petraeus L. Vlasic, Malibandik, Velikiy Ustym, Sutyska, ad Borovoj
 — Tylocentris Wulff ex petraeus obvratius Regel
Taraxacum Saxifrage Varech ad Samishoozhan, Prolog et alibi.
Saponaria officinalis Regel ad Travnik et Doboi
Silene inflata Travnik ad Belokur et alibi
 — congesta Regel ad Baklan, Malibandik
Saxifraga bellidifolia Baglari ad Vlasic
Silene pedunculata Travnik, Fellbach, Gengis, Vlasic, et Baklan
 — nemoralis Grisebach spicata Vlasic
Saxifraga Sibirica rupi Baglari ad Borovaja, Suja super Borovojave, Lino
 — quadrivalvis Malibandik
Lycopus binarius Zellings in Vlasic, Eberdahin, et alibi
 — Myricula in hostijs Travnik
 — carnosa Sibth Regel, Travnik, Doboi
 — vespertina Travnik ad ped. Vlasic
Lycopus verbenaceus Pallidiorum rupi Saniborich, Selische, Lubim et alibi
Aegopodium Githago Travnik ad ped. Vlasic
Malvaceae Althaea hispida Travnik prope Gengis, Gronige ad Sutyska
 — Malva neglecta Vlasic ad Baklan, Travnik
Tiliaceae
 — syriaca Travnik ad Vlasic et alibi
 — Tilia argentea 258, 1263 a Grenzberg ad Spiciria aqua ad Travnik, Gengis ad
 — parvifolia Gengis ad Sutyska
 — grandifolia Gengis ad Sutyska, Travnik

- Hippocratea Hippocratea hispida* Sieb ex ad Kogitnaja
 — Montibatis (alpinum W.K.) Regel ad Orskoy Vlasic, Malibandik, super alta
 — perspicua Malibandik, Vlasic in fellbach
 — quadrangularis suffruticosa ad Kogitnaja

- Acetosella* Acetosella Zelinsk, Vlasic ad Selische
 Borovje et Montibatis (Regel ad Baklan p. tenuissima - Kotsch
 Heterophyllo d.)

- Polygonaceae*
 — Malonaria
 — Taraxacum pallidiorum rupi Sibidovich, Selische, Lubim et alibi
 — Polygala major Gengis, Vlasic ad Baklan
 — cornuta Gengis, Vlasic
 — vulgaris Vlasic ad Baklan et rupi oxyptera Regel Eberdahin
 — amara Gengis, et iher
 — hospita myrophylla 361 Gengis

Quercus castaneifolia C. A. Mey. pl. caue. p. 144. Pantk. adn. p. 31.
Q. rumelijc petiolisque velutinis, foliis oblongis undulatis rimo-
 to-dentatis, dentibus mucronatis, stipulis linearibus, antheris
 pilosis, fructibus subciliatis, cupulae brachisphaericae squamis
 sericeis reflexis, inferioribus ovato-cupidatis.
Hab. circa Martinic in valle Zastap in Montenegro. Legit Tuli-
 et comm. Pantk.

Salicinae Rich.

Ad pag. 214. 1. fl. datum. Salicinus addatur

Salix cinerea L. var. *aquatica* Koch syn. fl. germ. 2 p. 248.

var. foliis obovatis

Syn. *S. aquatica* Sm. fl. boit. p. 1065.

Tion. Achb. ii. bot. vol. xi. tab. DLXXVI. p. 2023. Sm. engl. bot. tab. 1432

Hab. ad rivulum Pasina Vodda prope pagum Kovice supra montem
 Mali Dvoritor in Montenegro. Legit Tuli et comm. Pantk.

Salix Weigeliana W. sp. fl. IV. p. 678 Rehd. et al. XI. Pantk. ad.

p. 32.

ramentis sessilibus basi bracteatis, fructiferis subpedunculatis, ba-
 si subfoliatis, capulis ovato-lanceolatis, 14 to ~~longiusculo~~ ^{longiusculo} stigma-
 tibus bifidis, foliis ovalibus subtus glaucis, densum glaberimis,
 stipulis semicordatis.

Syn. *S. phyllacantha* L. sp. fl. 1442. Koch syn. fl. germ. II. p. 251 Achb. II.
 ex. p. 168. (sub *S. arborea* Wahlbg. B) Hort. fl. austri. II. p. 652
 (sub *S. arborea* W.)

Tion. Rehd. bot. XI tab. DLXIII fig. 2002. Sm. engl. bot. tab. 2656.

Hab. in grammineis Sumpjacione Placino in Montenegro. Legit Tuli-
 et comm. Pantk.

Salix retusa L. sp. fl. 1445. Host syn. fl. austri. II. p. 54. Achb. fl. aust. p. 666.
S. repens, amentis pedunculatis, pedunculo foliate, capulis ovato-conicis
 glabis pedicellatis, stipulis bifidis linearibus, foliis petiolatis obovatis
 aut cuneato-oblongis obtusis retinaculis integerrimis glabis.

Tion. Achb. ii. bot. XI tab. DLVIII. Gag. fl. austri. III tab. 298.

Hab. in monte Kom et Mali Dvoritor in Montenegro. H. Tuli. Legit et comm. Pantk.

Salix criniflora L. sp. repens Lach. in Pantk. adn. p. 32. — Legit Pantk. ad-

ditione Lepe. prope pagum Kovice ad pedem montis Mali Dvoritor sed non nisi.

Salix Caprea L. sp. fl. 1448. Host fl. austri. II. p. 666. Achb. p. 150. Pantk. adn. p. 32
 ramentis sessilibus basi bracteatis, capulis ovato-lanceolatis tomentosis pedicels

latis stylo brevissimo, stigmatibus ovatis bipedali, foliis ovalibus curvato-
-cuminatig subtus tomentosis glaucis, stipulis venitioribus.

Dion. Rehb. ic-bot XI tab. DLXXVII. Sm. engl. bot. tab. 1488. Host ic-salic.
tab. 3. f. 1. 2. et tab. V. f. 1. Coss. et Germ. fl. de Paris atl. tab. XXI. fig. super.

Hab. in Pennsylvanica et Tava Dol infra montem Kom in Montenegro. Legit Italiae
et commun. Pant.

Salix grandifolia var. m. Vaginata (Rehb.) Wendt. f. lobata L. sp. lant.
S.-Wulffiana W. m. Vaginata (Rehb.) Wendt. f. lobata L. sp. lant.
In fl. dalm. t. p. 217.

Literaria Pant. (B. glaucum d. pubescens a)
Monach. Silvatica a)

As ustrum glabratum Clem. adde locum Crna Planina Dol supra montem
Crna Planina in Montenegro et in sylvestris circa Bogovine horite in Bje.
tegora in Herzegovina. Legit et commun. Pant. adn. p. 32. Julio. 2.

Ulmus Spicata

Lauraceae R. Br.

In fl. dalm. t. p. 223 post Thespium humile Vahl adde

Thespium alpinum L. sp. gl. p. 301. Host fl. austri. I. p. 312. Rehb. fl. ex.
p. 157. Host ex. fl. austri. p. 301. Pant. adn. he. p. 34.

Th. radice praeuniformi, caulinis subangustiobus rameosis, ramulis prae-
uniformi erato-patentibus secundis, foliis linearibus uninerviis, brac-
ciis drobosis et rugosis tenuis termis, drupis subglobosis, perianthio fructus tubuloso, drupa
sublongiora.

Th. alpinum - Rehb. ic-bot XI tab. DLXLI. Iaig. Kaufm. V tab. 41b.

Th. alpinum - Rehb. ic-bot XI tab. DLXLI. Iaig. Kaufm. V tab. 41b.
var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb.
var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb.
var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb.
var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb. var. alpinum - Rehb.
Chenopodium rubrum L. sp. gl. p. 318. Host fl. austri. I. p. 322

Ch. foliis nitidis rhomboides subhartato-trilobis sinuata-dentatis, denti-
bus lanceolatis, specie foliatis compositis, semiangulis erectis laevibus, floris
terminatis glomerulorum horizontali.

Syn. Blitum rubrum Rehb. fl. ex. p. 582

Dion. ed. fl. dan. VII tab. 1149. Sm. engl. bot. tab. 1621.

Hab. ad vias et loca inculta insula Pelagosa. H. Iva. T. H. viridis. communis (L.)

Stellariaceae Bartl.

Ad. fl. dalm. I. p. 248 post Stellanthus annuum L. adnotatur

Stellanthus unguiculatus Rehb. Maxime memoriabilis, ex unicolo-
rum familia maxima species, ad intermediorum habita aliino. In parvis Visa-
jak Dol infra montem Crna Planina et in monte Kom in Montenegro,
ubi legit et commun. Pant. Tunc. Valdov. L. i. p. 101. H. Jun. O Laciniar perianthia intercurvata

Scleranthus Pantoreticus Rechb. n. sp. *PantK.* adn. p. 101. Ex
affinitate gypsophilanti, e familia lamiifoliorum. Hab. in paucis alpinis
Biele Carini dictis prope montem Kom in Montenegro, ubi legit et com. *PantK.*
Distinguuntur laciniis perianthii late hyalino-marginaliis oblongis, apice
introflexis curvis, pereat in sel. perenni L.

Cbt. Alius etiam species aut varietates invenit in Montenegro et *PantK.*
et distinguuntur vel Rechb. sub nominibus Sel. Cettinensis Sel. Engadiini
Sel. Montenegrini Sel. subuncinata, Sel. uncinella, et Sel. uncinata,
cuicunque differentias a cl. descriptori expectamus.

Anthriscus gallicus Retz. in m. *Etiva* prope Nobilo et circa Biatora (H.) *PantK.* p. 35 et *Pant.* in
var. *de Lettinijs* (M.N.) p. 82 *Plantaginaceae* Tuss.
An. logo L. Potokujevo ad Tellonici
Sect. 4. - *Empetraceae* Nott. *Erythronium* nipp. L. in m. Durmitor *Pant.* p. 82
Ad *Flor. dinaricae* Vol. II. p. 2. addatur

Plantago media L. var. *plicata* Schott. N. et Kotsch. in Anal. Bot.
p. 62, quia nova species proposita ibique describitur. Hab. in graminosis
montis Kom in Montenegro. Non vidi. Indicatur in *PantK.* adn. p. 35.
Plumbaginaceae Tuss.

Ad *Flor. dinar.* Vol. II. p. 49. addatur

Armeria alpina Wern. h. bot. 1. p. 333. Rechb. fl. ex. p. 189. *PantK.* t. c. p. 36
A. foliis linear-lanceolatis linearibusque glabris sub-trinerviis, caule com-
pressum glabro, bracteis elliptico-rotundatis oblongis, interioribus
obtusis primis, tubo calycis villosa-trinato pedicello non dividido bruciare,
petalis emarginatis.

Syn. *Statice cornicaria alpina* Hoff. *Hab. fl. austriac.* f. 407

Icon. *Rechb.* a. bot. tab. lab. M. C. Sturm deutsch. fl. n. 51
Tab. in paucis Biele Carini dictis et in monte Kom in Sonja
vina Planina, circa lacum Crno Jezero et in Mali Durmitor
in Montenegro.

sav. *B. lanceolata*: foliis lanceolatis Rechb. fl. icon. t. c. p. 68.
Hab. in paucis alpinis montis Kom in Montenegro. *H. Jan. Pat. No.*
res volei: 4.

Dipsaceae Vahl.

Ad *Flor. dinar.* II. p. 12 post *Cephalaria lemarthrum* Schrad. add.
Cephalaria grossa Roem. et Schult. syst. veg. II. p.
PantK. adn. p. 51. *Hab.* in saxonis circa Bogokici in Montenegro, ubi
legit *PantK.* sed non vidi.

Post *Asterolepidium suaveolealem* Wallr. in fl. dalm. II p. 14 add.

Asterolepidium Webbianum in saxonis circa Rieka et in
Oliva Skala infra Kom ubi legit Panth in edn. p. 37. sed non videt.

Sic etiam *A. suaveoleale* Wallr. var. *sileneifolia* quam idem legit
in supertribus montis Malii Durmitor in Montenegro -

Post *Scabiosa* Vaill. fl. dalm. II p. 18 addatur

Scabiosa sylvatica L. Knautia Duby in genimbris Virens. Sol
infra Cava Planina in Perucica Sol infra Kom. et circa Kovice
ad pedem montis Malii Durmitor. in Montenegro - Non vidi.

Scabiosa longifolia Kit. pl. 22 r. I. tab. V. Knautia Koch ^{syn. f. form. 15}

legit Panth in Perucica Sol. infra Kom. in Montenegro - Non vidi.

Asterolepidium holosericeum Tr. quoniam legit Panth. in saxonis Oliva Skala in Perucica Sol infra

Kom. in Montenegro. Non vidi. Et Czerni prope Subotica a Panth. et. p. 46 sub m. Nam.

Sc. ^{l. c. trinitatis} ^{ginea} in supertribus Quastijen. ^{l. c. trinitatis} ^{ginea} *Arenariaeae* DC. l. c. exculata Czern. in supertrib. Cep.

Ad fl. dalm. II p. 23 *Valerianae* addatur ^{l. c. exculata Czern. p. 42} Sequitur in fine glaucia vire griseo-viridis

Valeriana celtica L. sp. fl. p. 46. Host fl. austri. I. p. 37. Nchb. Stein. p. 199.
V. foliis integrerrimiis glaberrimiis, infinitis obovato-lanceolatis; can-
tibus obovato-lineariibus, corymbis verticillato-spatulatis, radice squa-
mato-composita.

Ideas. Nchb. fl. 1. c. bot. XII Tab. DCCIX p. 1418. Zmag. coll. 1. tab. 1. Sturm. Deutsch.
flor. I. tab. 395.

Hab. in paucis alpinis montis Kom. in Montenegro. Flores laterantes, estus
rubelli. fl. Tua. Iuli. 2. Legit et commun. Panth. l. c.

Valeriana Betsisea Panth. n. sp. et. sp. var. Czern. p. 42.

V. foliis ^{l. c. vagante raro} ^{var. recta} obovatis glabris, inferioribus ovalibus vel obovatis, in petiolam
longe attenuatis, caulinis sessilibus, basi ^{l. c. recta} ^{recta} implexicaulibus oblongis,
remote-dentatis acuminatis insidiosque, floribus compacte cymosis,
bracteis linearis-setaceis marginae petioliis, calycibus striatis glabris;
carolla infundibuliformibus talyses superius tubatus.

Hab. in glaucis calcareis sub monte Kom. in Montenegro australi. Flores
Augusto. fl. vici. ^{l. c. vagante raro} Legit et commun. et. prof. Panth.

2.

Actaea Coues prostrati repentes nodos, ^{ramis} radientes, ^{ramis} ascendentes
erectis simplicibus floriferis glabris, sub foliorum insertione ^{lyra} ^{lyra} rotulatis. Folia in
superior repente inversa superiora tenuide lobo medio majore. Flores dense
lymori pedunculatae bracteis setaceis calyx duplo longis, carollo tubo co-
nico, quinquelobis lobis obtusis ovato-roundatis. Staminea toro. ^{angustis ellipticis} ^{angustis ellipticis} pedunculis
fructus ovoides truncatis compressus globes, nervo marginatus, parie unistratatus, dorso

~~post Carex vernae Vill. additum regenerat~~

~~Carex fuscoviridis Gooden. in Linn. Soc. vol. II p. 183. Cibb. Fl. Eng. p. 69.~~

~~C. ssp. marcescens solitaria, frumentum tenui, inflorescens remota granulata strobila,
bracteis longe excurrentibus, stigmatibus levibus, fructibus viridis utrinque cuneatis
sursum gibbosus in apice testaceum velutinum rufulum testiculus - subtus granulatus.~~

~~Don. Sch. nachr. d. Nieders. Nat. T. p. 62 dexter. Cibb. ic. 16 geran VIII. tab. CCLL.~~

~~Hab. in humido circa gravore ditionis Ragusinae. H. Tunc. sub legit Pantk. 24.~~

~~Cer. tunc adit il-Gris. var. xanthocarpa Dcgl. ad Robt. Pexero infra
montem Mati Durmitor in Montenegro. Utam a Pantk. quam nomen.
Carex pilulifera L. sp. pl. 1385 ex Gris. in Pantk. adi. p. 19. Habitat
in pratis ad Robt. Pexero infra montem Mati Durmitor in Montenegro
quo sic non vid. H. Tunc. id.~~

~~Hieracium acutifolium Vill. fl. de duci. p. 3. 100. H. Hieracium L. R. H. Adon. 12
(p. 122. v. umbellatum Pantk. subnudum Gris. in Pantk. l. p. 51. Cicut. in Cynodon kom. hieracium
C. veget. grandiflora Pantk. ex Gris. in Pantk. adi. p. 58, quae habitat~~

~~Post Hierac. acutifol. v. umbell. subnudum ex Gris. in Pantk. adi. p. 51 quae habitat in
superioribus circa Cynodon Pexero infra Mati Durmitor in Montenegro. Non vid.~~

~~Hieracium mucronatum L. var. elongata Gris. et var. plumbeum Gris.
ex Grise. habitant infra Kom. et in Kom. ^{in Montenegro}. Id tunc vid.~~

~~Hieracium incisum Hoff. et Koch ex Gris. in Pantk. adi. 1.c. hab.
Hieracium forma rotundifolia hab. in cylindrica Gris. et forma
angustifolia Gris. in cylindrica Kom. et iugosa Mati Durmitor in Montenegro.~~

~~Hieracium vulgatum Jr. var. orobetum Gris. et var. angustum Gris. hab.
in cylindrica Kom. et Gris. in Pantk. adi. p. 51. Non vid.~~

~~Hieracium Rorarius Gris. ex Gris. in Pantk. adi. 1.c. hab. in cylindrica
Roraria Del. infra Kom. in Montenegro Non vid.~~

~~Hieracium umbellatum L. ex Gris. in Pantk. adi. 1.c. hab. in cylindrica circa
Kom. infra Mati Durmitor in Montenegro Non vid.~~

~~Hieracium Schmidtii var. glabophyllum Schur. et Gris. in Pantk. l. c. p. 51-52 hab.
in cylindrica Ponicea Del. infra Kom. in Montenegro, sed non vid.~~

~~Hieracium Althaeum Gris. ex Gris. in Pantk. l. c. hab. in cylindrica Slavnicki
in Montenegro, sed non vid.~~

~~Hieracium gynostichatum Gris. n. sp. in Pantk. adi. p. 52 hab. in cylindrica Orla
Skala infra Kom. in Montenegro. Non vid.~~

- Hierium subcragum* Pau. n. sp. est var. *H. capigera* Sis. fl. delm. n. sp.
f. 69.
- Hierium* ~~thevoid~~ *Pau. n. sp.*
~~canescens~~ ~~pilosum~~ ~~repens~~ folij ~~ovalibus~~ ~~oblongo~~ ~~lanceolatis~~ ~~im-~~
~~mer~~ ~~basi~~ ~~dentatis~~ petiolatis, ~~superioribus~~ ~~minoriibus~~ ~~ovato-~~ ~~ob-~~
~~floribus~~ ~~coronatis~~ ~~involucris~~ ~~linearis~~ ~~caulescentibus~~, ~~ovulis~~ ~~ob-~~
~~irregularibus~~ ~~achenes~~ ~~obtusis~~ ~~pentagonis~~, ~~with~~ ~~sube-~~ ~~divisus~~ ~~apice~~ ~~glabra~~ ~~coronatis~~
~~receptaculo~~ ~~verticillatis~~.
Hab. in savanae as monte. S. Hispania in Montenegro meridionali. H. Pitt. fl.
Hierium gymnoscephalum Gris. in Panth. adn. p. 52. fl. 2.
- H. lanuginosum* pilosum ~~patens~~ folij ~~oblongo~~-~~lanceolatis~~ ~~integerrimi-~~
~~glanduloso~~ ~~marmoratis~~ acutis, ~~superioribus~~ ~~lato~~ ~~attenuatis~~
~~semilatis~~, ~~involucris~~ ~~significatis~~ ~~squamis~~ ~~linearis~~-~~acuminatis~~ ~~glabri-~~
~~ciliis~~, ~~achenes~~ ~~obtusis~~ ~~pentagonis~~, ~~with~~ ~~sube-~~ ~~divisus~~ ~~apice~~ ~~glabra~~ ~~coronatis~~
~~receptaculo~~ ~~echinulato~~ et in vegetabilibus ad Tivina in Montenegro ^{sectoribus} ~~sectoribus~~
Hab. in vegetabilibus Ostoje Kala dicitur infra Kom. Deterrit Panth. et concur.
H. ^{obs.} *Hierium marmoratum* Gris. et Pau. scc. Gris. in Panth. adn. p. 52.
hab. in monte Kom et in Bosnicia sit in Ostoje Kala in Montenegro,
ed non vidi.
- Ad *H. ponifolium* L. Gris. H. Adm. II p. 122. adh. syn. *H. capuronipicum* Vill. ^{exst. 1793.} *H. capuronipicum* Vill. ^{1793.}
in Panth. adn. p. 52, quod consistit in vegetabilibus mortis Kom in A.N.
Hierium glabratum Hopp. in Willd. p. 1562. Gris. in Panth. adn. p. 53.
Hab. in vegetabilibus Ostoje Kala dicitur infra Kom. Non vidi.
- Hierium aviculacefolium* Pau. n. sp.
^{longatis}
H. glabrum glaucescens, caule raro monopodial, folij ~~oblongo~~-~~lanceolatis~~ ~~redre-~~
~~los~~ ~~latis~~ ~~oblongis~~ ~~petiolatis~~ ~~clavigeris~~ ~~lanceolatis~~ ~~longioribus~~ ~~acutis~~ ~~rectibus~~, ~~involuc-~~
~~ris~~ ~~significatis~~ ~~squamis~~ ~~infundibulatis~~ ~~patens~~ ~~petiolatis~~ ~~obtusipennis~~, ~~achenes~~ ~~pentagonis~~
Hab. in savanae ⁱⁿ ~~in~~ ~~maximis~~ ~~hastis~~ ^{large} ^{pubescentia} ^{que} ^{crepitantia} ^{habet} ^{calcareas}
M. Aug. M. flavo. 2p. Cinnam. et
deterrit d. prof. Pau. 2p.
- Obs. Attenta inspicione maxima, in qua vegetabilis hodiis species leviora ^{que} ^{non} ^{possunt} ^{con-}
siderari ^{longe} ^{pubescentia} ^{que} ^{crepitantia} ^{habet} ^{calcareas}.
- Ad *Cyperaceae* Barth.
- Phytiumata* fl. delm. II f. 28 ad datur. ^{ad} ^{deterrit} ^{Barth.} adn. p. 53. (*Ph. heterostachys* L. var. *prostratum*)
Ph. heterostachys L. ^{ad} ^{deterrit} ^{Barth.} ^{adn. 53.} ^{caule} ^{petiolato} ^{ed} ^{non} ^{constricta} ^{lepis}
Panth. ^{ad} ^{deterrit} ^{Barth.} in Montenegro in pratis infra montem Mati Duvnjak.
Phytiumata pseudo-orchideae n. sp. Panth. adn. p. 53. Nominis quoque non dico
est a *Ph. heterostachys* var. *cordata* L. Griseb., quam breviter icon. Vill. p. 517.
II. tab. XI fig. 1. similis (*Ph. cordatum* Vill. p. 517). Hab. in pratis alpibus montium Kom et
Mali Duvnjak. Julio.

Post Phytume adi genes

Iasione L.

H. Cliff. p. 126 gen. n. 1005.

Char. Calyx quinquefolius. Corolla quinquepartita - lacinia linearis, post filamentorum ope quasi levigata. Stamina filamentis linearibus, anthers in tubulis brevi connatis. Pistillum style pilosum ^{anthers not emergentes}, capite blondo, ovali, levigato, apice formosissime late dentatus. Cl. Pentandri Ord. Monogyn. Lythrae

Sapone nigra Sieb. in Sp. syst. org. I. p. 810. Pantl. adi. p. 53

I. caulinis repente diffinis, ad basim foliorum pilosis, foliis cuneatis rhomboideis obtusis ^{capitatis} glabris, bracteis oblongis acuminatis dentatis flores acuminatis

Hab. in præcipue alpinis Biele Camini et in monte Kom in Montenegro. H. sub. H. Hoch.

Ad Campanulas in fl. Dalm. II p. 140 subhängantibus

Campanula lingulata Kit. ex Pantl. adi. p. 53, quae hab. in tybericis Karst Dol. infra montem Cava Planina, in Petricca et Jara Dol. infra Kom et circa pagum Kovica infra montem Mali-Durnitor in Montenegro. Non videtur

C. macrostachys Kit. C. multiflora Kit., quae hab. in Drinjo, Kovica et Jara Dol et circa Kovica infra Mali-Durnitor in Montenegro. Non videtur

Campanula filiosa Den. quae cossit in tybericis montibus Kom sed non ord.

Campanula latifolia L. quae cossit in denudatis collis fluminis Drin prope Materovo in Montenegro. Non videtur

Campanula papuana L. inv. specie lib. 12 Tage auf Montenegro p. 28 tab. 2

Ermit circa Dancilov Grad, floribus speciatim distinctis, at quoque in Dalmatia obscuris

Campanula abutiloides Gris. et hung. p. 33. C. patula B. paniciflora Pantl. gl. br. var. p. 42 tab. 6. quae cossit in tybericis Virnia Dol. infra montem Cava Plana id nec hanc nec sequentem videtur

Campanula petala L. quae cossit cum procedente et insperata in Petricca et Jara Dol. infra Kom et circa pagum Kovica infra Mali-Durnitor in Montenegro.

Campanula hispida Pantl. n. sp. in adi. p. 54-55 quae habitat et C. monadelpha Pantl. n. sp. p. 55 quae habitat in præcipue tybericis Virnia Dol. infra montem Cava Planina in Montenegro et floruit iugno Julii, id non videtur

Campanula Kitaibelii ~~A. DC.~~ Edmontonii A. DC.

C. caule piloso, foliis subciliatis indumentibus linearibus - subciliatis remoto dentatibus, foliis capitulo bracteis ovatis ^{linearibus} acuminatis dentatis ^{ovatis} lacinia calycis linearis lato - linearibus similibus ^{oblongis} appendiculatis rufis corolla style brevioribus 1460 br. trifido inclusa

Syn. C. gomoniophila Walp. et Kit. pl. nov. hung. II p. 166 excl. syn. Wahlenbergia Kitaibelii A. DC. non Campanula p. 131. Edmontonii Kitaibelii A. DC. in DC. prod. VIII p. 449 Pantl. adi. p. 55.

Hab. Richb. f. i. fl. gen. XI tab. 227 f. I. II. W. et Kit. t. c. tab. 154. Hab. circa Zagreb in Dalmatia, et circa Monachia Drin et in Isonzo Virnia jonica prope Prossed in Montenegro. H. violaceus A. DC. Han

Obs. Campanula Kitakibii distinguitur a C. graminifolia L. laevius calycinis
minimis & sinus laciniarum majorum reflexis. sed haec nota ^{Draminianus} in constantia non in
speciebus aliund similiteris velde debet. Hoc videtur etiam et Berth.
loring qui in Metab. II. p. 489 sub C. graminifolia L. haec notata
dixit reliquit = Inter segmentum et segmentum (calyculis) ex apice sinus
subiride nec tenuer, deflectus redumentum annulus dum ciliolatus
Huc quoque quam proxime accedit Enchanthus coquing ^{Ram.} in dicta bot.
Leitzsch. XXII N. 1. et Panth. adn. p. 55, et forsitan est, sed ex unico quicunque
nunc quod possum, indicare non ausum - Cenit in rupibus monte Kon. et Mal. Durmitori
Campanula Pichleri Vip. Adrogithum Huter vocat in paginis montis Kon. ^{in Montenegro} et in
Vrto prope pagum Lipovo in Montenegro ex Panth. adn. p. 55-56.

Lentibulariaceae L. C. Presch.

Ad Lentibularias R. fl. dalm. II. p. 158 addatur

Pinguicula vulgaris L. sp. pl. p. 25. var. alpicola Reichenb. ^{sot. f.} ^{adn.} Pauth. adn.
P. culicaria subulata, capsule ovata, flor. major. ^{p. 57.}
Icon. Reichenb. can. edit. ¹ tab. LXXXIV. Lam. ill. 1. tab. 14. Redf. Mon. I. fol. 93
Hab. in pratis humidi Virnia dol. super Crna Planina, in passus
alpinis montis Kon. et Mal. Durmitor. in Montenegro. Fl. violacei
fl. Jun. 2.

Obs. Cf. Pauth. invenit etiam in Herzegovina ad. Bielazor aliunde quam
quae pro novo denupris (P. lactea Panth. adn. p. 55) et difficit a P.
histicornis Den. cum que fuerit cf. Grisebach, nec credo diversam.

Sporophylaceae Benth.

Ad Verbasca R. fl. dalm. ² p. 158

Verbasco repandum W. Pauth. adn. p. 68. quod habitat inter pratinus circa
Bicka et Konani. Non vidi. ^{Pauth. adn. p. 68.}
Verbasco nigrum L. var. 1. paniculatum Gorcic, quod habitat in cylindricis
arie Kovice ad pedem Mal. Durmitor. in Montenegro. Non vidi
Verbasco gargaicum Den. ex Panth. adn. p. 68. quod currit in pratis
montis Kon. et in Penicula dol. super Kon. in Montenegro. Non vidi.
Post sporophytas R. fl. dalm. II. p. 160 addatur sequentes.

Sporophytus aestivalis Gris. sp. fl. novell. p. 36. Pauth. ^{fl. p. 160.}
S. caule obtuso angulo villosulo, foliis cordato aut subtrinerviatis oblongo-^{obtuso} linearibus
ciliolatis, inaequilateris duplo-lati, cymis axillaris paniculatis perennibus,
pedunculis, ^{sparsis} lacinias calycines oblongo-linearibus oblongo-linearibus inaequilateris, ciliolatis
apicibus minimo subrotundis capsula ovata.

Hab. in cylindricis aereis montis Kon. et cune Crno Jezero super Mal. Durmitor. fl.
quiquavariae. fl. Julii. 2. Obs. Ab hac differt S. restans Gris. proprie-
radice perenne.

- * *Agaricorum wardii* Tsv. Kif. c. p. 88 - *Mycetes ad officio, et prope eis dist. communicae. Basc. p. 106.*
 Ad *Nardum striatum* L. R. f. Dalm. f. 96. Add locum in parvus alpinus Brelelarine
 in prok. et monte Mati Savanior (MS) et in parvus montium Savanior et Kom. Pan. 101.
Lesteria marginata Grs. sp. p. 1. rum & p. 162. et in Panth. L. c. p. 16
S. spica compacta ~~globoidea~~ ^{oblonga} dict. ^{oblonga} spicula subemissa, fasci superior
 humule inferior apice tricote aristata et stipe subapicata, foliiglate
 levigata marginata et superius angustata ^{lateraliter}
 Syn. *S. coeruleans* pro. in Negerib. f. 1836 p. 432.
 Hub. in taxonum montium Iastribica in Bjelajoz (Hung.) et Kom. (MN).
 Ad *S. intermedia* Kif. f. Dalm. 1. p. 87 add Panth. L. c. p. 16 et loco in
 taxonum montis Iastribica in Bjelajoz (Hung.) et Kom. (MN).
 Ad *S. juniperina* Host in Kif. f. Dalm. 1. c. add syn. *Sesleriae tenuipila*
 Schrad et loco in vegetatis vallis Tazina prope Orkovač
 et in monte Iastribica in Bjelajoz (Hung.) et Kom. (MN).
 Ad *Aegilopus* ^{var.} ^{oblonga} Kif. f. Dalm. 1. p. 90 et III p. 166 add locum in vallis circa
 Cattars (Dalm.) et Turbiye (Hung.) Panth. L. c. p. 12; ad *Aeg.*
 tenuifolia L. in vallis vre Turbiye (Hung.), ad *Aeg. turcicus*
 Nejlof triang. W. f. pl. IV p. 943. Bieb. ff. exc. p. 17 Grs. in
 Panth. add. p. 12. ^{2-3-anthrys,}
A. spica exata Supreme attenuata, spicula 4-5 glomeris hispidis in
 basi, marginis glabri ^{adspicere} lobis ^{lobis} ^{angulis} inter arctas ^{latis} ^{angulis}
 Zorn. f. 16. tab. XI tab. 8 f. 135b Schenck. agric. tab. 1. f. 2.
 Hub. in vallis montis Vernae prope Cattars. Legit Panth. Jul. 10.
 Ad *Lobaria pacifica* L. Kif. f. Dalm. 1. p. 92 add locum circa Cattars et Dalm.
 Iastribica (Hung.) ad *L. tenuifolia* inter vegetis circa Turbiye
 (Hung.) et ad *L. robustum* Nell. syn. *L. tenuifolia* var. *speciosa*
 Bieb. Grs. et Panth. L. c. p. 13 cum loco inter vegetis prope Cattars
 et in Hungaria ad Turbiye - per tut. ^{Panth. L. c. p. 13}
Lolium multiflorum Gaed. fl. herbar. 1. p. 354 Bieb. ff. exc. p. 16 Grs. in
L. spica compacta diff. glomeris spiculae triplex hirsuta, spiculae aberrant
 tis acutis 15-20 floribus, floribus carnosatis acutis imbricatis, superioribus
 acutis. ¹⁰
 Non Bieb. ii. ff. grm. XI tab. V f. 1345.
 Hub. inter vegetis circa Turbiye (Hung.). 16 Jul. Av.
 Ad *Internus* Kif. f. Dalm. f. 96. Indra lolianum Tsv. add locum. Gručica (Hu.)
 f. 101. Internus primulinus Moeschb. Kif. L. c. p. 95 add locum in monte Glis pro
 Turbiye (Hung.) et in vallis Tazina prope Orkovač in Bjelajoz (Hung.)
 ad *Internus* ulicaria DC add syn. *Bryopora* *Istachyon* Beauvo. Panth. L. c. et
 loca in ^{prolificis} circa Nagy-, et ^{ad} *V. Bryopora* ⁱⁿ 3. mon. Istachyon in taxo
 ris ad pedem montis Siles prope Turbiye (Hung.)
 Ad *Internus caninus* L. add loc. in herbis vire Damiles Grm (MN) ad Int. organ
 add var. glomeratus Grs. et Panth. L. c. p. 13. virens loc. in herbis vire Damiles Grm (MN)
 17. in vallis Bieb. Kif. L. c. loc. in monte Siles in vallis Nagy (Hung.) et circa Istachyon (MN).
 2. lobata Host. et campionis herb. Kif. L. c. in herbis vire Damiles Grm (MN) Panth. L. c. p. 13.

- ad *Secale delmatum* Riff. Schm. T. p. 98 ad
Secale montanum Guss. in Mem. h. Borodav. 1825 et prodr. fl. idem. 1826
165. sp. in Part. 6. c. p. 13. Part. 6. Ital. 1. p. 548
S. spicatum subnudum conspicua, radice fragili articulata, ^{utrinque} ~~marginis~~
pilosa-barbata, glomerat^{us} ~~erectus~~ ex supra linearibus ~~glandulis~~ marginine levigatis,
radice exarata.
- Hab. Syn. *S. secalinum* Pana. — ex Partch. in Part. 6. c.
Hab. in herbib. area Orlovae et Dubovce in Bjelovar (Kvar) 26. Jul. 1866
Obs. An haec ~~probable~~ species cum *S. delmaticum* Riff. copulanda?
ad *Hordeum murinum* L. tip. tip. 98 ad locum in herbita Pristinijs, Billitsko
in Karpatorum et Cettinijs in MN.
ad *H. bulbosum* L. vs. 1. c. ad locum in herbita montis Puer prop. Tschirnje (H.)
-
- (exad *Pseudospergula* L. ex Poeniss. ad Dravnik. Sestra (Bosnia))

Crocos vernus all. var. *parviflorus* Gay. Pantek adn. p. 26. floribus duplo minoribus. Hab.
in parvis aliisque Carinae siccis infra Korem in Montenegro. Vol. I. Jan. 2.

Indicatur & pingit in Vol. I. fol. 137. Crocus parviflorus Huds. in denuo ad Cetinje (p. 89)

Post *Dulipa sylvestris* L. add.

Obs. *Dulipa Grisebachiana* Pantek adn. ad fl et fau. p. 23 juxta specimenum authentum a d. auct. communiceat e repetibus montis Glava prope Trebinje in Herzegovina lecta non differt a *D. sylvestris* L nisi phyllis perianthii externis basi pubescentibus, quae in specie glabra sunt. Hinc potius qua var. *B. Grisebachiana* phyllis perianthii omni bus basi pubescentibus, quam hanc species habenda. In ipsa *D. sylvestris* dalmatica partitiones perianthii mane apice ex puberulae, rame
omnino glabrae L. Vol. II. fol. 26. ad Cetinje Pan. p. 89. (MN) m. V. Stojan (Bosn) tradit.

Galanthus nivalis L. Vol. I. p. 146.

Post *Gagea pygmaea* Schult. addatur

Gagea lutea Schult. 1st vsg. 7 p. 538. *Brithogalium luteum* Host
fl. austri. I. p. 429. Hab. in silvaticis Penicula Dol infre montem Kore uti
legit Pantek. Jan. uti ex Adn. I. c. p. 23. 4. *Brithogalium* (B)
add. *Muraria monspeliaca* W. p. 95. Sutynska (B) locuta.

Post *Veratrum nigrum* L. ad locum in pratis montis *Lattara* (Cavka)
et *Regije* (Beg. at Kneževi)

dicti *tugra* *Vojnić* in Montenegro. Pantek. ex Adn. I. c. p. 23. 4. *Veratrum* (B)
Post *V. album* L. ad *V. P. lobatum* Bernh. super ad. Pantek. p. 95. *Veratrum* (B)

Vol. I. p. 131.

Ad *Hittiarium messenium* Raf. ad locum in monte Kore et in
Penicula Dol infre Kore in Montenegro et circa *Lattara* in Dalmatia.
ex Pantek. I. c. p. 23.

Vol. I. p. 132 et Suppl. p. 32.

Post *Lilium Cattanicum* Nip. add.

Lilium albanicum Gris. spic. fl. rumel. II. p. 386. Pantek. I. c. p. 24
L. foliis lanceolatis, superioribus acuminitis, marginine rufis, subter
glabris, mediis confertis, flore nutante, perianthii phyllis oblongo-lati
nearibus apice callidis, nervis lateribus reflexuosis, antherris flavis.
Hab. in parvis alpiniis Ricle Carini, in monte Kore, Sinijsavina Flamina
et Malci Durmitor in Montenegro. H. Jan. Kore. fl. 4.

Lilium cyanococcum Bernh. exgen. in Mont. host. (B) Z. Metzger. L. t. subsp. *laevigatum* ad Borovica S. Pantek. (B)

Pantek. (B) p. 98. Vol. I. p. 137. et in denuo ad Borovica Pan. p. 90.

Post *Allium intermedium* Lam. add.

Allium cleracum L. var. *conglomeratum* Fries nov. ad. II. p. 85. Pantek.
adn. I. c. p. 24.

Equisetaceae DC.

Vis. H. datm. Vol. I p. 34.

Lycopodium selaginoides L. adh. syn.
Selaginella helvetica (L.) P. Benth. p. 12 et 154.

Equisetum sylvaticum L. sp. pl. 1516 Host fl. aust. II. p. 142. Herbarium
e. exinde plurimis ramiis oblongo-lanceolatis, utrinque decurrentibus, bipinnatis, pinnulis
lanceolatis bipinnatis-partitis, lobis inciso-crenatis oblique mucronatis, sensu solitariis.
varius hygrophilus, siccus capillaris Hoffm. Ann. Bot. Soc. et faec. Herbar. Gregor.
et Salm. Poen. 1876 p. 10.

Obs. Invenit Pant. in sylvis circa pagum Lipovo in Montenegro
Non vid. Pant. Ling. in Botan. tab. 1516, sub no. 1000. Miller

Lycopodiaceae DC.

Vis. H. datm. Vol. I p. 35.

Lycopodium selaginoides L. sp. pl. 1515. Host fl. aust. II. p. 651. Ridd. fl.
exc. p. 152.

L. caule repente, rami adcurrentibus, foliis sparsis lanceolatis, spinulo-dentatis, spicis terminalibus sessilibus, solitariis.

Syn. *Selaginella spinulosa* A. Braun ap. Doell. Rheinfl. p. 58. T. spinosa
Spring mon. des Lycopod. p. 52.

Icon. Dill. hist. mus. tab. 68 f. 1. Thurm fl. germ. tab. 5. Hall. Schle. tab. 45 f. 1
Hab. in pratis circa lacum Rijka, infra Malii Durmitor in Montenegro.
Legit Junio. Pant. adn. p. 12.

Lycopodium helveticum L. sp. pl. 1518. *Selaginella helvetica* Spring t. c.

Obs. Invenit Pant. in rupestribus montis Vermac prope Cattaro in Dalmatia et in monte Kom in Montenegro. Legit Junio - Pant. adn. p. 12. Selaginella Spring
ex hisce speciebus et Spring condidit genus *Selaginella*, quod a Lycopodium
dissedit sporis difformibus: quarum alias parvae (Microsporae) in sporangia
semirufa aut sphaerica inclusa (Microsporangia), alias maiores (Macrospora-
rae) lineis tribus elevatis, in verticem prominulum convergentibus, et
in sporangia 3-4 locis dehiscentes (Macrosporangia). In Lycopodium var. sp.
rumpie omnia sunt semirufa.

Filices Sw.

Vol. I. p. 42.

Cheilanthes odorata Sw. syn. fit. p. 5*Saxifraga fragrans* Vivian. (non Vis.)

Vol. I. p. 37.

Polyodium alpestre Hopp. sp. exsicc. Specm. fl. fib. 1. p. 12. Lowe brit. and exot. ferns. 1. p. 115
P. frondibus glabris oblongo-lanceolatis, utrinque decurrentibus bipinnatis-partitis, pinnulis
lanceolatis bipinnatis-partitis, lobis inciso-crenatis oblique mucronatis, sensu solitariis.
Syn. *P. rhactinum* L. sp. pl. 1552 (with citation Bauhinii DC. fl. fr. V. p. 262. Aspidium
alpestre Mett. in Pant. adn. fl. aust. secundum Pant. adn. p. 11.

Icon. J. Baum. hist. pl. III. p. 420. Lowe l. c. p. 115 tab. XXXIX.

Hab. in saxosig mont. Kom in Montenegro ubi legit Jun. Pant. Jun. 7.

Athyrium filix-feminae Bernh. in Schrad. v. Journ. T. p. 2, f. 27. Panth. 1. p. 11.
 Syn. *Polypodium filix-feminae* L. sp. pl. p. 1551. *Lycopodium filix-feminae* Bernh. ex
 H. & J. p. 59. Host fl. austri. II. p. 675. et

Obs. Invenit Panth. in sylvestris vallis Virusa infra Cava Planina
 in Montenegro. Non vidi.

1. A. fontanis oblongo-lanceolatis, basi vir attenuatis, subtilibiter bipinnatis - rufis,
 segmentis angustis bipinnatis lanceolato-auminatis p. natifodique,
 latis lanceolatis oblongis dentatis, indutis pinnatis - lacris.

Syn. *Polypodium filix-feminae* L. sp. pl. p. 1551. *Athyrium filix-feminae* Sw.
 syn. fil. p. 59. Host fl. austri. II. p. 675.

Icon. *Platycerat. phyt.* - tab. 180 f. 4. Moris. hist. pl. 10 et XIV tab. 3. f. 8. Bevath. 1. c.

v. I. p. 2. f. 27

Hab. in vallis Virusa infra Cava Planina ubi legit Panth. Tunisie. 4.
 - *Asplenium rigidum* Stev. Panth. 1. p. 11. non Stev. sp. *Asplenium rigidum* Stev. non *Asplenium alpestre* Murr. Panth. 1. p. 11. *Asplenium rigidum* Stev. non *Asplenium alpestre* Murr. sp. p. 10. Panth.

1. 2. p. 11. Hab. in sylvestris vallis Virusa infra montem Kom. Legit
 Panth. sed non vidi.

VII. III. p. 344

Nardus stricta L. invenit. quoque in prærieg alpinis Biele Laini infra
 Kom et montem. *Mati Durmitor* in Montenegro ubi legit Panth. *Pan-*
 Vol. III. p. 339

Oenanthes Avena alpestris Host fl. austri. I. p. 123 et icon. gr. III tab. 39. Legit Panth.
 ad. p. 1. b. in prærieg circa Biele Laini et circa pagum Kovice ad pedem mon-
 tis Mati Durmitor in Montenegro. *Pan-*

Ceraria flavescens L. sp. pl. p. 118. Host fl. austri. I. p. 128 et icon. gr. tab. 38.

Rehb. fl. austri. p. 151. Invenit Panth. Tunisie in prærieg circa Kovice in
 Montenegro. *Pan-*

VII. III. p. 336

Aegrostis rupestris All. fl. ped. II. p. 237. Host fl. austri. I. p. 98. icon. gr. III. tab. 50. *Pan-*
 Rehb. fl. austri. p. 25. Legit Panth. in prærieg Biele Laini et mont. Kom in Montenegro, Tunisie.

Aegrostis spica venti L. sp. pl. p. 91. Host fl. austri. I. p. 96. icon. gr. III. tab. 47. *Pan-*
 spica venti L. sp. pl. p. 91. Legit Panth. in prærieg circa Piperi in Montenegro, Tunisie.

VII. III. p. 338

Adonis Phoenicea Michelii L. v. v. retinaculata Guss. panicula breviter cylindrica - oblonga (L.)
 longa) subinervata in Panth. et ad. ad spiculam p. 15. Legit Panth. in prærieg montis Mati
 Durmitor in Montenegro, Tunisie. 4.

X Ad. *Lychnis Draba* L. sp. v. 1. tab. 5. adde sub *Lynodon Draba* Pers. Panth. 1. p. 18 locum ad
 vallis Virusa vallis Virusa -
 ad Calaminthos v. 1. p. 55 ad (1) glycyrrhiza DC. in prærieg sylvestris sub m. Durmitor
 (MN) Panier.

- II. *Pinus Peuce* Sp. s. 196ff. f. 319. *Panth.* l.c. p. 30 (excl. *Paxalsa*) *Pani.* cl. 107 p. 26
P. folia quinque striatis vireibus et strobilo regularibus, strobilo cylindraceo, longiori,
 dilatatis rufatis glabris, varine brachipinae atala.
 Hab. in nemoribus dicti Donji Vafopovici in m. Šekavica regno pagum Šekavica
 et Graianica - Myr. Motika, et in mont. Drakatovca Skali, gracissima
Drepana usivisticie Kruške dicti versus non in Albasio. Vire. Arbor.
 Ad *Pinum Abies* *Pinus Duroi*. Vis. l.c. p. 200 adde locum *P. picea* Rehd. ff. ex. p. 159 adde
 locum in monte Sappubica in Bičagom (Herceg.) et in m. Kom (MN) *Panth.* l.c. p. 30,
 sub m. Durmitor (MN) *Pani.* l.c. p. 86, et ad Borovicę regno montem Ponikę et
 Vareš (Bosnia) Šendžin. - Adiatur
Pinus excelsa Lam. fl. fr. II. p. 202
P. folia solitariae congre-gans numerosas, sub tetragonis, ut inque vireibus, non
 tibi cylindricis pendulis, ~~et~~ quinque croso-dentatibus parallelo bilobis
 Syn. *Pinus picea* Duroi Harb. v. 2. p. 110 *Abies excelsa* Poir. in Lam. cnc. p. VI. p.
 618. Rehd. ff. ex. p. 159.
 Icon. Rehd. 11. germ. XI. t. Rich. conif tab. XIV p. 2 et tab. XX. Cancer apud ff. p. 48.
 Hab. sub monte Durmitor, procedente vire, (MN) *Panti.* cl. ff. p. 86, et ad Borovicę
 regno m. Ponikę ad Vareš (Bosnia) Šendžin.
 Ad *Turiperum conicum* L. Vis. l.c. p. 206 adde locum in regnibus v. Sappubica in Bičagom
 (Herceg) in monte Kom et mali Durmitor (MN) *Panth.* l.c. p. 30
 Ad *I. oxycedrus* L. Vis. l.c. p. 202. adde locum in saxonij m. Glava prope Trebinje
 Draga prope Pridvorice (Herceg) *Panth.* l.c. et in saxonij m. Lovien (MN) *Panti.*
 in locis saxonij in multis Vrgor, Cassone et aliis (Dalm.) *Pant.* l.c. p. 61
 Ad *I. phoeniceum* L. Vis. H. Dalm. l.p. 203. adde locum in parte austro-orient. Vrgor et circa
 Parigrad (Dalm.) *Pant.* l.c.
 Ad *Ephedra canescens* (A. N. Mey.) Vis. l.c. adde locum in regnibus circa Trebinje
 (Herceg) *Panth.* l.c. et in regnibus ad Obrug (MN) *Pani.* l.c.
 Ad *Dactylis baccata* L. Vis. l.c. p. 205 adde locum in regnibus montis Durmitor (MN) *Panti.* l.c.
 Myr. Tijovina.
Ranunculaceae R. R.
 Vis. - H. Dalm. III. p. 194.
 Ad *Hippuridea vulgaris* L. Vis. l.c. p. 195 adde locum in appenn. circa Zara (Dalm.) *Panti.* l.c.
 et in Regno di Privighe us. Voglie (Dalm.)
 Ad *Callitrichis aquatica* L. Vis. l.c. p. 195 adde locum in appenn. circa Zara (Dalm.) *Panti.* l.c.
 et in Regno di Privighe us. Voglie (Dalm.) *Panti.* l.c. adde locum
 in aquarum circa Motka prope Bičla (MN) *Panth.* l.c. p. 30. et ad Vis. p. angustifolium L.
 II. Vol. l.c. adde syn. C. austriaca L. *Pant.* l.c. et locum in rivulo Šiben prope Danilov
 Grad. (MN), et ad Vis. p. heterophyllum Vis. l.c. adde syn. C. ovinae L. et locum ad Ovino
 regno Kiseljak Muria, Podjelovo ad Passin-Konak (Bosnia) Šendžin.
 Ad *Drosera rotundifolia* L. Vis. l.c. p. 195 adde locum in flaminis Čengericia Reka prope Reka et Placa (MN) *Pant.* l.c.
 Ad *Mycrophlebia spinicula* L. Vis. l.c. p. 195 adde locum in flaminis Trebinje prope Trebinje (Herceg) et in
 vicino Reka prope Placa (MN) *Pant.* l.c. et in loco Parigrad et Vrte Š. Belce ins. Voglie (Dalm.) *Pant.* l.c. p. 33.
 Ad *AK. verticillatum* L. Vis. l.c. in officinali in MN. *Pant.* l.c.

Florae Dalmaticae

Supplementum II
auctora

Roberto de Visiani
Bot. Prof.

Equisetaceæ DC.

Vis. fl. dalm. I pag. 34.

Equisatum sylvaticum L. sp. pl. p. 151b. Host fl. austri. II p. 624.

Rchb. fl. exs. p. 154. Panč. elench. pl. vase. in Crnagor. p. 102.

E. caule fructifero coactaneo ramis dense verticillatis arcuato-nutantibus, tetragonis verticillato-rainosis, ramis triquetris, vaginis concio-camporum nulatis, varicosis fissis, dentibus subulatis.

Icon. Ced. fl. dan. tab. 1182. Smi. engl. bot. tab. 1824

var. 3. capillare Milde fil. curv. et atlant. p. 223: majus, ramis recto-patentibus - Pantsh. adn. in fl. Her. p. 10.

Syn. E. capillare Hoffm. fl. germ. crypt. p. 3.

Hab. sp. in lacustribus sub monte Durmitor (Pančić); var. in sylvaticis circa pagum Lipovo (Pantsh.) in Montenegro. Jul. Perenn.

Equisetum Telmateja Ehrh. var. 3. breve Milde l.c. p. 219: caule abbreviatum (1') unicus ramoso. Hab. in sylvaticis circa Virčia in Bjelagora (Hercegovina) Pantsh.

var. 3. conosum Milde l.c. caule elongato (2'), inferne simplici nudo, ramis superioribus erecto-patentibus - Pantsh. l.c. p. 113: in sylvaticis vallis fluvialis Jara infra montem Kom. circa Nižin Luk et Stavniki (Montenegro) Pantsh.

Ad *Equisetum palustre* L. add. locum in paludibus Kladigrad prope Virčia in Bjelagora (Hercegovina) et in valle Virčia das supra montem Cima Planica (Pantsh. l.c. p. 113) et *Lycopodium* H. et Crmenespinosa Desf. Pantsh. dupl. 10 et locum ac humidi circa Cattaro (Dalm.)

Vis. fl. dalm. I. p. 35.

Zygodium selaginoides L. sp. pl. p. 155. Host fl. austri. II p. 681. Rchb. fl. exs. p. 153.
L. caule repente ramis adscendentibus foliis sparsis lanceolatis spinuloso-dentatae, spicis terminalibus sessilibus solitariis -

Syn. *Selaginella spinulosa* A. Braun apud Doell. Stein. fl. p. 58. Panth. l.
c. p. 12. *S. spinosa* Spring. non des. Lycopod. p. 82.
Icon. Dill. hist. musc. tab. 68 fig. 1. Sturm. fl. germ. tab. 5. Hall. fl. helv. tab.
45, f. 1.

Hab. in pratis circa locum Riblje Jezero infra Mali Garnitor in Monte
negro ubi legit Panth. Jul. Perenne.

Ad. *Lycopodium denticulatum* L. Vis. fl. dalm. I. p. 35 addi syn. *Selaginella*
helvetica Panth. l. c. p. 12 exct. syn. Spring. Inventa in ripistribus
montis Vermač prope Lattaro in Dalmatia. — *S. helvetica* Lindgr.
& *S. denticulata* L. foliis lateralibus caulinis obtaeniatis (sic) longe
exspaditis intermedias duplo majoribus, et rami apice spiniferis rectis,
inferne foliis minutis laxi vestitijs.

Filices Sw.

Vis. fl. dalm. I. p. 39 -

Post Aspidium lobatum Sw. addi

var. β. *Swartianum* Koch syn. fl. germ. II. p. 96 pinnulis oblique ovatis
falcatis petiolatis, infima superiora auriculata pinnatifida cæctivis subaliquo.
Syn. A. *aculeatum* Sw. syn. fil. p. 53. Panth. l. c. p. 12. A. *angulare* Kit. in Willd.
sp. fl. v. part I. p. 257. A. *hastulatum* Den. mem. fele. p. 25.

Icon. Lowe fern. brit. VI tab. 23. Den. l. c. tab. 11. fig. 2. Plichen. alm. tab. 180 fig. 3.
Hab. in Sylvaticis circa Crno Jezero infra montem Mali Garnitor (Montenegro)

Legit Panth. Jul. Perenne.

Ad *Aspidium rigidum* Sw. Vis. fl. dalm. I. p. 38 addi syn. *Asplenium* *Filix* *specimina*
Panth. l. c. p. 11 non Bernh. inventum in valle Virusa Dol infra Crna Planina
(Montenegro) et in sylvaticis montis Glava et Draga prope Trebinje
(Hercegovina); et *Asplenium alpestre* Panth. l. cit. non Mettenius, lectum
ab ipso in taxois montis Kom (Montenegro). Dein addatur sequens.

var. β. *pallidum* Bory, fronde bipinnatifida. Milde fl. europ. p. 122 — syn. A. *rigidum*
β. *austriacum* Den. mem. fele. l. c. p. 20 A. *Balanii* Panth. non Spenn. quod est forma A.
aureum Sw.

Icon. Den. l. c. tab. II fig. 4. A. B.

Hab. promiscue cum specie vulgarissima. Jul. Perenne.

Ad *Aspidium* *Filix* *mas* Sw. addatur Vis. fl. dalm. I. p. 38

var. β. *crenatum*: lacinia marginet et apice serratis. Milde sporogr. fl. 101. Panth.
l. c. p. 11.

Icon. Den. mem. fele. tab. I fig. A. B.

Hab. in sylvaticis vallis Perucica infra montem Kom (Montenegro) ubi legit Panth. Jul. Perenne.

Smilacaceae R.-Br.

Vis. 16. dlm. I. p. 158

Ad Polydium quadrifolium L. Vis. fl. dlm. I. p. 159. adde locum in sylvestris Virovia et infra montem Crna Planina (MN) et in summittate Mali Sandich (Bosnia) Sondner. ^{et iconem Röhl. tab. CCCXXXVII}

Ad Ruscum aculeatum L. Vis. I. c. adde loci in saxonis inter fructus pedem m. Veronae prope Cattan (Dalm.), circa Trbinje, Nedevišće, Gradičevac (Hercz), et Rieka, Manastir Duga et Povia (MN) Panth. I. c. p. 25, in saxonis ad Ostrog et supra Grahor Panic et pl. p. 90; in nemorosis silicis Borovo, M. Državac, Caprije, S. Elez, Čaprije in ins. Veglia, Domanac. I. c. p. 64. et ad Branduk prope Šabac (Bosnia) Sondner.

Ad Asparagus scabrum Brign. Vis. fl. dlm. I. p. 101 adde locum in solo Valgo argilloso et in Caprije Val Soline ins. Veglia Tommasi. I. c. p. 65. ^{tab. a marisco} Röhl. ic. germ. ^{fig. 961} et in hortis et terris prope Trbinje, circa Blatno, Partizan, etc.

Ad A. tenuissimum Linn. Vis. fl. dlm. III. p. 102 adde locum in sylvestribus Neksi (Ka Duga) ^{in hortis} et circa Skadarski Breg (Hercz) ^{p. 103} et in nemoribus silicis Borovo, M. Državac, Caprije, S. Elez, Čaprije (MN) Panic et pl. p. 89, et in tybericis savioyi m. Viškava, Beskarinova, Veglia in ins. Veglia (Dalm.) Tommasi. I. c. p. 63. et icon. Röhl. ic. germ. X. tab. CCCXIX fig. 969.

Ad Asparagus acutifolium L. Vis. fl. dlm. I. p. 161 adde locum in dumetis circa Trbinje et Bileći (Hercz) et Rieka (MN), in saxonis ad Cetinje, Ostrog, Danilov Grad, et Vis (MN) Panic. I. c. in dumetis et sylvis Veglia, Borovo, Caprije, S. Maria di Lago in Veglia (Dalm.) Tommasi. I. c. et icon. Röhl. ic. germ. X. tab. CCCXXIV fig. 922.

Ad Smilacem apetam L. Vis. I. c. p. 161 adde loci in sylvestris, calidioribus ins. Veglia, in Veglia, Caprije et Castelnuovo ^{dominica} (MN) Panic. I. c. p. 65. in saxonis ad Ver. dicitur. Caprije (MN) Panic. I. c. p. 90 et icon. Röhl. ic. germ. X. tab. CCCXXXVII fig. 960.

Ad Convallaria majalis L. Vis. fl. dlm. I. c. p. 162 adde locum in sylvestris montis Glava prope Trbinje (Hercz) et in Perucice Dol infra Kom. (MN) Panth. I. c. p. 25, in sylvestris m. Durmitor usque m. Stolac (MN) Panic. I. c. p. 89; in monte Vojnik (Bosnia) Sondner.

Ad Convallaria Polygonatum L. Vis. I. c. p. 162 adde locum in Perucice Dol infra Kom (MN) Panth. I. c. cum loco erroneo, et circa Borovoza (Bosnia) Sondner. Adde iconem Röhl. ic. germ. X. tab. CCCXXXIV fig. 964.

Ad Convallaria multiflora L. Vis. I. c. adde locum in sylvestris m. Glava prope Trbinje (Hercz) et ad Borovoza supra montem Ponikva ad Varesch (Bosnia) Sondner. et iconem Röhl. ic. germ. X. tab. CCCXXXIII fig. 962. — Addatur

Convallaria verticillata L. Vis. sp. pl. p. 480. Host fl. austro. I. p. 440 Röhl. sp. ex. p. 100. C. caule erecto angustato, foliis verticillatis linearis - lanceolatis planis, perianthiis subciliatis.

Icon. Röhl. ic. germ. X. tab. CCCXXXV fig. 966. Sm. engl. sit. t. 128. Ord. fl. don. t. 66.
Hab. in pratis vallis Perucice infra Kom, et in Sivnjavina Planina (MN) Panth. ad p. 25 in sylvestribus sub m. Durmitor (MN) Panic et pl. p. 89, et a Borovoza supra montem Ponikva ad Varesch (Bosnia) Sondner, et a Mali Sandich ad Baklari (Bosnia) Sondner. H. alti, apie viventes, H. Mayo. Perenn.

2° p. 66-67

Dioscoreae R. Br.

Vis. fl. dalm. 5 p. 163

Ad Tamum communem L. Vis. fl. dalm. 5 p. 164 ad locum ad septem circa
Ragusa (Dalm.) Trebinje et Bileki (Hercegov.) Panth. ad p. 25, in
dumetis ad Obrlog, et ad caenosium S. Stephani vallis Moraca superioris Panth.
el. pl. p. 90. et circa Slavich, et ad Baklari (Bosnia) Senft. et ad septem circa
Bornib, monte Triskavar, Capriac, S. Elena, Comps. (Dalm.) Tommas. t. c. p. 64

Orchidaceae L. Vis. fl. dalm. 5 p. 164.

Ad Platanthem bifoliam Risch. Vis. fl. dalm. 2 p. 165 ad locos & Graovik ad Cenizza
et Varish et Lavinethes ad Ernichovayam ad Sutynska, et Borovica (Bosnia)
et icon. Ad locis ad Cenizza et ad Cetinam ad locis in montibus m. Glava prope
Trebinje (Hercegov.) Panth. t. c. p. 28, ad loca umbrosa Paprda et Gasic ins. Veglia

Tommas. t. c. p. 62 et ad Ebendahin et Borovica (Bosnia) Panth. t. c. p. 28 et ad locis
integritate Orchidum Morio L. Vis. fl. dalm. 5 p. 166 ad locum in pratis m. Glava prope Trebinje

I ad circa Bileki (Hercegov.) et in Virija Dol infra m. Cna Planina (M. H.) Panth. t. c.
p. 26, et in ins. Veglia ad S. Elena et Bosco fuscoculato (Dalm.) Tommas. t. c.
p. 62; a Gradaschaz ad Trebenick, ad Pashchimouak super Lardorick, Lebische
Labina, et ad Vranduk, ad Ebendahin, et in Borovica (Bosnia) Senft. Huic

III ad Orchidem provincialem Barb. R. f. c. p. 167. ad locis isti raro circa Ragusa.
(Dalm.) in monte Glava, Crkvice et Drixa prope Trebinje (Hercegov.), et ad Veglia
S. Maria d'Capo, Dobrinje et Bosco fuscoculato in ins. Veglia (Dalm.) Tommas.
t. c. p. 62 cum var. leccostachys Gris.

VI Ad Orchidem laxifloram Lam. Vis. 5. t. c. ad locum in pratis turfosis circa Skodjeigrin
in Bjelagora (Hercegov.) Panth. t. c. et in pratis pallidis ad Capriccio, Valle si Besca,
Lobrinje in ins. Veglia (Dalm.) Tommas. t. c. p. 62. Post addatur
ad Orchidem H. N. Willd. Vis. fl. dalm. 5 p. 166. gen. Orchis sp. anthy. O. quadriflora gr. in Targ. p. 164 et exd. nom.
Et huc Irisbachia Panth. ad p. 27.

O. labellum suborbiculatum integrum, basi cuneato, perianthii ~~laxius~~ exterioribus oblongo-ram-
tis, internis oblongis obtusiusulis, calice conico-cylindraceo ovarium dimidium subne-
quante, bracteis acutis flores inferiores superantibus, spica sex-multiflora laxius
cula, foliis oblongo-lanceolatis acutis, superioribus bracteiformibus

Hab. in pratis humidis Virija Dol infra montem Cna Planina, et in Peruvica Dol.
infra Kom. Flora purpurea, labellum cincis et punctis saturationibus. Labellum
magnum. Ovario contorta. Radice tubero oblonga divisa. fl. summo - Perennies.

* subspicatae Orchis Morio, 3 pista cum syn. O. picta Loisel. in pratis siccis Dobrinje
Rastovastno ins. Veglia (Dalm.) Tommas. t. c. p. 62. Deinde ridentur

arvensis Schult.

Ad *Gagea lutea* Viz. f. delin. p. 142 adde locum in agro circuca Trebinje et in m. Dravici prope
Privoce (Herceg) Pantk. l.c. p. 23 - Adhuc ter
Syza lateriflora Boem. et Schult. syst. veg. 1. p. 538. Nchb. f. 7 ex 6. p. 108. Pantk. adn. p. 23
G. bulbos ovata, folio radicale nunc ~~basale~~ ~~opposita~~ ~~opposita~~ ciliata, perianthio glabris, perianthis
phyllis oblongis obtusis

Syn. *Brixiogalum luteum* L. sp. 6. p. 639. Host f. austri I. p. 429

Icon. Nchb. ic. gemm. X. tab CCC LXXVII. f. 100. Sm. engl. Bot. tab. 21

Hab. in sylocticijs Peruvica Dol iugra Kone (M.N.) Pantk. et a Bukovica ad Trovnik et in
m. Slavonija (Bosnia) Sedatner.

Ad *Muscari botryoides* Mill. Viz. f. delin. 2. p. 140. Add locum in saxonij graminis
m. Tastrebića in Bišelagovo (Herceg) ^{et in Koljaj (M.N.)} Pantk. l.c. p. 24 et a Bukovica ad Trovnik in m. Vlasici
(Bosnia) Sedatner - in sylocticijs m. Sutorman (M.N.) Pantk. l.c. p. 92

Ad *M. comosum* Mill. Viz. l.c. adde locum in agri et graminis circa Trebinje, Bišteki
(Herceg) Pon cultis vineis ad Beramovo, Dobrinje, Neglie (Dalm.) Pomm. l.c. p. 65

Ad *M. comosum* Mill. Viz. l.c. adde locum in agri, circi Trebinje (Dalm.) ad Trebinje, Mla
Ko (Herceg) Cettina ^{f. 24} Pantk. l.c. p. 24 et in Cetina (Pantk.) Lovien (M.N.) Pantk. l.c. p. 92
Muscari neglectum Guett. in Dekor. fl. neap. 1911. app. 3. p. 13 et syn. fl. n. I. p. 411. Pantk.
M. foliis angustis linearibus canaliculatis, terminali latiss. capite tubae quantibus, racemo
triori densissimo, floribus pedunculatis retortis, segmentis neutris erecto-pubes-
tibus, perianthio oblongo, dentibus oblongis recurvis

Syn. Botryanthus neglectus Kunth exim. fl. IV. p. 639. Pantk. f. ist. typ. 502.

Hab. in graminis circa Trebinje ad flumen Trebinjica (Herceg) Pantk.

Obs. Ad *M. moschatum* Viz. citatur a Sedatner in equidem catalogo fl. Bosniacarum sub n°
1228, ~~ut postea lectio a~~ Cenida super Kolosici ad Sutgarha: sed deest in herbario.
ejusdem in Museo Monacensi servata.

Ad *Anthericum ramosum* L. Viz. f. delin. 1. p. 151. adde locum in coliby sylocticijs Neglie, Cet-
nic, Cetinensis ins. Neglie (Dalm.) Pomm. veg. Veg. p. 64, in lopidisijs m. Glina prope Tre-
binje (Herceg) et in saxonij Noviye Gorne dicitur prope Guožd Han (M.N.) Pantk. l.c. p. 25, et
ad Trovnik ad Lipja, supra Sutjaga ad Kopitnica (Bosnia) Sedatner.

18. Ad *Anthericum Liliago* L. Viz. l.c. adde locum in lopidisijs m. Glina prope Trebinje (Herceg) Pantk. l.c.
et in portis Mettempo (Dalm.) in ins. Neglie Pomm. l.c.

19. Ad *Erythronium Dens canis* L. Viz. f. delin. 1. p. 154, adde locum in sylocticijs m. Tastrebića
in Bišelagovo (Herceg) Pantk. l.c. p. 23, ad Prusac, et ad Gradac usque ad Slavonija (Bosnia)
Sedatner.

Cochleariae L. Vis. K. N. 5 p. 155

Ad *Vestrum* albary L. V. fl. dolm. I. p. 185 ad locum in pratis montis *Lector*, prope Drvle-
ve, in Medov Dol, circa Begove Korita infra m. Tarnobice, in iugo et in ~~valle~~
valle *Radius Brod* in Bjeljegora (Hercy) in *Vivija* Dol et ea me *Cona Marinica*
in parvij m. Rom, *Sauvaginea* *Placina* in Male Duvnici et in prati *Laster*
Coska dicti super *Voinici* (M.W.) *Pantz.* l.c. p. 23; in pratis pinguisibus nec m.
Durnicor (M.W.) *Pantz.* l.c. p. 92; ab *Bursino* super *Kiseljak*, *Duria*, Berg Podrebar
a *Vranduk* ad *Bukovica* et alibi (Bosnia) *Sent.* Stuc adde

~~var.~~ *β*-*Lobelianum* Koch syn. *gymn.* II. p. 836: floribus & lute viridibus. *γκ.* *β*-*Lobelianum*
Benzk. in *Romnisdorf* journ. V. 16 p. 200. *Ribb.* p. 97. *Icon.* *Ribb.* II. *gymn.* X. tab. CCCXXII f. 338
Hab. a *Borovica* super m. *Ponikor* ad *Vareni*, et a *Male Sandik* ad regna *Balkeri*.
(Bosnia) *Sent.*

Ad *Vestrum nigram* L. V. fl. l.c. ad locum in prati m. *Laster* *Coska* dicti super *Voi-*
nici (M.W.) *Pantz.* l.c.; et in herbitis ac saxonibus in *Nichitska* *Zupa* (M.W.) *Pant.* l.c., et
a *Begir-Beg-Konak* ad *Suzia* (Bosnia) *Sent.*

Ad *Colechii* sp. Vis. l.c. p. 155 adde

Colechium autumnale L. sp. fl. p. 485. *Hort. Mant.* I. p. 403 *Achb.* fl. ex. p. 92 (?)

C. foliis hysteranthis late lanceolatis utrinque attenuatis, perianthio limbo tubo multo
superiori laciniis undulato-nervosis lanceolatis unicostatis

Icon. *Achb.* II. *gymn.* X. tab. CCCXV f. 949. *I. M. engl.* bot. 133. *Sturm.* deutsch. fl. n. 3. *Gastr.* de fruct sem. l. tab.
Hab. in pratis sub monte *Durnicor*; in asperis et agrestis erexit alia forma, capitulo basi
obtusif. prospicente umbilicata; florente non visa. *Pant.* fl. p. 92. ad *Vranduk* prope *Se-*
sche (Bosnia) *Sent.*

Ad *Colechium Bentzelianum* Stev. V. fl. dolm. I. p. 156. (*C. montanum* L. Vis. fl. dolm. n. 4 p. 86) adde
locum in saxonibus ad pedem m. *Gleva* prope *Drvne* (Hercy) *Pantz.* l.c. p. 23. *Post.* *Idem*

Colechium Kochii *Pant.* fl. lat. III. p. 188. *Domunzian.* veg. Seg. p. 65

C. foliis hysteranthis lanceolato-lanceolatis utrinque attenuatis, canaliculatis,
perianthio limbo tubo subtriangulari superiori, laciniis anguste lanceo-lanceolatis
interioribus paulo minoribus recte nervosis, unicostatis, stylis apice incurvis.

Syn. *C. arenarium* Koch syn. fl. gom. II. p. 836, non *Walt.* *Koch.*

Stob. in locis herbitis *S. Maria* et *Loco*, et in rupibus *S. Maria* et *Pericella* ins. *Veleia* (Dalm.)
Tummas. l.c. H. vix. H. Octobr. Novembri. Perenn.

Obs. Ab hoc differt *C. arenarium* *Walt.* floribus majoribus, laciniis latioribus oblongo-lanceolatis
angustatis rotatibus, stylis rectis, foliis altioribus.

- 1 Ad *Veronicae longifoliam* L. Virg. t.c.p. 168 ad hoc nom. Richb. f. rigore
 tab. MDCCXIV.
Veronica Verna L. sp. pl. p. 19. Host fl. austr. I. p. 18. Richb. fl. ex. p. 356. Panth. t.c.
 I pubescens (aude exstincta) ovalibus inservit. umbra-
 floribus canes lati, oblique punctati-puncta-
 ti, canis ramisque racemoso-apicatis pediculis eructis ciliatis inservit. lumen
 minute binioribus, capilla obtusa, unipetala - low engl. bot. tab. 23
 Non Richb. f. rigore XX tab. MDCCXIX f. 1. Sturm & fl. 1. 13. Riu. mon. irr. t. 96.
 Hab. in gramineis circa Cettigne et in Verda Doli infra Civitatem Plana (MN) &
 Panth. Il caeruleante, vix intertincto. H. vere. Anna.
- 2 *Veronica aglylla* L. sp. pl. 14. Host fl. austr. I. p. 10. Richb. fl. ex. p. 368. Panth.
 t.c. 21. Alsch. et Kar. cat. fl. herb. p. 59.
 subhirsuta, bracteis schizantibus
 i. caule repente, foliis ellipticis oblongatis subsecantibus racemo subrotundato. lumen
 brachis laevigatis ciliatis oblongis obtusis,
 sequitur lumen ellipticis primitivis credidit, capsula oblonga longioribus
 brachis. Richb. f. 1. c. 160 MDCCXVII f. 1. - Boiss. Fl. Balk. p. 19. L. S. et G. L. S. p. 100.
 tab. fig. 2. p. 334 tab. 114 f. 3. Wet. Kip. III tab. 245.
 Hab. in affixis elationibus montibus Durmitor et m. Korn. (MN) Panth.
21. Ad *Veronicae hederaefoliam* L. Virg. t.c. ad locum in calidis ins. Dalmatia (Dalm.)
 Dalmatia. t.c. p. 53. et in Bohemia ad Prachat et circa Egerias, et hinc
 ad Trebovicum (Boh.) Scutella et ibid. tab. MDCLXXXVIII. f. III
 22. Ad *Veronicae Gynbalansae* Bod. Virg. t.c. ad locum in eis circa Zara, et in
 isti ins. Ragusa (Dalm.) et Trebovicum et Bileteki (Hercy.) Panth. t.c., et in
 Prusac (Boh.) Tendza, et ibid. Richb. f. rigore XX tab. MDCLXVIII f. III. se
 Flores rotos nec albi ut in specie.
23. *Veronica suecata* L. sp. pl. Richb. fl. ex. p. 367
Veronica prostrata L. sp. pl. p. 17. Host fl. austr. 24. Richb. fl. ex. p. 388. Panth. t.c. p. 70
 V. prostrata, capitulis oblongis subrotundatis, lumen
 ciliatum, foliis breviter petiolatis linearibus camellatis, apice rotundatis, basi subintegritate,
 racemis axillaris superioribus rotundatis, racemis axillaris inferioribus apicatis, pediculis
 capitulo oblongis subrotundatis, calyculis quinquepartitis valde innervatis,
 Richb. f. rigore XX tab. inde 241. Boiss. Fl. Balk. p. 10. Riu. mon. irr. tab. 98. Siles. t.c.
 tab. 100. sed III tab. 28 fig. 26.
 Hab. in herbis circa Dubrovac in Pilegorni (Hercy.) et circa pagum Kovilje infra Mont. Dalmatia. Richb. f. rigore XX tab. 241. Boiss. Fl. Balk. p. 10. Riu. mon. irr. tab. 98. Siles. t.c.
 Durmitor. (MN) Panth. Obs. V. prostrata Host fl. austr. t. p. 13 diff. alpe quadrivalvata.

Ad Samolium Valerianum R. Br. Ad Salicem II p. 146
L. L. R. l. c. p. 147, ad locum in polystriis maritimi Bonnieri,
 et varia, et in laetis Carex et Parvula in vegeta (Salicis) Bonnieri. l. c. p. 36. Panth. l.
 et in aqua aera lotus (Salicis). Primulaceae Vent.

R. Br. Salicem II p. 147

No. Cyclamen bedereffelii Ait. R. Br. l. c. p. 148 ad locum in saxonis super fratre
 et ad viam qua iter e desculci versus Gerhore (MN) Panth. l. c. p. 39 dicimus
 Ad Cyclamen hirsutum Rebh. Br. l. c. ad locum in lapidosis montis Rivo prope
 Rehinge (Hercy) Panth. ad. p. 35 loco et in vegetibz ad concavas Oppoz. et
 super Rivo (MN), et in locis herbis et sylvestris Sante Maria d' Eys. Veyre
 et in sylvestris S. Elena (Salicis) Bonnieri. l. c. p. 36. (non Cypripedium Schlecht.).
 Ad Primulam acutum L. R. Br. l. c. p. 149. ad locum in denudatis ad Letting et in
 sylvestribz sub m. Tutevian (MN) Panth. l. c. p. 39, in nemoribus raro, ad S. Maria
 d' Eys (Salicis) Bonnieri. et in Buhorija ex parte Domnick (Bom) Schlechtner
 Ad Primulam suaveolentem Bert. R. Br. l. c. ad locum in sylvestribz super Dubrovnik
 et in m. Apennina in Bielogor (Hercy) et in Kringa Et in pr. Ora Planina
 metu et in Primula Et in pr. Kom (MN) Panth. l. c. etia Buhorija subita (Bom) Schlechtner
 et in saxonis tabis nonne Buhorija ex parte Domnick (MN) Panth. l. c. p. 36. Polyanthus Panth.
 Ad Primulam latifoliae Eng. R. Br. l. c. ad locum in umbrosis montibus

Plana prope Rehinge (Hercy) Panth. l. c.

Ob. Aut. additur a Panth. l. c. Primula longiloba All. et declivibus herbis in Durnitor
 iuge Syrene (MN) et Pr. intricata Griseb. in saxonis m. Durnitor, sed
 neutrum videt. — Additur genus

Soldanella

Gen. p. 139.

Cheir. lobos quinquefatis. corolla campanulata quinquefida. basius multijug. capite
 apice idemrispe dehincus, ore post dehincus multijugato. Clas. Pentamer.
 Ord. Monocotyled.

Soldanella montana Willd. ex. H. Carol. l. p. 192. Hartt f. austri. p. 232. Rebh. f. ex. Rebh.
S. folia substans uniformiter remota subrenata. Capitulum quatuordecim folio, pedunculo petiolato glan-
 duloso.

Hab. R. Br. f. ex. gen. XVII tab. XXXVII. Hartt f. austri. p. 216 sal. S. Clusii.

Hab. in graminosis circa pagum Kovice in pr. monte Molni Durnitor (MN) Panth. l. c.
 H. Mayo, Junie. H. violacei. Pannus.

Soldanella apina L. sp. p. 296. Hartt f. austri. p. 233. Rebh. f. ex. Rebh.

L. folia uniforme - substans integra vel subapicata, scapo bi-quadrifloro, pedunculo
 rotundato glanduloso sessilibus.

Hab. R. Br. f. ex. gen. I. l. tab. XXXVIII. Hartt f. austri. tab. XXII. Hartt f. austri. tab. XXII
 et tab. XXIII. Hartt f. austri. tab. XXIV. Hartt f. austri. tab. XXV. Hartt f. austri.
 Hab. in pr. apennis monte Kom et Molni Durnitor (MN) Panth. l. c. H. lacordairei
 tristis. H. Mayo, Junie. Pannus.

Ad Androspermum villosum L. Vgl. l. c. p. 180 et locum in saxonis montibus Molni Durnitor (MN)
 Panth. ad. p. 35 cum syn. Panth. l. c. p. 38 in iugo Syrene (MN)

~~Leptodactylis~~ R. Br.

Lyssimachia

Rd Lychnis chionia vulgaris L. Riff. t. c. p. 150 ad locum in ~~humidis~~ ^{fluctuans} circa ~~Trinj~~ ^{Trinj}
in Pileum (Hercz) et ore Cetina (M.N.) Pant. l.c. p. 151
Ad Lychnis chionia punctata L. Riff. t. c. p. 151 ad locum in umbris ad rivo locum ~~humidum~~ ^{humidum}
prope Danilov grad (M.N.) Pant. l.c. et ad rivo et rivo loca Popović et
mis. Vrgin (Dalm.) Tommasi t. c. p. 56 et super Sutjaga verus Leptilonia (Bors.)
Seneca

Ad Lychnis chionia humilioris L. Riff. t. c. ad locum in humidis circa Trinj (Hercz), Niem.
et Danielov grad (M.N.) Pant. l.c. in Lomniaceto (Dalm.) Mart. Baum.
Ad Lychnis chionia Linnae stellata L. Riff. t. c. ad locum ~~ad eam~~ ^{ad eam} et casta Leptilonia (Bors.)
Ad Anagallis arvensis et -oenica Riff. t. c. ad locum sub Aranum Lin culta
ore Cattaro (Dalm.) Trinj, Bitković, Graničarsko (Hercz) et Cetina, Kastel, Danilo
grad (M.N.) Pant. l.c. p. 155, & in maritimis Vrgin (Dalm.) Tommasi t. c. ad Tropišće
Kiseloje, Lepenac prope Nin (Dalm.) Seneca cum sequente et ad R. B. nebulosa
in uero circa Trinj (Hercz) et Cetina (M.N.) Pant. l.c.; in cultu Vrbovsko, Beli
Vrgin, Gornje (Dalm.) Tommasi t. c. Ad natum

Centaurium L.
Germ. pl. n. 165

Char. Elyx quidipartitus. Corolla tubus pubescentio ^{immissus} limbo quadri-patello
patente. Stamini quatuor. Capitulum unum ^{inclusum} ^{polyporum} — Cl. Dicotomie Ord. Monogynia
Syst. 10th.
Herb. ^{ad} Centaurium minimas L. t. c. p. 159. Heik. Flav. str. t. p. 214. Rehb. p. 408. Pant. l.c. p. 155
provenientem ^{ad} ramosa annua. Calyx subunguis ^{ad} v. folia alterne rami
integerrimo erato. Flores axillares rami Cetini. Ut alio ^{ad} auctate.
Herb. in agresti jasmini et locis humidis ad rivulum Sutjago prope Danilov grad (M.N.) Pant.
Tear. Rehb. p. 409. t. c. p. 155. Cetina t. p. 157. Sturm. p. 130. Sov. engl. t. 531.

Zygophyllaceae Richter

St. pers. t. p. 26

Ad Veronicam austriacam L. Riff. Dalm. t. p. 116 ad 150

Ad *Euphorbiam officinalis* L. Vis. b. c. p. 174. ad locum in graminis circa

Trboje (Horug) et Danilevo Gradi (MN) sub E. op. protinus Koch, usque usq.
ad Mikrska Lipa, in parvus mortis via et sub m. Koni (MN) Panth. p. 21
et ad Var. nemoria Pet. et Var. stricta Host in grati circa Orakovac et
Bielagovo (Horug) et in Crni Dol impr. una Planina et Pernica
Dol impr. Koni (MN) Panth. le p. 21 sub Var. y. lateturus p. 21.

in grati Pernica Dol impr. Koni et in m. Mal Durmitor (MN) Panth. le p. 21
in rupibus m. Lovcen Durmitor et Javorje (MN) Panth. le p. 21 et ad latit
ad ~~hostiles~~ ^{hostiles} florae. f. XX tab. ADCCXXVII. f. IV. et ADCCXXVIII.
Ad *Euphorbiae* (Dimitris) p. 21. Vis. b. c. sub locum in herbas vallis Berea ^{MN} tab.
(Dalm.) Domus. b. c. p. 21. ~~hostiles~~ f. I. et tab. ADCCXXVIII. f. 1.

Ad *Euphorbium tuleanum* L. Vis. b. c. p. 185. ad locum in Valle de Berea, legume p. 21
in apricis m. Javorje et in vallis loco ~~tab. ADCCXXVII. f. 21.~~ tab. ADCCXXVII. f. 21. tab. ADCCXXIX. f. 1.

Ad *Euphorbiam latifolium* L. Vis. b. c. p. 183 ad locum in gramineis circa Podgora
prope Trboje et Bielki (Horug) Panth. b. c. sub *Euphorbia* Gris. et ad
civium Reba f. b. c. XX tab. ADCCXXV. f. IV.

Ad *Euphorbiam Urticea* K. M. delin. p. 173 ad iconam Rebb. f. b. c. tab. ADCCXXIV.

Udve genera

Bartsia Tonja L.

Sen. pl. n. 745

Char. Calyx quadridentatus. Corolla tuba cylindrica supra ampliata
lacinia bilabiata, lobe superior bilobata inferior trilobata, lobi subaequalib; lacinia
rumpa bilobulata, lacinia biorbata. Capsula monoicaria Koch. syn. f. g. m. II
p. 620. — Cl. Syph. ex. Didiynamia Ord. Augioperme sp. p. 10.

Tonja Linn. f. sp. pl. sp. Host. Monogr. sp. 189. Rebb. Pl. ex. p. 357. Panth. b. c. p. 18.
Tonja Host. in numeris taxon. et locum Coss. Tzec. impr. Male Durmitor (MN) Panth.

H. pl. 1. lobi inferior sanguineo-purpureo. H. acetosa. Peruv.

A Bartsia L.

Sen. f. 1. p. 363.

Char. Corolla campanulata quadridentata quadrifida. Corolla labiate, tube angusta, limb
lobi superior formate inferiore trifida. Stanium diynamum basi lobi affixa,
anthem monomat. Ovario multilobatum lobi logistic alterna, seminibus can
prospic carinatis atatis. Clas. di dynamia Ord. Augioperme sp. p. 10.

Bartsia apina f. sp. pl. p. 839. Host. f. austri. f. 281. Rebb. Pl. ex. p. 360. Panth. b. c. p. 22.
B. velutina opposit. coryn. excurrent. lobi oblongi, subaequalib; lobi superius

Icon. Rebb. f. 1. et gam. x tab. ADCCXXV. f. 1. et. — Lowry ex. lot. f. 361. Rebb. f. 1. et. tab. XLIII.

Hab. in parvus silvis montium Koni et Male Durmitor (MN) Panth. Flores violacei.
H. acerata Penn.

Ad Pedicularis frigidae Bungei Domus. b. c. Pl. f. p. 186 ad locum in partibus montibus Glava
prope Rebiage (Horug) Panth. b. c. p. 22 et ad esse issem. Rebb. f. 1.
Ad pedicularis concolor L. b. c. p. 176 ad locum in partibus m. Javorje et in Kukuraj. Pl.
de sub m. Koni (MN) Panth. b. c. p. 22. et iconem Rebb. f. 1. et. XX tab. ADCCXVII tab. ADCCXVII.

Pedicularis pubescens L. b. c. f. p. 345. Host. Pl. f. 11. p. 168. Rebb. Pl. ex. 363. Panth. b. c. p. 22.
P. pubescens pubescens f. p. 345. oblonga plana f. 1. floribus axillariis, lobi subaequalib;
truncato angusti in dentibus tubulatum producta. Rebb. Pl. f. 1. tab. 53. f. 5.
Icon. Rebb. f. 1. et gam. x tab. ADCCXXV. f. 1. et. — Lowry ex. lot. f. 369. Gaster. ex. f. 1. tab. 53. f. 5.

Hab. in partibus humidi Viriae Los infra (vma Planina, et ad rivulum Riwam volta
infra mali Durnitor (MN) Pant. T. et Peram. aut biuncis H. auctate Et vere.

6 Pedicularis foliosa L. mant. f. p. 36. Herb. f. 191. Reb. f. 191. 363.

Pediculus fasciculata, foliis pinnatis-partitis pinnatis oblongo-lanceolatis pinnatis bipartit, specie
obtusata calyculis quinque-dentata, dentibus brevibus rotundatis oblongo-lanceolatis brevibus
obtusis, corolla galba inflexa - corolla tubularis aperte quam triseratim
utriusque uncinata, filamentis basi villosis.

Hab. in Ried. f. l.c. tab. METC. VI. ~~tab. 10~~ f. 191 et Tab. f. austri II. tab. 159.

Hab. in monte Slovensk regn. Drucker (Reg. Dr.). Senitri. H. velutina. H. auctate Peram.
Pediculus Hasquette Grap. in Bot. Zeit. 17. 1-12. Klich exq. figuram II. p. 625. Reb. f. 191

Pediculus bracteatus superioribus pinnatis-partitis, pedunculis pinnatis bipartitis, pinnatis lanceolatis
lanceolatis, corolla galba superciliis obtusis, calypsis levigatis, corolla tubularis aperte quam
3-5 dentata dentibus triangularibus, filamentis apice dense barbatis.

Hab. in monte Slovensk regn. Drucker (Reg. Dr.). Pant. f. 191. Reb. f. 191. p. 25. Pant. f. 191. p. 14.
Hab. in monte Slovensk regn. Drucker (Reg. Dr.). Pant. f. 191. p. 25. Pant. f. 191. p. 14.
Hab. in monte Slovensk regn. Drucker (Reg. Dr.). Pant. f. 191. p. 25. Pant. f. 191. p. 14.

3. * Pedicularis tenuifolia. L. sp. ff. sum. II. p. 17. Pant. f. 191. Reb. f. 191. exq. figuram XX. p. 10-11.
Pediculus fasciculata, foliis rotundatis, foliis pinnatis-partitis, calycis pinnatis-partitis, calypsis
quinquedentata dentibus lanceolatis acuminatis, corolla galba inflexa aurita, pars
specie bracteatim in dentem triangulari subtiliter ubiq' producita, filamentis

specie bracteatis, filoibus.

Hab. f. 191. ~~tab. 10~~ f. 191. non Sommer et exq. figuram.

Hab. f. 191. f. 191. non Sommer et exq. figuram.

Hab. in apertisibus montium Lirano, Sitali et Ghajat, Prologhi (Bala) et in monte Slovensk
regni Dukarai (Bala) Senitri. H. auctate Peram.

2. Pedicularis glabra Augusti Domini, in Lirano vob. 183. p. 69 et 74. t. 11. fig. 14. f. 10. f. 26.
P. radiis fibris foliis bipinnatis-partitis, perfoliatis, foliis rotundatis, calycis dentibus 5-5 dentatis
et dentibus lanceolatis, corolla galba curvata prope apicum tenuissime tenuissime rotundata
et laevata pars petioli.

Hab. f. 191. f. 191. non Sommer et exq. figuram.

Hab. in præg. in Silesia prop. Dubovac (Barv.) Pant. f. 191. p. 27. f. 11. Schleicher. H. auctate Peram. exq. obs.

4. Pedicularis lithorhiza Boiss. Magn. pl. or. IV. p. 83. Bentw. in DC. protos. p. 372. Pant. f. 191. p. 12.
Pediculus lithorhiza Boiss. Magn. pl. or. IV. p. 83. Bentw. in DC. protos. p. 372. Pant. f. 191. p. 12.
Pediculus foliosa f. glabra Boiss. exq. figuram.

Tanata, bracteis inflexis trifidis, superiores induplicatae, calyx inflatus 5-nervis 2-nervis tanata
corolla galba duplo longior tubulus interius tubo subincurva, galba breviter rotundata
apice in dentes duos triangulares de latere incurvatos produncta, labio inferiore
glaberrima, filamentis duplo pilosa, capitulo oblongo-subincurva aucta veluti rubiginosa
sub. f. 191. f. 191. f. 191. non Pant. f. 191. non Pant. f. 191. non Pant. f. 191.

Hab. in partibus circa Belgrave Korita in Bjelagor (Harv.) in monte Kom circa lagum
Korita et in monte Seli Durnitor (MN) Pant. f. 191. f. 191. H. auctate Peram. f. 191. et
var. f. 191. f. 191.

Hab. in partibus circa Dubovac in Bjelagor (Harv.) Pant. f. 191. f. 191. H. auctate Peram.
var. f. 191. f. 191.

Hab. in partibus circa Dubovac in Bjelagor (Harv.) Pant. f. 191. f. 191. H. auctate Peram.
var. f. 191. f. 191.

Obs. P. ochroleuca Schlech. et Pant. est eadem ac var. 3. P. lithorhiza Boiss. est sive et Reb. sive est
species distincta, quod si quibus plantas rurales confundit sive datum est, iudicandum - Ha quecum debet de P. exaltata Weiss.

Pedicularis verticillata L. sp. p. 846. Host. Fl. Baug. p. 193. Rebb. p. 361.

P. Pedicularis verticillata L. sp. p. 846. Host. Fl. Baug. p. 193. Rebb. p. 361.
 Pedicularis verticillata L. sp. p. 846. Host. Fl. Baug. p. 193. Rebb. p. 361.
 Pedicularis verticillata L. sp. p. 846. Host. Fl. Baug. p. 193. Rebb. p. 361.
 Pedicularis verticillata L. sp. p. 846. Host. Fl. Baug. p. 193. Rebb. p. 361.
 Pedicularis verticillata L. sp. p. 846. Host. Fl. Baug. p. 193. Rebb. p. 361.

Hab. in graminis alpini monti Kom. Sinjajina Planina et Mali Dvorinac (M.N.)
 Panth. l.c. in glaciis monti Dvorinac et sub m. kom (M.N.) Panth. l.c. p. 72. et in monte
 Vrachich rupor Balkari (Bosn.) Sredna Gora p. 16. et in monte Vrachich rupor Balkari (Bosn.) Sredna Gora p. 16.

Ad Rhinanthus Costa Galli L. sp. p. 846. ad Rhinanthus in partis monti Glava, circa
 Trebinje (Herceg), circa Bileki (Herceg) et Cetinje (M.N.) Panth. l.c. et in elevationibus
 herbitis m. Kom (M.N.) Panth. l.c. p. 23. et circa Novak, et Balkari (Bosn.) Sredna Gora, et ad
 sub Međevljima Rukoj. l.c. tab. XXXVIII. ad var. B. angustifolius Adr. syn. P. angustifolius
 l.c. p. 23. et in locis sub monte Glava, circa Novak, et Cetinje
 Dol et Jaza Dol (M.N.) Panth. l.c. ad var. Rukoj. l.c. tab. MDCCLX.

Ad Rhinanthus Aleutostaphylos Poll. Vis. p. 10. l.c. p. 387 ad Rhinanthus in monte
 Velika Istreblec et in partis sub m. Dvorinac (M.N.) Panth. l.c. p. 73. et in gramineis
 et circa Novak, et Husa Fellaich (Bosnia) Sredna Gora, et ad var. Rukoj. l.c. tab. MDCCLXIX.

Ad Rhinanthus majorum Poll. Vis. p. 10. l.c. in gramineis circa Trbinje, et in valle Radov Brdo

prope Vracia in Bjelajica (Herceg) Panth. l.c. et in sativa Uglješa, Cetinje (M.N.) Panth. l.c.
 et ianum Rukoj. l.c. tab. Adiutor.

Rhinanthus alpinus Bawing en. sp. p. 194. Hoch. 19n. H. gen. n. 1627
 Rh. foliis obovato-lanceolatis, petiolis longe attenuatis, bracteis decurrentibus, radice supra
 rhizis levigata, rotundata, dentibus subulatis longe angustatis, galea cordata, apicem rotundata,
 lacinia ciliata, patente.

Type Rh. Crisp. Galli B. L. sp. p. 846. Rh. Crisp. Galli var. P. alpestris Wahl. f. c. age p. 866.
 Non Rebb. f. c. in germ. l.c. tab. 1.
 Hab. in partis valle Medor infra monte Trebinje in Bjelajica (Herceg) et in Cetinje, Planina
 in monte Kom, et Perunica et Jaza Dol infra Kom, et in Sinjajina Planina circa pagum
 Kovica et in Mali Dvorinac (M.N.) H. habet dactyle caeruleo, et lab. inferiori caeruleo-mixta
 et restante bianca. Post Adiutor

B. Dactyle Tzve L.

Gen. p. 306

Ad Melampyrum arvensis L. Vis. l.c. p. 177 ad var. leucon inter segitem vira Trbinje et Bileki
 (Herceg), Panth. l.c. p. 23. sub monte Lovcen (M.N.) Panth. l.c. l.c. p. 22. ad Novak prope
 Cetinje et ad pedem Vrachich (Bosn.) Sredna Gora et ianum Rebb. f. c. in germ. l.c. tab. MDCCL
 XXXVI fig. 1. et ad var. B. Pavatatum Vis. M. Pavatatum W. K. Panth. habet in gramineis circa Cattaro
 et Dalmatia prope Trebinje, in valle Radov Brdo prope Vracia in Bjelajica (Herceg) et circa Komani
 (M.N.) Panth. l.c. in partis bylostibis m. Dvorinac Panth. l.c.; in herbis Trebinje prope Balkari
 (Bosn.) Sredna Gora, et in sativa Uglješa, Gavice, S. Marie d'lapo, S. Stevo (Dalmatia) Panth. l.c. p. 383, et
 ianum Rebb. f. c. in germ. XX. tab. l.c. fig. II.

Ad Melampyrum nemorum L. Vis. l.c. ad var. leucon in partis m. Dvorinac (M.N.) Panth. l.c. ad Vares, S.
 niches ad Samokovac (Bosn.) Sredna Gora et ianum Rebb. f. c. tab. MDCCLXXXVIII.

Ad Melampyrum crystallinum L. Vis. l.c. ad var. leucon in hylostibis rugos Kolarac (M.N.) Panth. l.c. et ianum Rebb.
 f. c. tab. MDCCLXXXVIII. — Ad

Melampyrum pratense L. sp. pl. p. 843. Host sp. auf N. D. p. 188. Schöfl. cap. 587.
M. foliis lanceolatis petiolatis, bracteis lanceolatis, superioribus vix angustioribus, vix
oblongo-ellipticis, corolla tripli-bifurcata, capitulo oblongo-virgate
Linn. - *Melampyrum* Pers. Encyc. Bot. II. p. 843. tab. MDCCLXXXVI. loc. cyp. bot. t. 213. Geertze. de Fr. sec.
t. 53 f.

Hab. in gramineis m. stepicis prope Crimiss (Bom.) Lindstr. H. flavi, et alii, raro flavi
H. austriacae annuum.

Melampyrum glaucium L. sp. pl. p. 843. Host sp. auf N. D. p. 188. Rehd. Stev. p. 567.
M. foliis lanceolatis, bracteis integris, caliceo-glaucis, corolla tubae
quadratis, pedale inferiore tridentata, capitulo oblongo-aumentato.

Pers. - R. s. f. 1800. tab. MDCCLXXXVII. 11

Stab. in stepicis, M. S. M. Male Sandhill. Vehile havent et alihi in Boemia
Lindstr. H. aurei. H. acutis. Annua.

1 Ad. *Orobanchus cicutaria* Bertol. Vir. l. c. p. 178. ^{ad} ad locum in vegetibus raro raro
ad Monachum sub monte Kern (M. A.) Paris. t. c. p. 22. et ad Maltempe in leguminosis
raro in vegetibus (Dalm.) Sonnerat. t. c. Ad locum (ad Capitulum) Rehd. secundum. xx
tab. MDCCLXXXVIII.

2 Ad. *Orobanchus caryophylaceus* Linn. Vir. l. c. ad locum ^{cum} vegetibus (Bohem.) Paris. t. c. p. 22.
et ex parte Sutymka, Bercht. (Bom.) Lindstr. et ex parte Var. ^{cum} vegetibus (Bohem.) Paris. t. c. p. 22.

3 Ad. *Orobanchus pratinum* L. sp. pl. t. c. ad locum (ad Capitulum) Rehd. secundum. xx. tab. MDCCLXXXIX.

4 Ad. *Orobanchus cicutaria* Linn. Vir. l. c. p. 179. anteriora nona Orobanches raro
juncis. Pers. s. d. p. 176. et ad locum ^{cum} vegetibus (Bohem.) Paris. t. c. p. 22. et ad locum
tab. MDCCLXXXIX. opt. Tab. 69 super papaveraceas ad Maltempe. Linn. (Bohem.) Sonnerat. 1795. p. 96.

5 *Orobanchus phytolaccae* Rehd. secundum. 116. et ad locum ^{cum} vegetibus (Bohem.) Paris. t. c. p. 22. et t. c. p. 22.

6 *Orobanchus cicutaria* Rehd. secundum. 116. et ad locum ^{cum} vegetibus (Bohem.) Paris. t. c. p. 22.
O. foliis ellipticis vix subulatis corollae tubulis aquarumbris, corolla evanescens
super curva estre foliacea inter glande lato-peltata lati evanescens
rectis dentibus angustis, laevius lobis inferioris aequalibus, staminibus
basili inferiore sparsim pilosis, stylis subbenignis rectis foliis aliquando virentibus et floribus.

7 *Orobanchus scariosus* Koch in Deutschland. p. 180. Paris. t. c. p. 22.
Hab. in vegetibus raro solitaria in proximitate Thymiae (M. A.) Paris. t. c. et ad Boreum
in Boemia. Sciat. Kochiani dico violacei - H. austriacae. Persica.

8 *Orobanchus pallidiflorus* Wimmer. et Grub. St. 1822. t. 233. Koch syn. H. secundum D. p. 614
Rehd. f. 1. c. p. 94. Paris. t. c. p. 22.

O. foliis late ovatis velatis in aeneo-subulatum contractis tabo corollae rotunda
quadratis, corolla campanulata estre foliacea inter glande lato-peltata, lati evanescens
acute dentulatis angustis, laevius lobis inferioris subequalibus, staminibus sparsim
pilosis superne glabris, stylis subbenignis glandulosa-peltatis
Koch tab. 6. t. c. tab. MDCCLXXXIX.

9 Hab. in gramineis circa Thymus major (Linn.) in parvissimis sinuavis Thymus
circumflexus super arbillaceo et circa (vix) locis in piena Mala Divaricata (M. A.) Persica
H. austriacae, raro nobilis H. austriacae. Persica.

10 Ad. *Orobanchus epithymum* L. sp. pl. p. 843. Ad locum super Thymus in Persica. Det. supra Koch
(M. A.) Paris. t. c. et in gramineis asperis circa (Letticei) (M. A.) Paris. t. c. et persica

- 8 Orobanchace Galii Duby bot. gall. 1. p. 349. Koch syn. gen. II. p. 615.
O. sepalif. plurimarginis bipinni, corolla tubo basi angustata ^{campanula} campanulata
dorsi curvata, labii denticulatis, galea latitudo porrecti, labii inferiori
exalti ^{labii} ^{sub}equalibus tubo dividitis biviribus, hamatum denud. pilosis, superum
stylorum glandulosa pilosis.
- 9 Orobanchace Lyc. ^{et} ^{gen} Solanophyllaceae Reichenb. fig. 890-91. O. Galii id. 892-93. ^{Penn.}
Hab. in Galia vero, & Mollugine in Hispania ad zidem in Silvia propria Verbenae (Heng.)
(Meng.) Pantl. l.c. in Galia Mollugine in ^{ad Teuton., Benip., Kolleg., Varg. & Penn.} Tenui.
Hab. alti rebello aut vidente digerit. H. aestate. Penn.
- 9 Orobanchace Knapii Pantl. l.c. adsp. p. 83.
O. sepalif. ^{uniflorous or at least unisexual} ^{corolla} ^{tubular} ^{lanceolate} ^{corolla tubum ingentem} ^{labii}
^{2-lobata} ^{inclusa} ^{inclusa} ^{labii} ^{corollae angustiorae aplocauratae, galea rotundata}
labii ^{longiora} ^{subrepente, staminibus glabris, stylis nato brunnis}
- 10 Orobanchace Salviæ F. W. Schultes in Ann. d. ges. d. reg. ges. 5. p. 508. Koch
syn. fl. germ. II. p. 618.
O. sepalif. uncinaria ^{uniflorous} ^{bipinni} ^{tubus} ^{angustior} ^{superioribus}, corolla tubulosa
campanulata dorsi curvata ^{galea exserta} ^{dentata} ^{subrecta} superior tubo longo
porrecti, staminibus ^{longiori} ^{longiori} ^{deinceps} ^{longiori} ^{longiori} ^{longiori} ^{longiori} ^{longiori} ^{longiori} ^{longiori}
Hab. in monte Vlaich ad Vrbovem (Boemia) ^{H. aest. Penn.} in Silvia glutinosa L. H. fluvialis.
- 11 Orobanchace rubra Wallerian. orb. gen. 46a Koch l.c. II. p. 615.
O. sepalif. plurimarginis late ovata subobcordata - acuminata petiole anterius undulatus acutus
marginata, apice galea latiora inferior dentatula, superior tubo lobis rotatis
bis tenuiatis ad ^{capitulum}
petioles ^{latis}
Hab. in rivis Niedrejina foliis et ratis (Boh.) ^{l. c. 175.} ^{l. c. 176.} ^{l. c. 177.} ^{l. c. 178.} ^{l. c. 179.}
12 Orobanchace minorum Litt. H. f. Dalm. II. p. 169 exal. Var. 3 adnotata ^{qua} et substituta
O. Bifolia pectinata Koch & Noe apud Reichenb. l.c. p. 104.
O. bifolia ^{aut. Ross. subangustata} ^{aut. angustata}
O. sepalif. acuminata ^{truncata}
super dorsi curvata, galea biloba, lati latiora, ^{latis} semi-ovata, Stamineth. ^{latis}
Petioles ^{latis}
Hab. in rivis Niedrejina foliis et ratis (Boh.) ^{l. c. 176.} ^{l. c. 177.} ^{l. c. 178.} ^{l. c. 179.}
Hab. in rivis Niedrejina amplexifolia in riv. Cheso, Opava, Lomnicza. H. pungens ^{l. c. 177.} ^{l. c. 178.} ^{l. c. 179.}
Hab. in rivis Niedrejina amplexifolia in riv. Cheso, Opava, Lomnicza. H. pungens ^{l. c. 177.} ^{l. c. 178.} ^{l. c. 179.}
Hab. in rivis Niedrejina amplexifolia in riv. Cheso, Opava, Lomnicza. H. pungens ^{l. c. 177.} ^{l. c. 178.} ^{l. c. 179.}

Post Phelippeum ramosissimum C. A. Mey. p. 11. N. Detm. 1878 p. 150 adnotatur

Phelippeum ramosissimum Schlecht. f. longifoliae Schlecht.

Ph. ramosissimum Schlecht. f. longifoliae Schlecht.
Ph. ramosissimum Schlecht. f. longifoliae Schlecht. p. 150. idem 150 Ph. ramosissimum Noe in
Schlecht. f. exs. 1352. et Schlecht. f. 1.c. XX. tab. MDCCCLXXVI — siccatae.

Phelippeum Muletii Reut. in DC. genit. XI p. 8. * Schlecht. p. 89

Panth. t. c. p. 74

P. caule ramoso, calyx h-petlobi lobis levibus acutis, corolla curvata nigra ovarium contracta, dorso convexa, lobis ciliatis, imprimis lobis subaequalibus villosa — hirsuta subtus staminibus glabris vel basi villosulis, stylis glabris, stigma retroflexo.
Syn. Ph. Muletii p. nunc Reut. in DC. genit. XI p. 9.

Ter. Schlecht. f. t. c. XX. tab. MDCLXXI.

Hab. ad ridens Draebae muricatae, Vernicosae arvensis, et Theuristice niveosus, in hordeis
graminosis ad humerum Tribugia cira Tribugia (Herrig.). N. detm. annua.

Cbr. Species charactisticae ^{inconsistantibz} ^x ^{in certis que} distincta.

Ad Phelippeum lepidostachyacum F. Schlecht. Sp. n. p. 85 adde icon. Bonami panch. iii. t. 52 f. 3

Labiatae Lathraea L.

Gen. et. n. 743 Lathraea bidentata.

Calyx quadrilaterus Corolla rotundata latus interius latis bidentata. Corolla unicolorang. bicolorang.
Char. base occidentalis. Ovarium ante glandula libera suffultum peltatum partitabile — Class. Dicotomatae Dod. longioris min — grob. sex.

Lathraea squamaria L. t. c. p. 818. Hab. St. Moritz Diff. p. 213. Ribb. Fl.cri. p. 356.

Planta herbacea spathacea carnea carnis longiloba gloriosa recutida pendula.
Tota folia vel ab Ribb. t. c. p. 356 tab. MDCLXIV. Sed engl. tab. 120 tab. MDCLXVII. Bed. Mor. t. 130

Hab. in umbrosa divaricata monte, Ried, Gras, Kie. St. vere — Pavana.

Verbenaceae Linn.

Ad Verbena officinalis L. t. c. p. 100 ad locum in humido area Callaro, ad
ridens Tribugia (Herrig.) p. t. Cattolico (MN).

Ad Verbena officinalis L. t. c. p. 100 ad locum in humido area Callaro, ad
ridens Tribugia (Herrig.) p. t. Cattolico (MN).

Ad Verbena officinalis L. t. c. p. 100 ad locum in humido area Callaro, ad
ridens Tribugia (Herrig.) p. t. Cattolico (MN).

Ad Verbena officinalis L. t. c. p. 100 ad locum in humido area Callaro, ad
ridens Tribugia (Herrig.) p. t. Cattolico (MN).

Labiatae Linn.

Ms. fl. Detm. 16 p. 182

Ad Mentha spicata L. t. c. p. 104 ad locum in præsidio Sopje et sub Danilev Grad
in vob. Montello vesti. suprad. tribus (Cattolico) Somma diff. p. 73 ad M. spicata locum locum in vob. Soc. ratibus p. 269 ad locum
M. tormentosa L. Ms. locum in humido ad Cynoglossa recta prope Rieka et ad Sonica Rieka prope

Danilev Grad (M.N.) Panth. L. p. 60 et ad M. sybicum var. in annos 7 ad Her
(M.N.) Pani. L. p. 73. ^{termentum i' M.D.}

Ad Menyanthes aquatica L. H. W. Willd. Tp 183 ade locum in humidis lacus Sardinia
(M.N.) Pani L. p. 73.

Ad Menyanthes Polycarpon L. Tp 1 e ade locum in humidis ad nivalem Suica vta
prope Danilev Grad (M.N.) Panth. L. e, et non Polycarpon ut Gare Mill. Pani, L. e
tp in suis ad Her. et acerosis rivi Rijeka (M.N.), et ad Bosarukchia, in Sur,
lacu Panighe in Siglie (Dalm.) Venetus. L. op 53; et icon. Rchb. f. XVIII tab. MCCCXC.

Ad Lyngium europaeum L. Tp 1 e p. 183 ade locum in humidis circa Skotria
Jrn. prope Vraca in Biatora (Hung.)

Ad Sativum officinale L. Tp. 1 e ade locum in saxis circa Nagysab (Dalm.)
Delina, Nerdice, Grmecvor (Hung.), Rijeka, Lindor, Manastir Duga es
Rovinj (M.N.), et var. al biserratum cum typ. Tax pallidae, in saxis circa
Rijeka et Grmecvor (Hung.) Panth. L. e - Etz Variet etiam scribit ab
quod sum monachum in flor.

arvis intercostalibus angustis pennis
triangulares ^{18. variegata} rufescentiae apice coronatus.

Obs. Apinis V. globulariae foliae Nam. gena differt foliis integerrimis nec
repando ^{punctis} ^{na gressus} caulinis pinnatis pectis (nec superioribus trifidis) bracteis lanceolato-
linearis brevioribus (nec setaceis elongatis ciliolatis) fructus cortis
quadratis, quarum media filiformis, duas subticias minores nudasque
propteris, duas exteriori elephas et marginem fructus constitutae
ut dum in nostra cortae sunt tres aquilostatae et aquilatae, at ^{at 12. variegata} 2. ^{12. variegata}
Icone Rehb. fil. XII. tab. DCCXXIII f. 1427 (V. globulariae folia Nam.) fructus
cortae non bene exhibetae, nec in hac facies dorsalis fructus unquam
lo-costata ut in icona ^{18. variegata} ^{18. variegata} Apinis genere V. capitatae Palt. ad observando
et descriptio fructus pectatus aperte solitario ^{18. variegata} sive spiculatis ne spiculatis ^{18. variegata} ^{18. variegata}
Spiculae mediae prob. ^{18. variegata} sive Bukanorum ^{18. variegata} Compositae ^{18. variegata} Tians Iddelia specie Baumg. ad Boiss. ^{18. variegata}
Post Capitula ^{18. variegata} corymbosam L. fl. dalm. II. p. 29 ad Eriogono Macropodus ^{18. variegata} cont.
^{18. variegata} Post Capitula ^{18. variegata} corymbosam L. fl. dalm. II. p. 29 ad Eriogono Macropodus cont.

Captina longipetala Rehb. in apensis valles flumines Tara inter
Kom. legit Pautk. V. Adn. p. 43 - ^{18. variegata} Tians Iddelia secoia Rehb. - ^{18. variegata} Montenegrini hepe
Post Anthemis Cotulum L. ad. fl. dalm. II. p. 80 ad. ^{18. variegata} ^{18. variegata} nek. P. Bakchari 2. Chrysanthemum a Malo Taurice
Anthemis montana L. sp. pl. p. 415. Rehb. fl. aust. p. 227 ad. P. Bakchari 3.
A. foliis pinnatis pectatis, inferioribus sub-trigatis, pinnis bi-tri-
atis vel pinnatis-quinquefidi, mucronulatis, receptaculo hemisphae-
rico, paleis apice sphaerolatis flocculos disci subaequantibus, caulibus
monocephalibus.

Syn. A. carpatica W. sp. fl. 3. p. 2188. Pautk. Adn. p. 39. A. styriaca West
in syst. soci. bot. ratist. 1. p. 12. Rehb. in crit. II. p. 230 et in crit. II. p. 8.

A. grandiflora Host fl. austri 2. p. 506. rot. xx

Hab. in apensis septentribus montis Kome et Malii Durmitor in Montenegro
unde conim. Pautk. fl. Jun. II. alti. 2.

Anthemis rigescens W. habitat circa Danilov Grad in Peruccica et Tara
Dol impr. monte Kome in Montenegro. Non vidi. Pautk. Adn. p. 39.

Achillea multiplex Gris. spic. H. rumel. p. 212 est. A. abrotanoides
W. quae recentior, et habitat quoque juxta Pautk. Adn. p. 39
in monte Crno Planina in Peruccica Dol ^{Ortodoxa} ^{18. variegata} ^{18. variegata} Montenegrini ^{18. variegata} ^{18. variegata}
Kome et in Malii Durmitor in Montenegro. ^{18. variegata} ^{18. variegata} Ceratonia siliqua Willd. Bakchari 18. Bakchari 18.

Achillea ligulata Kit. hab. in grammosy Carina impr. Kome, circa
Tavore in Crno Planina, et in monte Sjenjavina Planina in Monte
negro. Non vidi. Pautk. Adn. p. 39. Sent. Bakchari Malii Durmitor et Tervic verna 18. Bukan
ad II. dalm. II. p. 85 adde. ^{18. variegata} ^{18. variegata}

Chamaemelum uniglandulosum Viz. hab. in fructis circa pagum Kovice impr.
Antennaria Melittella Hill. In septem. in Durmitor Pautk. el. p. 47

in for. montem Mali Durmitor ex Panth. l.c. p. 40.
Chrysanthemum cinerariaefolium Gr. Pigetianum cinerariaefolium Trav.
Panth. l.c. habitat quoque in monte Vrmæ circa Cattaro.
Chrysanthemum pallens Gay. Panth. l.c. erexit in graniticis iura Pista
in Montenegro. Non vidi.
Chrysanthemum larvatum Gris. in Oest. bot. Zeitschr. XXII n^o 9 p. 266.
Panth. in Adn. fl. et fruct. p. 41.
Chr. pubescens Adonisca, superne nudiusculum, monosypholum, foliis
triangulari-rectis, caulinis paucis decurrentibus levibus cuspida-
tis, involucri squamis radio subaequalibus oblongis, margine in-
gris lacerris, receptaculo conico-convexo, achenis cylindricis in
cornutam lacrima triplo breviorum proditum.
Hab. in rupestribus montis Kom. in Montenegro, ubi legit Panth. H.
Iulio, Julio. H. albi - 4.
Obs. - Similis Anthemis montanae L., a qua praeceps differt noto
generis, nunc receptaculo nudo et corollis sibi inserviente
planatis -

Sophoclearinace A. Br.

- 1 Ad Verbasum Thapsus L. Vis. f. l. c. Brod. fl. nov. - Hod. p. 233. V. Schraden's Thea. v. 22 p. 326. iconem. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Brod. fl. nov. - Hod. p. 233. V. Schraden's Thea. v. 22 p. 326. iconem. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum.
- 2 Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum. - Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. Hod. p. 150. ad locum.
- Ad Verbascum Thapsoides L. Vis. f. l. c. ad locum in parvius valle Virg. in prope Anna Planina (MN). Panth. f. l. c. et in glaciis valley Virg. prope Buon in valle ad Virg. (MN) Panth. f. l. c. et ad marginem agronum et rivea Virg. Virg. (Dalm.) Dornas. f. l. c. ad locum Roko f. l. c. Hod. MDCXXIX p. 2. et posterior
- Verbasum gerganicum Ten. fl. nov. p. 217. Var. heterophyllum Gris. spec. f. r. n. v. p. 19. Panth. f. l. c. p. 68.
- V. caule tereti foliis tomentosis, foliis imis compactis ellipticis oblongis, interius antice pectinatis, crenatis, crenulatis, supra villosis imitatis, subus cuneo-tomentosis, numerosis hirsutis, interius super compacte, floribus percurrenti, pediculis bracteis arvensis et orientalis. Lat. f. l. c. binig ovalibus filamentis glabro 4-5 pl. brevioribus, filamentis longioribus, filamento tubo, filamentis aliis laeve. S. V. Virg. p. 29. Hod. p. 150 non gen. Rechb. p. 150 pag. 12.
- Hab. in pratis mortis kom. et in valle Peracica infra Kom. (MN) Panth. Hawar. Biebni. Obs. Iheres Tenuis varia formas ostendit. Non Rechb. bona ad parviflora. - Ad Verbascum Lychnitis L. Vis. f. l. c. ad locum in glaciis prope Buon valley Virginae (MN) Panth. f. l. c. et in Bergiriza (Boen) L. f. l. c. ad locum Roko f. l. c. Hod. f. l. c. MDCXXXVII.
- Ad Verbascum nigrum L. Vis. f. l. c. Var. f. paniculatum f. l. c. paniculatis, foliis cordato contus obtusis subtilis tomentosis canescensibus - Syn. V. Wierzbickii Herdtk. p. 16 in Ban. p. 157. f. 29 non Rechb. illicem. p. 29 f. l. c. V. nigrum L. var. paniculatum Gris. in Panth. adn. p. 68. - Hab. in vegetatis circa Roko et ad locum mortis Male Turmitor (MN) Panth. et V. nigrum L. Vis. f. l. c. Dalm. f. 152 in pratis sylvestribus sub m. Durmitor (MN) Panth. et f. l. c. Ad V. nigrum L. Vis. f. l. c. ad locum V. orientale Bieb. et locum in herbis et raevis. Sit Valle d'Asco Capitio castaneogrisea iug. Virg. (Dalm.) Dornas. f. l. c. p. 57. Ad locum V. Verbasum Blattaria L. Vis. f. l. c. ad locum in Roko et locum in Lovcen (MN) Panth. f. l. c. p. 70 et ad Virg. Bela, f. Elena, Fiumicello (Boen) Dornas. f. l. c. et locum Roko f. l. c. f. l. c.
- Ad Verbascum Blattaria L. Vis. f. l. c. ad locum in glaciis hirsutis ad flumen Ribnica (Dalm.) f. II. prope Ribnje, circa Virca in Bjeljanje (Honey) et circa Njaka (MN) Panth. f. l. c. et in valle incolitique in Keglia ubique (Dalm.) Dornas. f. l. c. Ad locum Roko f. l. c. Hod. MDCXLIII. f. l. c. - Dalm. f. l. c. f. 550. Recens. d'Orsi f. cur. fac. XII. fig. 202. f. l. c.
- V. foliis glaberrimis, radicibus petiolatis oblongis crenatis vel sinuatis - primis bifidis, raro 3-partitibus, segmentis cordato - angustis levibus, acutis, raevis, ramos, pedunculis solitariis, aliis longioribus, staminum filamentis purpureo-lanatis.
- Loc. Roko f. l. c. f. 550. Recens. d'Orsi f. cur. fac. XII. fig. 202. f. l. c.
- Step. 554. f. l. c. f. 550. Recens. d'Orsi f. cur. fac. XII. fig. 202. f. l. c.
- Syn. f. virgatum Hod. 1911. p. 651. V. Blattarioides Schrad mon. Verb. in Corom. Gott. v. 3. p. 159. Hod. inter fructus circa Roko et Komari (MN) Panth. f. l. c. et insula Roko prope insula Roko, ante communem regnum. H. L. Lebel. f. l. c. acutis. Biebni. Prostata inter primis 4.

Verbasum lycopifolium Gris. in Densh. adsp. 68 et p. 163.

V. lycopifolium (L.) Scop. in Prodr. 1771. subsp. *glabratum* R. Br.
flavum (L.) Scop. in Prodr. 1771. subsp. *flavum* (L.) Scop. in Prodr. 1771.
fructus *luteus* (L.) Scop. in Prodr. 1771. subsp. *luteus* (L.) Scop. in Prodr. 1771.
Verbasum lycopifolium (L.) Scop. in Prodr. 1771. subsp. *luteum* (L.) Scop. in Prodr. 1771.

Hab. in Dalmatia monte Glar prope Trebinje (Herzeg.) Pantsh. t. c. M. L. 1760. It. restante
P. K. die specimen non adhuc sordidum. Hanc speciem determinare ad nos nominat et habet
in 2 mil. Tag. auf Mts. p. 40, sed siccis in nuda crista-lanaria interimplata.

Ad *Serifularianum* nodosum L. L. C. p. 189 ad eam in monte Glar prope Trebinje
(Hercg.) et circa Stadro Kapita (M. N.) Pantsh. t. c. p. 58, in monte Glar in Dalmatia et
in Savoje (M. N.) Pantsh. t. c. p. 79, ad Dravnik prope Senjica (Bosn.) Lendler, in locis
aquaes et ad fontem Panige et alati in ins. Vislie (Dalm.) Tommari. t. c. Publ. 1781.

Ad *Serifularianum lacustre* Walst. et Kit. p. 200. var. hung. 2. p. 155 Vis. t. c. adh
syn. L. Pantowski Gris. nov. sp. in Dalm. bot. Zeitschr. xxii. p. 267, et Pl. Academ.
Var. Met. Kit. in vegetatis monte Ozan et Nikova, Boscovulva ex
scopo Pantochio (Dalm.) Tommari. t. c. in vegetatis m. Ozan et d. Savnici

sub m. Ozan (M. N.) Pantsh. t. c. et ad Sutomka nym. Polana prope Boszje (Bosn.) Lendler et
ad Tommari. t. c. et ad L. Pantsh. t. c. et ad Dravnik prope Kisegash (Hungary) Lendler
et Scrophularianum cordatum Holc. L. L. C. p. 20 ad locum in monte Glar
dil. infra Cne. Planina (M. N.) Pantsh. t. c. et ad Dravnik prope Kisegash (Hungary) Lendler
et Ozan, Karlova, Male Sandik et alati (Bosn.) Lendler. — Adlatum

vii. *Serifularia actinias* Gris. p. 36. Bentham t. c. prod.

t. p. 265.

I. caerule herbae oblongae foliis ciliatis acutis basi subtruncatis glabrae - 10. Ciliis
oblongis, ruscis, petiolis digitatis - rotundatis, petiolis apicis distalis, ciliis axillaris per
densitate subnigra, foliis ciliatis velutin-glandulosis, calyculis regioribus et
longis oblongis ciliatis petiolis glandulosis, corollam subacutangulis, appendicite
subtenuis minorum anthemiformi, capite obovato obovato - murinato.

Hab. in monte Glar m. Ozan et circa Ozan circa Tengye supra Mts. Karavnik (M. N.) H. atque
varie florente. Pl. Academ.

Ad *Serifularianum* peregrinum L. Vis. t. c. p. 160 ad locum in cultis circa Nagusa (Dalm.) Pantsh. t. c.
in cultis peregrinis ins. Vislie (Dalm.) Pantsh. t. c. p. 52 ita nam fuit t. c. t. c. ad. M. C. XXV.

Ad *Serifularianum caninum* L. Vis. t. c. ad locum in lapidis circa Nagusa (Dalm.) Habenius,
Principales, Bilotti (Hercg.) Collinge et Licha (M. N.) Pantsh. t. c. in sociis ad Nagus
Collinge, Lica et alati vulg. (M. N.) Pantsh. t. c. in monte Glar, Stolice, Stolice, Boscovulva,
Cavice, Valle d. Bocca (Dalm.) Tommari. t. c. et in Bokaljce, et Dravnik ad Vassity (Bosn.)
et Dr. ionem Abb. t. c. t. c. ad. M. C. XXI f. II.

viii. *Serifularia Ehrhartii* C. A. Stev. in Babilg. man. brit. bot. p. 218. Koch syn. pl. 28 p. 253
f. male rotundata ab aliis segregata, foliis ovatis - longis subrotundatis glabris, acute levatis, sentatis inservienti minoribus, floribus
numeris terminatis, segmenti calycis oblongis subrotundatis late membranacei emarginatis
et appendicibus oblongis petiolatis, foliis diversis et rotundatis.

Syn. I. dicta Est. fil. A. Schlecht. f. 25

Dicitur Ndl. f. 15. gen. XX tab. M. C. XXII.

Hab. in rupi Montis superiore prope locum S. Stephani (M. N.) Pantsh. t. c. p. 70 et ad Dravnik
(Bosn.) Lendler. H. atque purpurei. It. restante. Pl. Academ.

Scoffularia heterophylla W. sp. pl. II p. 274. Bentk. in D. v. prodr.

14th var. X. p. 311. Panth. l.c. p. 69. Panz. l.c. p. 70.

S. glaberrima & foliis rotatis ciliis - oblongis obtusis, apicis rotundatis, parvis
ciliis oblongis cymis plurifloris, pedicellis calyci sublongioribus segmentis calyx
nisi rotundatis margine late rotundatis, agnus caerulea similis obovata

Syn. L. microstoma D. Urvil. ex. in mem. Soc. Linne. p. 1. p. 331. S. urolinea Wyd. mon.

Troph. p. 100. L. Glomeraria Wyd. mon. l.c. p. 159.

Dion. Libr. et Im. VII tab. b. 3. Wyd. l.c. tab. 2. 3.

Hab. in vegetabilibus monte Kom et Mala Turnitza (MN) Panth. et ibidem in loco
Vrisko Grece, et monte Veleka Partitica (MN) Panz. W. atropurpurea Macrata. Proter.

Ad Linaria cymbalaria L. Vir. l.c. p. 60. ad locum ad marginem circa 2000. Cattaro
(Dalm). Vrbnje (Herceg) et in monte circa Strugari (MN) Panth. l.c. in vegeta-
bilibus Vir. dicti Cattaro et ad Ophrys (MN) Panz. l.c. ad rupes et montes circa Vir. l.c.
et Castelone (Dalm) Panz. l.c.

Ad Linaria cymbalaria L. Vir. l.c. in locum in cultis ad Letting et Vir (MN) Panz. l.c.
et in agri est invenit in Virglio (Dalm) Tommasi. l.c. p. 52. ^{ext.} ad Virgilio comitatorem Boni
Bervi. Vir. l.c. in agri circa Vrbnje et Grmecavovo (Herceg) Panth. et quae vel
ob characterae somniae tuberosi exasperatum est his - genere Char., quem confer

Linaria graeca Chac. non - antis. sp. p. 105. Rehd Bentk. in D. v. prodr. 1916.

X. p. 208.

L. villosa, foliis inferioribus ovali - oblongis ovato oppositis, superioribus
alternis, pedunculis foliis ^{modico} longioribus, calyci linearibus acuminatis,
semiribus granuloso - tuberculatis.

Syn. Antirrhinum grecum Bory et Chaub. exp. Nov. Bot. p. 185. L. comunitata
Bentk. in Rehd. p. 261. p. 373. Tommar l.c. p. et Vir. l.c. Virgilio comitatorem -

Iow. Rehd. filii geom. XX tab. MDLXXXI fig. II. Bory et Chaub. l.c. tab. XXI
Hab. in arvis Dalmatiae et in agri in vicinis Labini p. i. et Pelagora, et circa Vrbnje
et Grmecavovo (Herceg) Panth. l.c. et in Valle di Bosa et Lagorai in Virglio
(Dalm.) Tommasi. l.c. p. 52. ad hucus tabo superiore violacea. Macrata. Anna
Ad Linaria spuria Mill. Vir. l.c. ad locum in agri humidis, Panzica, Vrglio
(Dalm.) Tommasi. l.c.

Ad Linaria minorer Desf. l.c. Vir. l.c. p. 62 ad locum in cultis circa Cattaro
(Dalm) Vrbnje (Herceg) et Vrisko (MN) Panth. l.c. et in agri incolatis vir. Ne
gha et terram Agriacum (Dalm) Tommasi. l.c. et ad Serajevo super Ljubljanen
Kobilnaglavou ad Nigritonum (Bon.) Sentiu. ad locum

Ad Linaria litoralis W. Vir. l.c. ad locum in cultis et glaucis ad coeculiam. Stephan
Morava sup. et prope Vir. dicti. (Cernatica (MN) Panz. l.c. in locis aridis, Vrglio, Besancon
(Dalm.) Tommasi. l.c.

Ad Linaria ^{vulgaris} Mill. Vir. l.c. ad locum in cultis ad Letting, Grnovo (MN) Panz. l.c. et ad
marginem agrorum ubique in vir. Vrglio (Dalm.) Tommasi. l.c. et ad Dravnik (Herceg) Panz. l.c.

Ad Linaria italicana Vir. l.c. ad locum in locis circa Salo istra Mala Turnitza
(MN) et Pernica Sol (MN) Panth. l.c. cum syn. L. leptofoila Koch. p. 1. et in
locis vegetabilibus agri Virglio, Cattaro et Besancon (Dalm.) Tommasi. l.c.

Ad Linaria alpina Mill. Vir. l.c. ad locum in glaucis nro m. Kom (MN) Panth. l.c. p. 71

- Ad *Linnaria chalceorum* Mill. Vif. l.c.p.163 ad locum in capillis circa
 Nagus (Dalm.) Panth. l.c.p. 69. Libalensis Mill. in sati Valle d'Beva
 Ad *Linnaria chalceorum* Mill. Vif. l.c.p.163 ad locum in sati Valle d'Beva
 (Dalm.) Tommas. veg. de Vogl p. 52
- Ad *Linnaria palmarum* Mill. Vif. l.c.p.165 ad locum in agriis or. Glava prope Trebi-
 nje (Trebitz) Koristno Gradi prope Vučin in Biogradon (Herceg) et circa Manastir
 Duge (Trebitz) Panth. l.c.p.165 ad locum in saxonis ad Cetinj. et Dobrostrane vestre
 Cetinj. et negro Kostanjevica (MN) Panth. l.c.p. 81.
- Ad *Antirrhinum Granatum* L. Vif. l.c.p.165 ad locum in vallis circa Cetinj (Dalm.) Trebitz
 (Herceg) et Trebitz (MN) Panth. l.c.p. 81 et in campis et muris Voglie, et Cetinj (Dalm.)
 Tommas. l.c. et ad hanc Tellacu (Bosn.) Lentor.
- Ad *Antirrhinum major* L. Vif. l.c. ad locum ad moenia velut ^{circa} Trebitz (Dalm.) et
 et Trebitz (Trebitz) ^{Panth. l.c. ad locum p. 81. All. Nat. S. Aquilegia} et in vallis
 Digitalis grandiflora Lam. Vif. l.c. p. 166 ad locum in vallis circa Trebitz (Trebitz)
 et in vallis circa Vrana et Perucica (MN) Panth. l.c.p. 80 in sybaritis ¹⁶³
 ubi in Durmitor, et in vallis valle Tara (MN) Panth. l.c.p. 80 et ad Savnik ^{Dalm. Savnik. Vrana}
 et Savnik (Bosn.) Tommas. l.c. et in vallis ¹⁶³ p. 80 lit. W. et L. in lit. W. et K.
- Ad *Digitale laevigatum* Wet. et Kit. Vif. l.c. ad locum in demetiis prope Cetinj (MN) Panth.
 l.c. et in saxonis ad Cetinj (MN) Panth. l.c. et corvi in hysp. p. 80 lit. W. et L. in lit. W. et K.
- Ad *Gratiola officinalis* L. Vif. l.c.p.167 ad locum in heumis circa Trebitz
 (Herceg) circa Fleke et Danilov grad ^(Trebitz) ad rivulum Suica (MN) Panth. l.c.
 in palustribus ad locum Teodorum (MN) Panth. l.c. et in palustribus ad Lepnus et Penech
- Ad *Veronica speciosa* L. Vif. l.c.p.167 ad locum in saxonis circa Manastir Duge
 in capillis Vučic Jomne dictis prope Gušč - Han et circa Lukovo (MN) Panth. l.c.
 in desertibus asperis ad Savnicis sub monte Tivica (MN) Panth. l.c.p. 71, et in vallis
 rati ad Capricis et Voglie (Dalm.) Tommas. l.c. et ad Beigr-Beg, nulla et Suica (Bosn.) Lentor.
- Ad *Veronica serpyllacea* L. Vif. l.c.p.169 ad locum in herbis in Glava et Dravie
 prope Trebitz (Herceg) in m. Tavrovici in Biogradon (Herceg) in valle Vrana infra
 Cetina Plavina in pratis aliisque Cetina dictis inspr. Kovač et in m. Mala Durmitor (MN) Panth.
 l.c.p. 71, in pratis ubi in Durmitor et in vallis regni Kolasin (MN) Panth. l.c.p. 72; in pratis
 Dobrinje, Valle d'Beva ins. Voglie (Dalm.) Tommas. l.c.p. 72, et in Gradac, spionice
 et Trebevnik (Bosn.) Lentor.
- Ad *Veronica acinifolia* L. Vif. l.c.p. ad locum in culti circa Trebitz et Bileći (Herceg) Panth.
 l.c. et ad Ebendatum (Bosn.) Lentor.
- Ad *Veronica arvensis* L. Vif. l.c. ad locum in culti circa Tara (Dalm.) Trebitz et Bileći (Herceg)
 Panth. l.c. in culti ad Negosj, Letenje (MN), in campis et pratis Voglie, et Marin de Capo, Dobrinje
 (Dalm.) Tommas. l.c. et ad Vranduk, Šebische, et Tavnik ad Bileću (Bosn.) Lentor.
- Ad *Veronica officinalis* L. Vif. l.c. ad locum in sybaritis circa Kovice in pr. Mala Durmitor (MN)
 Panth. l.c. in saxonis Tavniku m. Tavrovici (MN) Panth. l.c.p. 71, et ad Trebevnik regni Bosna
 versus Turka (Bosn.) Lentor.
- Ad *Veronica Chamaedrys* L. Vif. l.c.p.170 ad locum in sybaritis monte Glava prope Trebitz
 (Herceg), ad populi et in nemore Dobrinje, nemus L'Elena (Dalm.) Tommas. veg. Vogl p. 52 et Kra-
 duk, Šebische, et Tavnik ad Bileću (Bosn.) Lentor. Ad locum p. 52: causa undique
 pilosa, bipinnata pilosiora Panth. ad loc. p. 71, 20 cm. longa, ad apicem angusti glabra folia clementia poly-
 gamia, bipinnata, pinnulae 20 cm. longa, ad apicem angusti glabra, folia clementia polygamia, bipinnata
 Antirrhinum tortuosum Dalm. Chav. non. B. in exsiccatis et effundatis seculis longi fructuosa, folia clementia poly-
 gamia, bipinnata, pinnulae 20 cm. longa, ad apicem angusti glabra, folia clementia polygamia, bipinnata

dopo l'Antivittoria major L. e dopo la citazione Hab. f. 11 sara — Var. B.
angustifolium & glabriuscum, folij angustipinii, raepe revolutij Chal.
monodes Antoni p. 86 — syn. A. major Panth. (c.) Hab. ad muros ubi Zara
in Dalm — Obs. Jean Baumgärtl pl. p. 638. ^{Totum hunc} ~~Heic est bone refectus quendam folium, sed~~
~~longo, sed diffuso tante vena spina, quod innotescit singulis~~

Ad Campanulam Eriny Li Vif. l.c ad locum in Vajdahunyára regot.
et Catheros (Dolm.) curva Castellum turicum (Lacina) Németvölgye (Hung)
~~Panckeb.~~ et Ajka (MN) Panck. l.c. - Hujus addatur.

Campanula hispida Panck. adnot. ad fl. et faun. p. 51
C. caerulea angustata ampliata hispida, foliis glabriusculis, infimis petiolatis ellipticis,
strenuis, velutinis, tenacibus lanceolatis subacutis, basi leviter cuneatis acutis
floribus subcrenatis in racemum pedunculorum depositis calycibus laciniosis angustis
linearis, corolla campanulata glauco-piceola.

Ikon. Viz. fl. dolm. rugat. alt. p. II. tab.

Hab. Radix an annua? in fine specimen annua rotunda.

Obs. Radix tenuis viridis annua, sed ex unica specimine vix farcta annua. Quoad
velutina confer et. *Pantoreak* adn. l.c. p. 54. Et sectione Euroidentis -

Campanula monanthos Panck. l.c. p. 55.

C. caerulea teretiuscula gracilis, infimum petiolato, foliis oblongatis in petiolum
decurrentibus glauco-piceatis excurrentibus, subacutis, carinatis
tenui oblongo-peltata, flor. neutante, laciniosis calycibus lanceolatis linearis
tubus viridis, foliis tenui-petiolatis angustis lanceolatis, basi leviter cuneatis
Ikon. Viz. fl. dolm. rugat. alt. p. II. tab.

Hab. in hyperboreis Vinnia est infra montem Cava Planinae. H. caerulea. H. aculeata. Peccatum
Obs. Plantula tenera, flores parvi, ad C. Muscarium Boiss. pertinens. Et ad sectionem Euroidon
pertinens. Differt ab illa flor. minor et longior angustior, nec late ovalis obtusa,
Nec fibris tenuibus constare. Rhizoma rapax, ideo non annua.

Campanula Wanneri Rech. f. Ban. var. p. 61. t.
C. hispida quale tenuis longior laciniosis glauco-piceatis. Floribus exfloribus
caerulea teretiuscula gracilis, petiolis infimis petiolatis, foliis subacutis, rectangulis
lanceolatis, carinatis, calycibus glauco-piceatis longioribus, laciniosis longioribus
calycis acutis, crenatis, foliis tenui-petiolatis angustis lanceolatis, basi leviter cuneatis
floribus longioribus, laciniosis glauco-piceatis, laciniosis longioribus petiolatis, laciniosis
floribus longioribus, laciniosis longioribus petiolatis, laciniosis longioribus petiolatis, laciniosis
Hab. in pl. Ban. l.c. V. fig. XII (4) H. hab. fil. 16 gism. XIX tab. MDCCXV.

Hab. a Grandaschar super Spicoria versus Sebernik. (Bosz.) Leont. H. caerulea. H. aculeata. Peccatum

Hab. in hyperboreis monte Korn (MN) H. caerulea. H. aculeata. Peccatum
Ad Campanulam glomerata L. Vif. l.c. p. 100. ade locum in prati Vinnia, Peccatum et
Tara, in morte Sinjajina Planina, et circa pagum Kovicee supra montem
Mali Durmitor (MN) Panck. l.c. p. 54, in prati ad Cava Planina, lastiliumque
Velika (Dolm.) Ponemus. Ossget. l.c. p. 48, in m. Prolog. (Bosz.) Leont. Ad loca
tenuis C. aggregata W. in h. herb. l.c. p. 10, viridis, petiolatis floribus caeruleis latioribus
alatis, floribus majoribus. Hab. in prati vallis Peccatum supra Korn (MN) Panck
l.c. p. 54. maroden Pani. laciniosis calycis linearibus tubo longioribus. Hab. in praeceis
vogam sub upp. Korn. V. spicoria. Korn. vallis, foliis ornatis ovato-cordatis, floribus majoribus
Hab. in Baklan ad Vlasick (Bosz.) Leont.

37) *Campanula patula* L. p. c 232. *Hort. fl. austriac.* p. 265. *Ribb. fl. austriac.* - 301.

C. felix varietas, inferioribus oblongo-obovatis in petiolam decurrentibus, ratiisque linearis-lanceolatis sessilibus, panicula erecta-patula, floribus crassis, pedunculis subrotundatis, calycis lacinias late-subulatis, basi dentatae latissimis.

Lion. *Ribb.* p. iugum. XIX tab. ^{INDIVIDUUM} 6. Ed. fl. aust. t. 373. In engl. ed. t. 42.

Varpi abietina *Guss.* caule pubescente frondosae, lacinias calyculis subulatis integris, corolla duplo brevioribus - *Syn.* *C. abietina* *Guss.* et. *Fl. hung.* p. 33. *C. patula* *B. paniciflora* *Roth.* pl. ban. nr. p. 42 tab. VI. *Cypripedium paniciflorum* *G. D. mon. eng.* p. 329. *Column.* *egothr.* alt. p. 24.

Hab. in silvaticis Viroga Dol. infra montem Cava Planina, Pernica et Jara Dol. in præ horum, et in silvaticis circa pagum Kováčie infra Malí Durmitor (MN) in parvius Rögam sub m. horum (MN) *Panic.* t. c. p. 63, et ad Ossifac. super Kerešek, Duria, Berg Petrelave versus Parochia horum, Planica, Malí Sandek, Velike Javorišček, Stari Sandek, Velike Ravnice, Dravnički (Bosna) *Sent.* *H. caerulei.* *H. aestatae* *Ribb.* *fl. austriac.*

Campanula macrostachya *Hit.* in litt. *fl. austriac.* Wild. ex lev. p. 213 (1829)

C. hispida, caule simplici, foliis oblongo-lanceolatis, floribus tubulosis, perianthio longiori, *Syn.* *C. multiflora* *Waldb.* *Hit.* pl. rur. hung. III. p. 292 (1812) *Hort. fl. austriac.* 267. *Ribb.* p. 302.

Lion. *Ribb.* t. c. tab. MDXVII *Waldb.* et *hit.* t. c. tab. 263

Hab. in præt. *Viroga*, *Pernica* et *Jara* ita in Kováčie inter Malí Durmitor (MN) *H. caeruleo-violacei.* *H. aestatae.* *Blechnum* -

Campanula felix *Dor.* *fl. nap.* t. p. 21. *Ed. syn. Herm.* *Ribb.* fl. exp. **202.** exd. syn. *ed.* *C. subpilosa*, foliis ovatis duplicate serratis, inferioribus subcordatis longe petiolatis, petiolis oblongis, bracteis ovalibus oblongis, floribus capitulo terminali, lacinias angustissimis liliatis corolla utrinque cedentibus erubescit.

Plin. *Dor.* *fl. nap.* t. tis. XVIII. *Ribb.* in cont. cent. VI tab. 560 f. 765

Hab. in silvaticis montis horum (MN) *H. caerulei.* *H. aestatae.* *Premnus* *vallium*

Ad Campanulam glomeratam *L.* *Vit.* t. c. p. 100. adde locum in præt. *Krušn.* *Pernicia* et *Jara*, in monte Smrdavina Planina, et circa pagum Kováčie infra montem Malí Durmitor (MN) *Parth.* t. c. p. 54, in præt. ad *Cagnoje*, *lastelmeševi*, *Vesla* (Dolm.) *Tonina*. *Regel.* t. c. p. 48, in m. *Podlog.* (Bosn.) *Sent.* Adde varietas *C. aggregata* *W.* in h. herbi. t. c. 10, rintis, petiolis flororum caulinorum latioribus, lacinias calyculis longioribus. *Hab.* in præt. vallis *Borjana* circa infra horum (MN) *Panck.* t. c. p. 16. *marodon* *Panic.* t. c. 83. lacinias calyculis linearibus duabus longioribus. *Hab.* in parvius Rögam sub p. horum (MN). *P. spicata* *Horn.* *Wied.* foliis omnibus ovato-condatis, floribus majoribus. *Hab.* in præt. *fl. austriac.* *Ribb.* in *Baklan* ad *Vrapički* (Bosn.) *Sent.*

Ad Campanulam Drachelinum L. Vif. I c. II p. 131. ad locum in saxonij ad Savnii
sul monte Doira (MN) Panč. l.c. et in nemoribus et regis Velebit, Bosanovae,
(Dalm.) Tommasi. l.c.

Ad Campanulam Capitellatum L. Vif. I c. ad locum in vegetabilibus ad Oštrog et
prope canobium S. Stephenii Monia superioris (MN) Panč. l.c. p. 62, et ad Novak
(Bosnia) scutis.

Ad Campanulam frumentaceum L. Vif. I c. ad locum ad sequens vallis Zete sub
Danilov Grnd (MN) Panč. l.c. et locis herbis, nemoribus ad Velebit, Bosanovae,
Luzjanje (Dalm.) Tommasi. l.c.

Ad Campanulam rotundifoliam L. Vif. I c. ad locum in vegetabilibus montis Dumicior
(MN) Panč. l.c. et ad v. per vallum Hacuk. ad locum in vegetabilibus montis
ad v. Schandrevi vallis locum in pratis circa horae insulae insulae Danubiorum (Bosnia)
Kom (MN) Panč. l.c. ~~Penthi~~ Penthi. l.c. Panč. l.c. p. 63

Campagne trichocalycina Den. fl. mag. t. p. 62. Bercht. fl. idem t. p. 167. 2

C. glabra, caule angustato angustato, foliis ^{abrupte rotatis} imbricatis, subrotundis, velutinis
oblongis irregularem terram dentatim, racemos subciliatis terminalibus,
brachi ^{subciliatis} lacinis calycinis velutinis elongatis, corolla quinquepartita.
platformibus. Ion. Petri. l.c. tab. 16.

Hab. in vegetabilibus hukurij Brod sub monte Kom. H. violacei H. austri. Pannus

Campanula latifolia L. Sp. pl. p. 233. Host fl. austri. t. p. 267. Reichenb. p. 303.

C. subpubescens, caule ~~subciliatis~~, rizome ^{aristatis} angustis foliis insinuatis longe petiolatis,
cordatis, superiorebus ovato-oblongis, superiorebus acutis, floribus in racemos
terminatis bipartitis, raciniis calycinis lanceolatis, corolla convergente quinquepartita.

Ion. Rch. fl. ill. germ. XX tab. MDXLIX ~~Sax. rugi~~ tab. t. 302. Bed. N. Dan. t. 85

Hab. in dumicis vallis fluminis Dark prope Matěšov (MN) Panč. l.c. H. caerulea H. austri.
Ad Campanulam garganicum Den. Vif. l.c. ad locum in saxonie ^{Pennin} prope Cattaro
(Dalm.) Panč. l.c., et ad Bosanovae et Beliće, in Tržkavre, ^{prope} Penniakio et Plač.
nik (Dalm.) Tommasi. l.c.

Ad Campanula pyramidalis L. Vif. l.c. ad locum in saxonij et ad numerosas circa Zagora, Cattaro
(Dalm.) et Trebinje (Herzeg) Panč. l.c. et in vegetabilibus ac nivis ad Cetinje, Čern.,
Oštrog et supra Gradiško (MN) Panč. l.c. et ad rupes et numerosas copias ad Cappadocia
in Tržkavre, Valle di Bela et Velebit (Dalm.) Tommasi. l.c. p. 48.

2 Ad Campanulam penicillatum L. Vif. l.c. p. 135. ad locum in graminibus vallis Pennin ^{inspe}
Kom (MN) Panč. l.c. et ad Novak ad pedem Vlasti (Bosnia) Šendri

1 Ad Campanulam ramosissimum L. Vif. l.c. p. 134. ad locum in apennis ad Poljencie disti.
Crmnica et supra canobium Oštrog (MN) Panč. l.c. p. 63, et in apennis circa Cattaro (Dalm.)

Ad Campanulam Capitellatum L. Vif. l.c. ad locum in graminibus ad Tržkavre et
Biograd (Herzeg) Panč. l.c. in pratis et herbis Velebit, Caprije, Beliće, Beliće (Dalm.)
Donatas. l.c. et ad locum supra Kalotin vallis Butynka, ad Vrach, Savinj et ad
Savinsko zelenje (Bosnia) Šendri. - Ad locum in vallis circa Tržkavre, Velića et Biograd
p. 28 tab. 2: floribus subspicatis. Hab. in locis suis circa Tržkavre, Velića et Biograd in
Biograd (Herzeg) et circa Danilov Grnd (MN.)

Ph. carile foliis angulato glabro, foliis irrenatis, caulinum & steriliū cordato-ovatis obtusiusculo, floriporum ellipticis - acutis in petiolatum attenuatis, superioribus subrotundatis sessilibus, bracteis late cordatis abrupte acuminatis, capitulum subglobosum subaequantibus, calyxis laevis anguste linearibus.

Syn. Ph. orbiculari var. cordata Griseb. spicata H. v. p. 291. Pan. l. c. p. 62.

Ph. pseudo-obtusulae l. c. p. 53.

Ikon. Vill. fl. du Dauph. II. tab. XI. f. 1. dext.

Hab. in præriis alpinis montis hinc et Malii Durmitor (MN) Panth. l. c. et in glaveonis m. horn (MN) Pan. l. c. et in m. Vlasich supra Brezovac (Bosn.) Tendtn. H. caerulei. H. aestate. Peruvi.

*Ces. Differt a varietatibus Ph. orbicularijs bracteatum forma, brevitate et levitatem.
Phytolum ~~Spicatum~~ L. sp. ill. 72 I. p. 15. Asch. et Kan. cat. pl. Serb. Bosn.*

p. 45.

Ph. foliis caulinum steriliū longo-petiolatis cordatis ovato-vel lanceolatis, superioribus rhombis ovalis attenuatis, bracteis exterioribus ovato-acuminatis, acute serratis, capituli globoso.

Ikon. Rehb. f. 4. c. XIX tab. MDLXXXIII.

Hab. in monte Vlasich supra Baklari, Opeljanik, et Male Sanduk (Bosnia) Tendtn. H. caerulei. H. T. Aug. Peruvi.

Phytolum spicatum L. sp. fl. p. 242. Host. Et aust. I. p. 277. Rehb. f. 6 ex gr. 297. Panth. l. c. p. 53, Pan. l. c. p. 62.

Ph. foliis duplicate-ternatis, inferioribus petiolatis cordatis acutis, superioribus linearibus, spica oblonga.

Ikon. Rehb. f. 16. germ. XIX tab. MDLXXXVII. Schlecht. fl. tab. 39. Curb. bot. mag. tab. 257.

Hab. in sylvaticis circa pagum Kovice supra Male Durmitor (MN) Panth. et a Jajinje prope Bosor verus, Travnik, et in m. Vlasich supra Baklari (Bosn.) Tendtn. H. pallidæ et in Vrbo. ~~H. pallidæ~~ Peruvi. H. Maji, Tunici. Peruvi.

Ces. Phytolum limonioplium Sibth. Vir. l. c. p. 129. ad locum in saxonij circa Lettinje et Stanastir Duga, in saxonij m. Lazica supra Bjeljnice (MN) Panth. l. c. in saxonij Stipagos sub m. Lazica, in monte Sutoriman et m. Male Lonar, ad Ostroz et supra Grahovo (MN) Pan. l. c. ~~ad locum in saxonij~~

Rehb. f. 16 ex gr. 297. tab. MDLXXXVII.

Ad Campanularum capitatum Linnae. Vir. fl. Dalm. II. p. 130 ad de Syquinimon C. ligulatae var. Asch. et Kan. cat. serb. p. 46 et locum in saxonij m. Glava prope Zabljaje, circa Nedevicce, Graničarevo et Vucia in Bjelagora (Herzeg) Panth. l. c.

U. 53, in saxonij ad Lettinje, et supra cornicium Ostroz (MN) Pan. l. c. p. 53 — Adetur Campanula lingulata Willd. Kit. fl. rev. hung. I. p. 65. Panth. l. c. p. 53. Asch. et Kan. l. c.

C. hispida, foliis spatulatis ellipticis in petiolatum attenuatis, irrenatis, caule simplici, flexibus capitatis, calyx dentibus lingulatis obtusis, appendicibus semiovatis, corollis calyx duplo longioribus.

Ikon. Rehb. f. 16 germ. XIX tab. MDLXXXVII. Wet. Kit. l. c. tab. 74.

Hab. in sylvaticis Vrbova Dol infra Cina Planina in Peruvi et Para Dol infra Rom et circa pagum Kovice supra Male Durmitor (MN) Panth. l. c. in m. Vlasich, Travnik, ad Cenili, Latynika, Vares, Savnik, Savnikatzen, Samishovatzchen (Bosn.) Tendtn. H. caerulei. H. coerulei. Peruvi.

Peregrinus.

Ambrosiaceae Lk.

Vis. fl. Dalm. II. p. 126.

- Ad Xanthium strumarium L. Vis. l.c. et Suppl. p. 20, addi locum ad vias circa Trebinje (Herag.) et Bogetkei (MN.) Pantk. l.c. p. 39, in fonte ad Vis. ditr. Grmavice (MN.) Pani. l.c. p. 62, in incolitus et humidis Panighe, Castelnuovo, Besanova in Veglia (Dalm.) Toninac. l.c. p. 48.
- Ad Xanthium spinosum L. Vis. l.c. addi locum in collis circa Cattaro (Dalm.) Trebinje (Herag.) et Cettinje (MN.) Pantk. l.c. p. 39, in campis ad Cettinje Grakov (MN.) Pani. l.c. p. 61, et in incolitus ad vias Beanno et Zupanice (Dalm.) in. Veglia, Toninac. l.c.

Campanulaceae Barth

Vis. fl. Dalm. II. p. 128.

Pastione L.

sp. fl. pag. 1005.

Char. Calyx quinquefidus. Corolla quinquepartita, lacinia linearibus, primum coarctata, denum a basi ad apicem liberis. Stamina quinquefidae, subulatis, anthers basi oblongatis. Capsula bilobularis, loculis multiorientatis, intr. calycem superne delinens. Clad. Pentandria Ord. Nonogynia. Pastione supina Sieb. in Sp. Lyst. veg. t.p. 810. Gris. spicifl. vnum. II. p. 293. Syntex. Pantk. l.c. p. 53.

D. nano, perenni, caulinis subintegritibus subrigidis, foliis imis spathulatis lanceolatis ciliatis, caulinis obverso-lanceolatis oblongis, bracteis involucratis late ovatis ante dentiferis capitulo subaequalibus, calyculis linearibus linearibus ornam. glabro-acuminatis.

Var. d. foliosa: corolla infra apicem foliis binis suboppositis bracteiformibus dentatis munita.

Hab. in pratis alpinijs Bjele Karini et in monte Kom promine cum varietate.

Obs. Differt a P. montana L. duratione perenni, stature nano, bracteis dentiferis.

lacionibusque. Var. non differt a specie nisi foliis binis sub apice caulinis et a capitulo per se remotis, quoad formam folii, quoad dentes bracteis similitud.

Ad Phyteuma orbicularium L. Vis. l.c. p. 128 addi locum in declivity saxonij m. Durmitor, m. Savore, et in glaceris sub Visoke Grede m. Kom (MN.) Pani. l.c. p. 62, et inde iconem Richb. f. 1. et germ. xix. tab. MDLXXXIII f. 1. — Var. d. sp. tubulatum Richb. f. l.c. p. 106. glabra, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis erecto-rectatis, bracteis capitulo brevioribus — P. Richb. f. ex. p. 291 et Gris. spicifl. vnum. II. p. 291 (sub Ph. fistulosus) — P. Richb. f. l.c. l.c. tab. MDLXXXIII f. 11. Pag. f. austri. V. tab. 427 fig. simile. Hab. in prati infra m. Mati Durmitor (MN.) Pantk. l.c. — Additiva Phyteuma cordata Vill. hist. p. de Dauph. II. p. 517 (sub P. cordatum Vill.). Richb. f. ex. p. 297 (ext. syn.)

Ambrosiaceae Link.

Hanselia officinalis Link.

Ad Xanthium strumarium L. Vis. t.c. p. 126. et Suppl. p. 70 ad locum
ad vias circa Trobinje (Herzeg.) et Bogetici (MN.) Panth. t.c. p. 39; ~~t.c.~~
in fonte ad Vir dita. Omnicae (MN.) Panth. t.c. p. 62; in incolit. ~~et~~
et humid. Panighe, Castelvoro, Besano ins. Veglia (Dalm.) Tom.
mes. t.c. p. 48.

Ad Xanthium spinosum L. Vis. t.c. add locum in collis. circa Cattaro (Dalm.)
Trobinje, ~~B. Hercegovina~~ (Herzeg.) et Cettingia (MN.) Panth. t.c. p. 39; in ~~campanula~~
~~at Cettingja~~, Gospovo (MN.) Panth. t.c. p. 61; et in incolit. ad vias Beranova
et Zupanic (Dalm.) ins. Veglia Domus, t.c.

Campanulaceae Barth.

Vis. fl. Dalm. II. p. 128

Ad Phyteuma Fascionum L.

~~sp. pl.~~ p. 1005

Char. Calyx quinquefidig. Corolla quinquepartita lacinia linearibus, primam
lacinia dentata a basi ad apicem lobata. Stamina filamentis pubescens,
tectorum ^{basi} longe multitudinis superius in oblongis ^{basingue} tubis rotundatis, anthers cohaerentibus. Capsula bilobularis ~~aperte~~ serratim dehiscent.

- Cl. Pentandria Or. Monogynia Syst. sex.

Fascione ^{in part.} Fusca Lieb. ^{syst. veget. p. 110} Griseb. sp. pl. Fl. rum. II. p. 293. Panth. I. c. p. 53. et
I. ^{Anna} perennans, capillis simplicibus superne subaphyllis, foliis ^{involutivis} ~~involutu-~~
- lanceolatis ciliatis, caulinis obverse lanceolatis oblongis, bracteis late
obovatis subcordatis acute dentatis, capitulum subaequalibus, caly-
cis segmentis linearibus ovarium glabrum regnanteibus.

Flab. in part. alpinis Bjelle Carine et in monte Korn. (MN.) Panth. I. c. p. 53. et in
Var. p. 162. — V. p. 162. — varie late ipso apice rotundatis ciliatis
Var. p. 162. — varie rufa capitulo luteo intropositum. — varie luteo intropositum.

Obs. Sub capitulo brachia folia lanceolata dentata, ab ipsa distans. Differt
a I. montana L. fascione perenni stativa rara bracteis dentatis lationeque
var. non differt a gen. nisi foliis brach. et long. ut parvulis quod primis annis esse posse
Ad Phyteumum obcordatum L. Vis. fl. Dalm. II. p. 128. sive colorem in setosum 128. et
m. Dorsum, m. Tarsore, et in glaucis. ab Venide grisea m. (MN.) Panth. I. c.
p. 62. et in Mafang (Lapidum) Schlecht. et Baronum Rchb. f. 16. ger. XI. p. 298

tab. MDLXXXIII. p. 2. — Var. S. festucom. Rchb. f. 16. ger. XI. p. 298. glabra, foliis
obcordatis linearibus, evento rorato bracteis lenticulis glabris bracteibus — Panth. I. c. p. 53. —
Panth. I. c. p. 53. — Panth. I. c. p. 53. — Panth. I. c. p. 53. — Panth. I. c. p. 53. — Panth. I. c. p. 53. —
Tab. in part. infra mihi Mala. Summ. (MN.) Panth. I. c. — ad locum. —
Ph. caerulea (Corolla) luteo intropositum. — (ut Riccordii VIII.) Rchb. f. 16. ger. XI. p. 298 (excl. syn.)

Ph. caerulea foliis angustatis glabris foliis linearibus ^{intropositis} subcordatis ciliatis, caulinis sternentibus, oblongis aliisque foliis non
in fabrum alternatis, suspensis subcordatis linearibus, bracteis laterali ciliatis oblongis acuminatis apice
lanceolatis lobatis subaequalibus. — foliis linearibus angustatis linearibus apice acuminatis apice
lanceolatis lobatis subaequalibus. — foliis linearibus apice acuminatis apice lanceolatis lobatis subaequalibus. —

Lyn. Ph. dentatulata var. cordata Rchb. f. 16. ger. XI. p. 298. — Panth. I. c. p. 53. —

Ieon. Vill. pl. de Dangu II. tab XI f. 1 ext.
Hab. in præriis apicis montis horum et Meli Durmitor (MN) Panteli, et
in gloriis in horum (MN) Pančić et in Vojniči ugor Drvash (Bosna) Šebot.

Ost. Differt a varietatibus Ph. articulatus L. bracteatum forma et latitudo.
Phyteuma spicata L. sp. p. 242. Host. fl. austro. E. p. 277. Schlecht. fl. aust.
p. 297. Panteli. l. c. p. 93. Pančić l. c. p. 62. (7)
P. foliis diffinito ~~et~~ serratis, inflorescens petiolatis cordatis acutis, non rotundis
lineariis spica oblonga.

Ieon. Schlecht. fl. austro. form. XIX. tab. MDLXXXVI. Schlecht. d. fl. tab. 39. Cest. bot. mag.
p. 2347

Hab. in sylvestris uva pagum Kovice in prope Meli Durmitor (MN) Panteli.
et var. caeruleam sub m. Durmitor usque iugum Skilar (MN) Pančić
et apud Bosniam uox Riwini et Stipicis gomuža Kotor (Bosnia) Šebot.
l. c. bl. albid. vel pallid. Cervaria. N. Mayo. Junia. Peruviana.

Phyteuma Sieberi Lep. pugill. E. p. 15. Ach. et Kar. cest. bot. mag. p. 2350

P. foliis caulinis sternutis longe petiolatis, cordatis et ovato-lanceolatis serratis,
caulinis lanceolatis, ~~cordatis~~ petiolatis, rhombo-ovatis attenuatis, basi
latae extenuatis, ovatis ~~lanceolatis~~, angusta levatis, capitulo globoso.

Ieon. Schlecht. fl. austro. XIX. tab. MDLXXXIII

Hab. in monte Vojniči ugor Bokari, et Bulgarie, et Meli Sandic (Bosna) Šebot
H. laevigata. H. bl. lutea. Peruviana.

Ad Phyteumam litoraneum Schlecht. fl. austro. l. c. p. 129 adde locum in raxonib. uora Celle
uiae et Manastir Draga, in raxonib. m. Lastva ugor Vojniči (MN) Panteli, et
in raxonib. de Nijegor sub m. Lovcen, in submonte clivo Meli Konac, ad
Ortov et ugor Grishovo (MN) Pančić l. c. et ceteram Schlecht. fl. austro. tab. MDLXXXV.

Ad Campanulam capitataem Sims. W. Kit. fl. austro. l. c. p. 130 adde Jajincimont
C. lingulatae W. Kit. fl. austro. hirsuta p. 65. var. diff. et Kar. cest. bot. tab. 48
et locum in raxonib. m. Glina prope Trebinje uira Nedovicia, Gravice
reco et Vraca in Bjelazore (Herceg) Panteli. l. c. p. 53, in raxonib. de Celle
uiae et supra uocabilium Ortov (MN) Pančić l. c. p. 63. — Adhuc
Campanula lingulata W. Kit. fl. austro. hirsuta l. p. 65. Host. fl. austro.
p. 222. Panteli. l. c. p. 53. Ach. et Kar. cest. l. c.

C. his uide foliis spathulatis ellipticis et crevatis adprope striatis, caulinis
simplici capite, calyx dentatus ligulatis oblongus, appendicibus semiorbitali, corollis
calyciformibus duplo superius lobatis.

Ieon. Schlecht. fl. austro. XIX. tab. 234. W. et Kit. l. c. tab. 64.

Hab. in sylvestris Vraca. Doi iugum montem Crna Planina in Perutica et Tara do Iug
Kovice et uora pagum Kovice iugum Meli Durmitor (MN) Panteli in m. Vojniči
Trovnik ad Cremnita, Tetynika, Starica, Sternicu ad Tamis uostriku (Bosna) Šebot.
H. austro. C. lingulata. Peruviana.

ad Campanulam

Ad Campanulam tenueflosam W. et herb. Vif. fl. dalm. H. p. 136 ad ~~l. 136~~

locum in monte Siles prope Drinjat, Chrysostom
Johim. p. 72 ad locum in monte Siles prope Drinjat, Chrysostom
et Lindzon et Shore (MN) Pantk. l. c. et in vegetribus in Loven,
Durnitor, Savore et horo (MN) Pantk. l. c. et in locis petrosis Rive
nove et vecchie, in organ et nopalio Provinis iur. Vegles (Dalm.) Tonina
et a villa supra Borovnjava et a Cicer ad Lione, Satyavka, super
Poljanu ad Borovnjave (Bosnia) Sentra. — Reditur

Campanula Kitaibelii ~~Pantk.~~

Caeruleib; mollescens foliis, pliis ~~multis~~ linearibus, rufis apicibus
dentatibus, floribus capitate, bracteis ovato-acuminatis dentata-
tibus, exterioribus capitulis terminalibus, calyx ^{tenuis} ~~longus~~ ^{dentatus} ~~apicem~~ ^{ext. pinnatis} penduculus dentatulus

Syn. Edraianthus kitarbelii Agh. Et l. in Flora VIII p. 169. Wahlenbergia
kitarbelii A. G. mon. Camp. 136. *Hedyanthus croaticus* Kern in
Esterr. Bot. Zeitschr. XXIII n. 1. (sic. Aschers.) ^{ent. 136 p. 140} ^{hunc} ^{hunc} ^{hunc}
Mali Durmitor (MN) Pantk. l. c. ex ista syn. Campanula sibirica Willd. p. 166
Flora Wallach. et Hor. M. Hung. p. 154 ex l. c. Pantk. f. 1. g. 1. tab. MDLXXXVII tab. non
Hab. in monte Siles prope Drinjat, et in Kristina Greda super vallis
in Bjelagora (Herzeg), circa Manastir Duga, et in Tavac Velebit summa prope
Gudan Stan (MN) et circa Regusa (Dalm.) Pantk. l. c. Var. croatica, in vegetribus
montium Korn et Mali Durmitor (MN) Pantk. l. c. et in in Vlasici supra
Baklar, et Bresnik, Mali Sandik et Velika Rocca (Bosnia) Sentra.

Ad Campanulam tenuifolia W. l. c. p. 136 ad locum. Edraianthus scopule
folios a d. l. et locum in vegetribus summi monte Korn (MN) Pantk. l. c. p. 63.

Ad Campanulam speculum L. W. l. c. p. 138. ad locum inter reges Ragafo et
Cattare (Dalm.) Drinjat in valle Zajlav proprie Paricavovo in Bjelagora (Herzeg)
ana Kornani et Vraca (MN) Pantk. l. c. p. 56. in cultis ad Ceting, Vir et
super Bjelagora distans Crnioca (MN) Pantk. l. c. p. 63. et in Paricavovo pro-
pe Cetina Tonina near Barova, et aliis frequentibus. (Bosnia) Sentra. Ad locum
hunc hab. in tab. MDLXXXVII p. 169.

Ad Campanulam pleatam L. W. l. c. ad locum in cultis Vrgos.
Capitulis ad lacum (Dalm.) Pantk. l. c. p. 48. et ionice Rehb. f. 1. tab. 818 tab. MDLXVI
Ad Campanulam hygrom. L. W. l. c. ad locum in saty. Farje, Caprius, L.
Mani di Capo (Dalm.) Tonina. l. c. et ionice Rehb. f. 1. g. 1. tab. MDLXVI
Ad Campanulam Pichleri W. l. c. ad locum. Adenophora Pichleri Huter in Pantk.
ad locum p. 55. C. Alpinum Pantk. non L. et locum in vegetib; monte Korn et in
Vratje prope pagum Lipovo (MN) Pantk.

Vacciniaceae DC.

Pl. 1. f. 140.

Ad Vaccinium Myrtillus L. Vt. f. 140 ad locum in sylvestris
montis circa Plana, Korn, Simmerwina Planina, et Monti Durmitor
(MN) Pantk. l. c. p. 66; et in præcipi montium Durmitor et Korn, (MN) Pantk. l.
c. p. 63; et a Vlasic et Baklari (Bosna) Lenitn. — Ridatav

Vaccinium uliginosum L. p. 199. Host fl austri. 1. p. 132. Reb. p. 203.

Sylvestris teretifolius, foliis deciduis et rotatis oppug, integerrim, rubris glaucis retin
latif, pedunculis ~~subulatis~~ ^{angustis} ~~subulatis~~ ^{angustis} rufantibus, corolla evata, anthers
bianchatis.

Flor. Reb. f. XVII tab. MCLXVIII. f. 140.

Hab. in sylvestris montis Korn (MN) Pantk. l. c. p. 66; in declivity in Durmitor (MN)

Pantk. l. c. p. 63. Fl. alibi aut rubellis. Fl. Mayo Junio. Portulaculus.

I. Ad Arctostaphylos Uva-ursi L. Vt. f. 141. P. 140 ad locum in sylvestris montis Korn
(MN) Pantk. l. c. p. 66 et sub R. officinali Winn. in m. Vlastich ad Ovcar

et Baklari (Bosna) Lenitn. — Ad Baklari sp. vid. apud T. 140.
II. Ad Cytisum vulgarium L. f. 142 ad locum inter Lebre et Maglar (Bosna) Lenitn
ad Vraca arborescens.

Pedunculi virgines Paphia Korek. et Clamys et Argemone (Bosna) Lenitn
ad Erymanthidium Zork. Vt. c. 143 ad locum in ins. Veglia (Dalm.) Tommasi l. c.

III. Ad Ericum arboreum L. Vt. f. 142 ad locum in saxicava Tribunj et

Ganicus (Herz.) Pantk. l. c. p. 66 et Lonicera Nell. f. 142 tab. MCLXVI f. 1.

IV. Ad Ericum arboreum L. Vt. f. 143 ad locum in ins. Veglia (Dalm.) Tommasi l. c.

V. Ad Pyrola minor L. Vt. f. 144 ad locum in montibus Fennia. Sol. imp. m.

Erica arborea (MN) Pantk. l. c. ~~tab. 145~~ ad locum in montibus Fennia. Sol. imp. m.
in sylvestris in Durmitor usque pagnum Studen, et L. campanula L. in sylvestris
in Durmitor (MN) sed non vidi.

Pyrola secunda L. sp. pl. 565. Host fl austri. 1. p. 141. Reb. f. 145.

P. foliis ~~ovalibus~~ ^{ovatis} ~~seriatibus~~ ^{acutis} ~~rotatis~~, floribus rameis seriatibus, stylis exsertis
stigmatis quinquefido. Syn. Namephelia secunda Gaska. Agh. et Kar. cat. pl. 63.

Flor. Reb. f. 145 tab. 146. f. 146. engl. bot. tab. 51. C. f. 146.

Hab. in sylvestris montis Istribia in Bielgor (Herz.) Pantk. l. c. p. 66, et in sylvestris
sylvestris in Durmitor usque pagnum Studen. (MN) Pantk. l. c. p. 63. Ad virginiti-
-ali. — Ad acutum Petren.

Ex his addit. et Pantk. l. c. p. 66. L. sylvestris in Durmitor ~~sed non vidi~~
et Monotropa Hypopitys ~~in sylvestris~~ Durmitor (MN) sed non vidi.

Ad ~~tab.~~ 146. L. sylvestris Ericaria L. f. 146. f. 147. f. 148.

Ad Arctostaphylos alpina L. sp. pl. 566. Host fl austri. 1. p. 145. Pantk. l. c. p. 66.
Q. caeruleo infuso, foliis et rotatis, foliis seriatibus glabris, supi integrans velutina
velutina venosa, rameis terminalibus.

Flor. Reb. f. 146. engl. bot. tab. 52. C. f. 146.

Flor. Reb. f. 1. c. XVII tab. MCLXVII. engl. bot. tab. 52. C. f. 146.

Hab. in sylvestris in Korn (MN) Pantk. fl. alibi, rame viride. H. naja, subtilis. Trichocarpus.

dopo l' *Agrostis vulgaris* Willd.

Agrostis olivetorum Godr. et Griseb. Fl. de Prov. part. I. p. 483.

A. oblongo-ovata dein patentissima, ramis flexuosis, cibriae pulchra glumella
superioris ~~inferioris~~ ^{superioris} ~~glumella~~ ^{glumella} ~~exserta~~ ^{marginata}, superiora tripla ~~glumis~~ ^{glumis} exserta, foliis ovatis,
tripli-lanceolatis planis, ligulae obovatae exsertae.

Hab. in graminosis ~~circa~~ ^{Cattaro} in Dalmatia. - Inventus dom. Skodnicki. W. Jev.

Obs. Specie a *Agrostis vulgaris* cui simili. Ab *A. canina* L. differt foliis
tripli-lanceolatis planis et glumulis geminis.

Dopo il *Tunus acutus* L. by H. Adonis p. 112 spp.

Tunus Tommasinii Parl. Fl. Ital. II part. 2 p. 315

I. culmo nudo, foliisque ~~triangularibus~~ lanceolatis tenuibus paucenervis, cyma terminali ^{lata} ~~opposita~~
acute, floribus 2-nerviatis, involucro foliis ^{cymaem reman} inferiore subsequenti
perianthio phyllis subaequalibus ovatis, exterioribus acutis, interioribus obtusis
Hab. ^{foliis} ovali-globosis obtusis, perianthio duplo longioribus -
in paludibus salinis

16. Mayo Tunus - Perenn Legit

- Dianthus barbatus. L. Oct 17. Same b.
Senecio pectinatus L. Oct 25 Nov. 65. - subsp. altissimus L. Oct 23
Sedum spathulatum var. ciliolatum L. Oct 25 Aug. 65. ag. ba
Centaurea ornata L. Oct 26 Nov. 65. ag. ba
Centaurea ornata L. & M. Oct 30 Jan. 63. ag. ba
Querque flaccida +
- cyathiferus & Q. pallida. Same b. } 30 Jan. 63.
Carpinus Betulus + ib.
Carduus cornutus var. glabriger + L. Oct 23. ag. ba
In d. d. C. tenuifolia ^{var.} et C. tenuifolia agg. L. Oct 27 Aug. 65
C. tenuifolia nov.
Tephritis fructici Griff. V. Oct 15 Sept. 65
Festuca alpina Kabbar ib.
Stachys amplexicaulis V. 1st week. Panz
Centaurea stenocephala L. Oct 23. ag. ba
Silene vulgaris Boiss. L. Oct. 23. ag. ba. L. Parviflora Boiss.
Myrsinum laevigatum M. uncinatum L. Oct. 23. ag. ba
Picridium acanthoides + L. Oct. 23.
Trifolium repens L. Oct 18 Nov. 65
Dianthus arenarius Panz + Dianthus rotundifolius Griff. in. Nov. 17. 65.
Centaurea Solstitialis Raska (non Wulff, Podejew.) C. centaurinae
L. Boiss. L. Oct. 18. 65.
Gennaria tricolor L. Panz + aploid. in. Nov. 18. 65. L. Oct. 18. 65.
Phlomis avicularia Panz + an. Tuleyan. Boiss. V. Oct. 18. 65.
Erythronium latifolium + V. Oct. 18. 65.
Arum italicum Panz + A. foliosum L. Oct. 25 Aug. 65.

Piante terete da epoca invari

vivente + da domanda *

Rubuska leibnizii + con lett. 27. Decr. 1853.

Paeonia lactiflora + v. lett. 1. Giun. 1863.

Cistus marmoreus + (Lindleyi) v. lett. 2. e 30 Giun. 62. 24 May 63.
— brachycalyxus nervosus + v. lett. id. ^{st. delto.} ^{cult. calyculi lappos.}
brachycalyxus Lindleyi V. id.

Theratia celsa + v. lett. Giun. 62. in damp meadow. v. lett. 15. Jun. 63.
Dianthus galathicus sp. diff. Pano. Campania. Sch. in damp meadow. v. lett. 26.

Dianthus galathicus — loc. in damp soil. Hoff. v. lett. 15. Jun. 63.

— liberinus + v. lett. 18. Ott. 1861 + 17. Ott. 63.

Rapido a frusta lisa hirsuta v. lett. 1. May. 62. e 28 Aprile 62 - 28 Ott. 62.

Primula intricata Sol. v. lett. id.

Brunia cornuta ? v. lett. 30 Nov. 61.

Solabitus ^{dubius} Pano. v. lett. e 26 Nov. 61. et Chrysanthemum strobulosum
precoce

Aquilegia odora v. lett. 28 Ott. 62

Oxyglossum nov. sp. v. lett.

Edelweiss Thelypodii Pano. v. lett.

Gilia arvensis plena d. v. lett.

Tonka Kladrubia + id. v. lett. 30 Nov. 61

Dianthus urbicus + id. v. lett. in liberinus + lett. 18 Oct. 63.

Senecio virens t. id. v. lett.

Priscillia (accident) + id. v. lett. 14 luglio 63 - 17 Giun. 65

Alyssum Portentum v. lett. May 62

Baccharis v. nov. ^{var. nov.} ^{var. diff.}

Cotula parvula } v. lett. 12 May. 61

Osteosperma lippiae } v. lett. 12 May. 61

O — brachycalyx }

— nutans ? chlorothrix ? v. and. lett. 28 Giugno 64
del M. de Lovrin, an east ac-

Fimula anagallisoides v. lett. 20 Giugno 62

Scrophularia aristata v. lett. 27 Ott. 60 ^{det. Spontanea de}

Lavatera inflata v. lett. 20 Ott. 59.

Thlaspi v. nov. v. lett. 15 Sept. 58

Sinuaria heterotricha + lett. 9. Decr. 1863 - 17 Giun. 65

Rubus marmoreus + pulcherr. v. lett. 18. Oct. 63 - 28 Nov. 63

Allium ursinum Pano. + lett. 16. — 12 Giun. 65.

Lavatera procera Pano. v. lett. 14 luglio 1863 - 21 Apr. 63 aut. 60.

Daphne sp? v. lett. M. de Lovrin, v. lett. Domitius v. lett. 12 Giun. 65

Stachys sericea
au feuillage manopérme Boiss?

Spécie bien différente de toutes les espèces végétées - Althaea sericea
Boiss. au sens strict 1870. Il Boiss. la distingue de *S. macrorhiza* Negev. p. 81
et Soc. II. Vp 43. C'est une

Stipa cerniorum

Parait une espèce non décrite, de moins grande
longueur par Boiss.

Althaea taurinensis? Krugjernij n. sp.

La plante de St. se différencie par son indument noir et
velouté, les fleurs agglomérées presque sessiles à l'ovaire
et au calice longuement et fineusement amincies. La tige est
voisine de *A. caucasica*, mais le sommet à ses feuilles disées
jusqu'à la base en 3 ou 5 segments, et les capuchons glabres et portant
minuscules - Une plante non nouvelle Boiss.
Stamine oblong lâche à la fin longue bracte. Spéc.

Crocus cretensis?

Le Crocus cretensis d'après la description est une plante très
voisine de *C. vesiculosus*, qui est une espèce bien différente
de la vaste d'une tout autre aire géographique. L'espèce
de la Crète est bien probablement nouvelle.

Genista incana?

Même opinion que *G. incana* Spach, une autre à M. Boiss.
Sect. G. Sabill Boiss.

Malvastrum bicolor?

D'après de toute la spécie vicine Boiss.

Prunellaria fors. I. Reichenbachii Kuntze.

Le piante di una specie nell'edizione Haynei non furono più distincte
della piante tuta.

Cystopteris comatum ad rupes hortis austriacis (Baudisch?).
Le pycnidia cum chlamys dactylifera pulchra. Et cetera
mentre tunc. Del Boissier et Vauquelin come minor, e mori
nate ut me E. aciphyllum che però è penne. Pang.

Soyera serbica dedicata meae del Dr. Schatz bij vel
XXII - XXIV Jahrsbericht der Polizeiie 1866.

*S. serbica** in litt. ad Pang. — Hierum orthodice
Pang. v. p. 87. In parvij montis Kopaonik Serbe
merid. Iulio. Pappus est alterius nubilis Cephaelij Pang.
in roched. Hachey etiam paludosi sed pappus minor,
caule spathaceo-pedalis et cephaliz cum folijs nubilis
hirti. Capitulum hinc iuxta rudimentarium insuper
observatur. Certe antecedentibus (*Soyera lyata** *S. laevigata*
noidei Moench et *S. hieracoides** congener.

Potentilla a monte Zabov *P. rupestris* Pang. herb.
diffit ab hac floribus minoribus, petiolis obovato-cuneatis
distichis (sevis vix flaveantibus) indumento duorum
tronon (hinc fors *P. mollis* dicend) non obstante epitheton
mollissima speciei alterius sectionis a Lehmann datum p. 104.
foliis non dentatis sed crenatis, nervis in superiori pagina
depressis (non prominulis) ut in *P. rupestris*.

Kochem erigensib[us] Pang. v. p. malus R. leucostachya et Boissier et
Kerner le indone meae e drupa della K. grandiflora, Kerner anche
della sua carnosissima.

Dipsacus trichotomum Pau. var.
Boissier, Pavlatschin, Ranké, Kerner ed altri dicono le specie vicine. Il
Ranké l'ha raccolto "le state pesate nelle Balcani", in declivibus
glandulosi, siccis, stantis, pape, Kalafes ad v.vi. mont. Balkan
Thraciae locis, e me l'ha mandato con le affiche que J. Stark
et J. Reinwardt, che certamente ne sono molto disprezzi.

Rosa belogradensis

Mingopogon or *Staudnica* - An *R. Samaritana* Boiss? -
various names of Dr. Crampton.

Alyssum cuneatum Stol. Affinis *M. ligulatae* et *M. minuta*.

Host

Palamintha subnuda ~~Hedw.~~ - bene

Stachys recta L. bene

- *Mentha dulmata* Dauv. ex var.
azoricanae - *Calamintha nepeta* f. ~~strobilifera~~ f. ~~dalm.~~

Carex chrysacanthoides Ten. - bene

Luzula palustris Boiss. non Willd.
ab anthers ^{longitudine} ~~similium~~ C. ~~leptophylla~~ f. ~~leptophylla~~ L.
^{non lessigii}

Trifolium tenuifolium Ten. - bene
justa ironii Rehd. f. et fl. dalm.

Ononis foetens All. non distinguenda
ab O. spinosa L.

Oenothera antiqua Boiss. f. fl. dalm.
var. ^{capitata} quibus notis differt ab O. antiqua
non L. et Boiss., nam ex Boiss.
fl. orient. non liquet.

Viola scotoplylla Jord. capio ut
michi transversum drapetionem
ex Jord. ob ^{gall.} ~~garam~~, cum que
hoc michi derit.

Victor von Janka.

Heliosperma Veselkyi Janka Schlechtdal Linnaea 1858.

Perennis; herba tota canescen-ti-virescens, glandulis destituta, vel pedunculi apice tantum foliis, saepe abortivis instructa. Caules e caespite plures basi lignescentes adscendentibus, saepe geniculatoflexi, humiles bipolligares, aut majores, spithamei, villo lanaeformi ut etiam superiores plantae partes (excepto calyce, qui, paulo tantum, glabrior), patulo obtecti, a medio circiter dichotome ramosi: rami inferiores, simulque terminalis flos longissime pedunculatus (pedunculus in singulo ex specimini- bus, quae ad oculos habeo, 17 lin. longus est!), divergentes divaricatique, vel superiores cum ramis patuli. Turionum folia bombycino-pilosa, caulinaque infima nunc spatulata apice rotundata, in petiolum attenuata, nunc oblongo-vel sublanceolato-spathulaeformia; — lamina plus minus exarato-punctata; folia caulina caetera sessilia, saepissime arcuato-reflexa, internodiis plerumque breviora, lanceolato-varia, vel late-linearia, rarissime occurunt subovata. — Internodia mox pollicaria sunt, mox (in speciminiibus scilicet vegetioribus) sesquipollicem longa; rami foliis, ex quorum axillis enati, multoties longiores.

Calyx sub anthesi $2\frac{5}{12}$ lin., fructifer $2\frac{3}{12}$ lin. longus, clavato-campanulatus; laciniae 5 subtelligentiam

hujus partem aequant, ovatae, rotundatae sunt, i. e. obtusissimae, paulo albo-hyalino-marginatae. Petala calyce duplo longiora, alba: e basi angustissima sensim dilatata, sub coronula constricta, profunde bifida. Coronulae dentes 2 acuminati, ultra lineam longi. Stigmata 3, rarissime 5. Capsula carpophoro $\frac{8}{12}$ lin. longo est sussulta, $1\frac{7}{12}$ lin. longa, subglobosa (matura), calycem minime superat. Semina reniformia, secus dorsum cristulis manifestis instructa.

Habitat in rupestribus ad romanorum balneum pr. Tüffer Stiriae inferioris. Ineunte Julio 1856. detexit cl. de Veselsky.

Species e distinctissimis, *Heliospermati Tommasinii* Vis. et *H. chromodonto* Boiss. et R. proxima; in priore flores sunt majores, et capsula thecapophoro insidet aequilongo; — posterior vero habet seminum cristulas dorsales longiores tenuissimaque (dentium calycinorum hujus color levissimi mihi momenti); *Heliosperma quadrifidum* denique, quod seminibus gaudet majoribus, glabritie omnium partium etc., sicut *H. pusillum* Vis. longe distant.

Pinguicula hirsutissima Ten. Fl. Mag. III p. 201.
P. ulmaria Jobst. sub *P. subaequante*, loco Boiss. Fl. Vor. IV p. 2
corolla ^{festuca} ~~infuscata~~ ^{infuscata} velutina, capsula
glabra calyculi subaequante

Syn. *P. lactea* Pantk. L. C. p. 84. *P. albicans*

Ezq. p. Krum. II. p. 9.

Hab.

Icon. Den. Fl. Mag. III tab. 201

Galium rigidum Wettst. et Aug. prid. fl. hsp
lucidum. — DC. *G. rigidum* disc. 1828. 2029.
G. interne pubescens, caule suffruticoso(?) foliis
8-10 aciculatis, rami inanis, oblique
margini revoluti, panicula laxa cordata
lobis apice rotundatis mutatis. H. ochroleuca
Differt *Galioea verosa* Sol. aughustinae inanis, concreta
lobis apice rotundatis a *G. erecta* var. *brevia*, foliis
margini intus, apie ~~acuminatis~~ ^{oblique rotundatis} lato obsovo-
cr. Koch tendatis.

Suppl. II.	Suppl. II.
<i>Bunium tamifolium</i>	<i>Valeriana Berbicea</i>
— <i>ornatum</i>	<i>Lirium demissum</i>
<i>Lopholaenia aurea</i>	— <i>appendiculatum</i>
<i>Anthriscus laevigata</i>	<i>Chrysanthemum leontium</i>
<i>Caltha grosse serrata</i>	<i>Campanula hispida</i>
<i>Corydalis pseudocava</i>	— <i>monanthos</i>
<i>Arabis rivularis</i>	<i>Cerinthe Smithiae</i>
— <i>crepidijoda</i>	<i>Sutellaria pauciflora</i>
<i>Thlaspi cuneifolium</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Viola Nicolai</i>	<i>Himium thysoides</i>
— <i>guicosa</i>	<i>Athamanta scardica</i>
— <i>clementiana</i>	<i>Sesleria Pantoreitidis</i>
<i>Dianthus festigatus</i>	<i>Oryzanche Kappii</i>
<i>Silene Leptotricha</i>	
<i>Rhamnus illyrica</i>	
<i>Rosa Helvreichii</i>	
— <i>Virginica</i>	
<i>Rubus Pantoreitidis</i>	
<i>Potentilla Montenegro</i>	
— <i>Tanacetum</i>	
<i>Geum pseudomolle</i>	
<i>Vicia serrata</i>	
<i>Heliosperma macranthum</i>	

- Salix hastata* (nob. Waldtraude)
Cronis vera-grundst. hact. C. bonnetii
Glauculus septem hct. G. imbricatus
Orchis spitzelii hact. B. leuckartii ^{Nat.}
Platanthera bifolia bene cum nob.
Rumex campestris L. bene Engl. bot. 1533
Mulgudium alpinum ^{n. c. MECH.} Landz. bene
Centauraea caloccephala W. var. B.
subintegerrima : fol. infer.
integri vel basi integris his: in
in Vlasfirz in reg. sept.-occid. Bosnie
Anthemis tinctoria pr. Dracunc. ^{sententias} hact.
Petasites albus Gaertn. inter Juncippe
et Duncorum et in Vlaeis super Breschaz
Galium boreale L. bene
(aug. Wauneri Nochel ad recta prope capilla
Schwetzkirch bene
Phyteum officinale var. cordata Grif.
Lathra squamini bene
Debauche Sabionae (Salis) 1733
Pedicularis leucodonta var. pol. caeruleo-integri
bracteosa in Vlasfirz
Silene viscaria Boiss. (Grif.) tab. 53. ^{Vlasfirz}
Leseli montanum ^{L?} an varium ^{achor} Nochov
Bupleurum longistylis L. laxiflorum
1733 n. Vlasfirz -
Eryngium alpinum - bene
Lomatium europaeum - bene
Daphne hybridum (fren.) bene
Polygala amara Schreb. hospita necroscia
Ha Weizallm. - Guerigant, Buchhornick ^{Prag.}
Silene nemoralis (itab.) hact. Monac.
Geranium bosniacum (phaeum)