

Varsoviae, die 2 Martii
1888.

Mustisime Vir!

Mensem Julium praeteriti anni contigit
mihi peragere in pergravi silva Białowie-
ża, sita in Lithuaniae palatinatu Grodnen-
si ($52^{\circ}51' - 52^{\circ}59'$ latit. et $40^{\circ}10' - 42^{\circ}$ longit.
a Ferro); quam silvam, unicum nunc
domicilium celebre urorum (*Bos urus* L.)
nondum Letanicorum pedes attigerunt.

Flora hujus silvae, sitae in planitie
et non multo magis ad septentrionem,
quam Varsovia, remotae, - non tam
numerositate specierum ~~est~~ insignis
est, quam potius magnitudine ac amae-
nitate singularum specierum, atque
nonnullis novis speciebus simul novis
musticibus jam cognitarum specierum.
(ad exempl. *Saccalis quercina* L. libenter
ad pinos putridas provenit). Etiam plura
hujusmodi exempla inter musci et bachi-
nibus inveni (*Neckera complanata* et
pennata, *Sticta pulmonaria* ad truncos
et ramos piceos).

Ego, qui decembri a. 1886 benignos-
me sum a Vobis adjutus in nonnullis

fungis determinandis, et nunc simili prece
vos vexare audeo. Imprimis rogem, ut e
descriptione trium novarum specierum, et
adjectis exsiccatis, censere velitis, an ve-
ra novae sint.

Iterum adjectis exsiccatis *Pol. marginati*
(an bene determinari? forsitan *Pol. pinicola*?)
communicare velim hunc fungum fere
saepius ad truncos piceos, quam frondosos,
^{a me in silva Byalowieca} inventum esse, quum *P. marginatum* multis
ad truncos arborum frondosarum provenire
scimus. Quare nescio, utrum modo novam
nutricem *P. marginati* prae se habeamus,
an forsitan *P. marginatus* modo formae
(in arborib. frondos.) sit *Pol. pinicolae*, vel
vice versa. Id unum communicare non
dubito, eandem speciem *Polypori* provenire
ad truncos acerosos et frondosos, et illi
speciei respondere simul descriptiones et
P. marginati et *P. pinicolae*; quorum
autem primus modo in arboribus frondo-
sis, secundus in acerosis provenire judi-
catur.

His dubitationibus meis dissolutis
velitis benignissime responsum mittere
litteris inscriptis

Fr. Blouski
Rue Karmelicka A 27 Varsovie

Species pro novis a me descriptae:

1. *Polyporus simulans*.

Pileus dimidiatus, sessilis, subimbricatus, semis,
carneo-lentus, planus, pubescens, subzonatus,
sordide flavido-albescens, margine acuto. Pori
angulatis dentatis, junioribus integris, adultis
laceratis, sordide violaceis.

Hab. ad truncos betulae, in silva Białowieska.
Totus habitus, praecipueque pori simulant *Pol.*
abortivum, a quo tamen differt pileo pubescenti,
non strigoso, et sete (ad truncos betulae).

2. *Polyporus lithuanicus*.

Pileus dimidiatus, sessilis, rix imbricatus,
carneo-suberosus, ^{lent subulat Zonatus} ~~subzonatus~~, saepe striato-
radiatus, villosus, demum glabrescens, exlus
intusque ^{late croceis auriferis} ~~intense sive lateribus~~, margine
acuto, subincurvo, magnitudine varius
(saepissime 4-8 cm. long, 3-5 cm. latus,
6 mm. crassus). Pori mediis, angulatis
inaequalibus, saepe laceratis, pileo con-
coloratus. Annuus.

Hab. ad truncos vetustos *Quercus*, ibidem.

3. *Xylaria entomophila*. (Leob. *Xylorhiza*).

Stromate erecto, simpliciter, filiformi, ~~crassius~~
~~sive crassiori~~, recto vel saepius flexuoso,
semiter longiorum striato, atro, glaberrimo,
3-5 cm. alto, 1-1,5 ~~cm.~~ mm. crasso, apice
sterili, albo; ~~et~~ stipite glabro. Asci — ?

Spons ————?

Hab. in Carabo mortuo in silva
Bialowiesca.

Vester devotissimus servus
A. Bloisitz