

multiseptatus Berk

1. *Dacrymyces* *Saccarionus* nov. sp.
Subcaespitosus, gelatinosus, undulato-
plicatus, aurantius (exsiccando etiam
saturatius coloratus) usque ad 3 cm.
latus. Sporae oblongato-cylindricae,
curvulae, longit. 14-18 μ , crassit.
5-6 μ , 4 vel etiam multiseptatae,
in massa aurantiae.


In truncis pini et piceae autumnis
copiose lectus (Silva Bialoviensis).

2. *Polyporus* *simulans* nov. sp.
Stipes sessilibus, dividiatis, porice
non raro attenuatis, vulgo effuso-reflexis,
caespitoso-imbriatis, confluentibus,
laevissimum diam. 2-3 cm. coriaceo-
~~bus~~ lentis, utrinque planis, tenuibus,
velutinis nec esonis, sordide flavido-
albescantibus, margine obsoleto,
acutis, glabris. Poris angulatis, denta-
tis, junioribus integris, adultis
(praecipueque siccitate) laceratis,
fuscoviridacis.

Hab. ad Armeos prostrato putrescentes
betulae, in Silva Biaburica
(Lituania).

Totus habitus, praecipueque pori
simulant Pol. abietinum vel (in statu
sicc) Sclerotium unicolorum. Tamen a
Pol. abiet. differt noster praecipuus
pileo subarano velutino, non villososono
et sede; a Scler. unicol.
specimina viva Pol. simulant optine
forma coloreque pororum, sicca
autem modo eorum colore et pileo
nunquam zonato-arigoso certe distin-
guenda.

3. Polyporus Postafinskii nov. sp.
(in gratiam Del. polonici mycologi)
Caespitose - multiflex, fibroso-casarius,
firmulus; pileis imbricatis, inaequa-
libus, undulatis asonis, opacis,
luteo-rufescentibus, saturatis flo-
culoso-furfuraceis, intus albis,
fractis subferrugineis (sicca
fractis subatutaceis). Pori rotundi,



Ag. (Collybia) gregarium

b. Ag. (Collybia) gregarius nov. sp.
 Caespitosus: numerosi stipes
 (100-150) basim conjuncti. Pileus



Vol. Jundrellianus.

Stems, suberectus, centro hirsutus.
 Stipes aequalis, basi leviter incrassatus,
 latus, albus, fibrosus, striatulus,
 (clavophyllis) rarius

Clavophyllis
 Kluckii
 1890



Sg. (Clitocybe)
 Eismondii

6. Ag. (Polypodia) gregarius nov. sp.
Caespitosus: numerosissimi stipites
(100 - 150) basin conjuncti. Pileus
carnosus, campanulato-convexus, mox
explanatus, gibbus, nudus, mollis. A
hygrophanus, griseo-cinereus, margine
attenuato exallescens, fibrilloso-
virgato. Stipes subcavus, 8-16 cm.
altus, 6-10 mm. crassus, fibrillosus,
fortis, striatus, albus. Lamellae
albidae, confortae, inaequales, basin
venoso-connexae, decurrentes vel
adnatae.

Odor levis, jucundus. - September.
Ad terram usque sitra mixta, ibid.

7. Ag. (Clitocybe) Eismondii^{x)} nov. sp.
Pileus e convexo-plano-infundibuli-
formis, obtuse umbonatus, carnosus,
senuis, visco compacto, non hygrophanus,

x) cujus haec ego prima studia botanica
decem annis ante incepti.

Stems, subulens, centro hirsutus.
Stipes aequilis, basi leviter inermis.
Satus, albus, fibrosus, striatulus,
Squamulos atris exasperatus.
Lamellae confertae, adnatae vel
adnato-decurrentes, albae.

Odor acidulosus.

Inter folia decidua in silva frondosa,
Septembri 1888 lectus (Bialowieza).

Semres, integri, minuti, sulphurei,
saepe rufescentes.

Hab. ad truncos putribo fructuosos, ibid.
Pol. gigantes nec minus Pol. imbricato
e descriptionibus simili videntur.

4. Polyp. Jundrikkianus^{x)} nov. sp.
Pileus infundibuliformis, 7 cm. latus,
carnoso-lentus, ochraceus, squamulis
adpressis subobscurioribus concentricis
ornatus, intus albus. Stipes centra-
lis 3-4 cm. latus, 1 cm. crassus, aequa-
lis, ~~sub~~ scaber, dilute ochraceus.

Pori medi, semres, angulati, decurren-
tes, albi demum lutescentes. Sporae
hyalinae (in massa albae), ellipsoideae,
rectae, longit. 7-8 μ , crassit. 3 μ .

In ligno vetusti quercino, ibidem.
A Pol. brumali differt etiam forma
et magnitudine sporarum.

5. Sq. (Cladopus) Klukii^{x)} nov. sp.
Pileus carnosulus, conchato-reusiformis,

x) Jundrikkus et Kluk primi fuerunt polonici
mycologi.

2-6 cm. latus, putrescens, griseo-
~~at~~ alutaceus. Stipes 2-3 cm.
longus, curvulus, basim tomento
albo obiectus. Lamellae confer-
tae, decurrentes, albidae mox
maturescentibus sporis ^{amane} rubeo coloratae.
Sporae ellipsoideae-sphaeroidae,
5-6 μ longae, 3 μ crassae.

Hab. ad ramos et truncos euvor-
tios putrescentes. Primo autumn.
Ibidem.

Cl. byssidea affinis videtur.