

S^{te} Diète nov. 1893

Honoré Monsieur,

Comme le Ptychogaster que
je vous ai envoyé ne se trouve
sans doute pas en Italie, j'ai
pensé qu'il vous intéresserait et
puis j'osais (qu'il soit nouveau
ou non, peu importe) que vous
m'en fassiez une description pour
la Revue, si vous le vouliez bien.

Je l'ai trouvé sur chêne, épicéa,
débrié de pin sylvestre et même
sur le sol avoisinant.

Monsieur le Professeur Saccardo.

Lichantheum sec (une tranche)
a été cueilli un mois avant
l'autre frais. — Il était alors
~~comme~~ à peu près uni à sa surface,
c'est-à-dire sans lacunes à sa
surface, seulement un peu velu.
Même il est extrêmement laciné à
sa surface, il présente des fentes
et des lacunes : on ne peut mieux
le comparer qu'à une éponge : il
est entièrement blanc. — Il se
tache dans les fortes pressées, les
spores lui communiquent une couleur
ocreuse.

M. de Rolland à qui j'en ai
communiqué, le considérait comme

le Ph. albus et sans doute aussi
M. Boudier qui considère comme
identiques albus et Richonii.

« Corda parle de cellules flexueuses
et non d'hyphe flexueux. À le
Ph. albus est composé de filaments
se terminant à des hauteurs diffé-
rentes par des bouquets de conidies ;
de la l'apparence de cellules dans
le corps du champignon et à différentes
hauteurs. Ces cellules sont flex, ou
moins flexueuses d'après la position
et la prolifération des conidies. » Celle
est, d'après M. Rolland, l'opinion
de M. Boudier que je pense utile
de vous soumettre.

Je joins ici un Fusorium (?)
sur lequel j'aimerais aussi
avoir votre opinion


Truilly agréer,
honore Monier, l'expression
de mes sentiments respectueux

Rene Ferry

Armen. de Robach
St Die (Voges)

Croquer sur un bolus richautillon
ci-inclus avec beaucoup d'exactitude.

Sur les racines de graminées
coupées par le fossair on voit apparaître
une matière glaireuse; puis au bout
de quelque temps elle s'organise en une
~~coque~~ espèce de membrane jaune
formant comme une petite cloche
à l'extrémité de la racine (elle
a alors l'aspect d'un Mitrate à
distance), enfin elle sèche et prend
une couleur cendrée.



Au microscope la matière
glaireuse ne présente qu'une masse
granuleuse. Les deux autres
stades présentent, au contraire, des
croissants cloisonnés (télénospores),