

Az. B. 32

Le vacanze autunnali
dell'anno 1860

*Illustrazione
delle
piante Montelliche rare
o forse nuove.*



Caratteri e descrizione di alcune
piante non pervenute a me conosciute
o forse nuove

1. *Spiraea tanisifolia*, sauar. An
Spiraea charnedrifolia L? 2 *S. procumbens*

Linn. Syst. veg. ed. Murray et Persoon - p 377.

Vitman - Summa plan. v. 3 p 249 - Re. giardin.

v. 2° p 326 - Sartorelli. alb. ital. p 210

Ch. generif. Calix 5fidus. patens, inferus - Petala 5 -
Capsulae 3-12, intus bivalves mono-trisperme.
Sebastiani. Fl. romana - p 167 n 225.

Ch. species. S: fruticosa - foliis petiolatis, ovatis, scitatis,
a medio acutis ad apicem serratis, subtus albido-
glaucescentibus, glabris - corymbis terminalibus
umbelleformibus pedunculatis - floribus parvis
lis congregatis - Nobis.

Habit. Ad rupium fessuras abunde. in Corvulo
ruri Provinciae Tanisinae.

Descrizione ed osservazioni

Fusti radicalmente ramosi - Rami alquanto flessibili, rubiginoso-vellutati - Foglie picciolate, ovato-acuminata od ottuse, nella metà superiore seghettate, di un verde oscuro. nella pagina superiore, biancastro-glauche nell' inferiore - Fillosi $\frac{1}{3}$ - Corimbo terminale gambutato di molti fiori racemati, allargato ombrelliforme - Patali dei fiori circolari bianchi - Caselle da 5 a 6 per ogni fiore, irregolarmente triangolari; superiormente acuminato-mucronate. Semi per ognuna da 2-4.

~~Agave~~ *Desonziaria* né del Vitman, né del Lamarck, né degli altri autori da me posseduti combina coi caratteri della mia *Spiraea*, se per già questa non potesse essere la *Spiraea chamaedrifolia*.

folia 4 che dall'altro lato molto si discosta dalla mia pel carattere: folia ternata-quaternata, quina, obtus etc etc posciachè la mia ha foglie solitarie e alterne.

2. *Styngianthes montellia* - Sacar. - Si Nov. gen.

Panicum ^{*undulatifolium*} *rancescens* - Sac. - Sten

Panicum hirtellum - Lin? Spec. plon. t. p. 83 n. 4.

Lin. - Syst. veget. p. 74 - nota 3 - Vitman. vol. 1 pag. 164 n. 11. - Linn. Sgs. nat. vol. 3 p. 88 n. 4.

Ch. generis. Calix 2 valvis, valvula exterior valde minore, quandoque obsoleta, 2 floris - Florulus inferior unisexualis vel neuter glumis 1-2 hexa-
laccis: superior hermaphroditus glumis 2 coriaceo induratis persistentibus - Inflorescentia varia - Seba. traus. Flo. rom. pag. 12 - n. 36.

Ch. species *Panicum hirtelli* - Spica composita; spiculis adpressis alternis, calicibus geminis, valvulis omnibus aristatis, externa longissima - Witm. loc. cit.

Char. species nostrae. Spica plerumque simplicis, rarius
composita, spiculis remotis, alternis, sparsis,
numquam secundis; valvulis omnibus aequalis;
valvula externa longissima aequalitate lobis

Descrizione ed osservazioni.

Calmi eretti o quasi eretti alti da mezzo ad
un piede, diffusi, coperti da lunghi e finissimi
peli bianchi. Foglie alterne ovato-lanceolate, un
po ondulato, leggermente pelose, mediocemente
vaginate. Rachide nella sommità tortuosetta.
Pannocchia spighiforme, qualche volta ramifetta.
Spighette di 2-3 fiori agglomerate. Invoglio
unifloro con tre coste, l'inferiore lunghissima.
Aste soffici glutine visose. Tutta la
pannocchia gravemente olezzante da grasso rui-
do proveniente dal glutine untuoso delle coste.

Questa graminacea combinerrebbe alquanto
col *Panicum histellum*, solamente si allontana
per i caratteri: Spica composita... spiculis adpressis...

vaginis longis... Spica secunda... ed ante.
Panicum arcinatum Del Vitman e del Tolyderch (1)
poiché la nostra ha la spiga semplice,
le spighette non compresse, le vagin corte,
la spiga sparsa e non laterale e le coste sempr
dritte. —

(2) Pistilli a due stimmi pennati di bel rosso.

(1) Stolon protetti a terra, serpeggianti; radice
filiiformi.

Rad. In umbosis, udis, petrosi memoris Mon-
telli.

Questa pianta è il *Panicum histellum* Walp. ex Jac. coll.

Secu: *Panicum Buxonanni* N. Bieb. Fl. tou.

Oplismenus undulatifolius Kunth. En.

Orthopogon undulatifolius Sprengel. L.

non è però il *P. histellum* di L. e di Vitm.

System. des végétaux par Linné, augmentée par N. Tolyderch.

3. *Gentiana asclepiadea*? - an. sp. nova?

Synon. - vide - pag. 21. *Gentiana montelliana* - Nob. si. sp. nov.

Char. spec. *Vitmanni*. loc. cit. *G.* corollis 5-fidis campanulatis oppositis, sepilibus, foliis amplexicaulibus.

Char. nostr. *G.* corollis quinquefidis campanulatis binis, secundis brevissimis produnculatis - Foliis sub-quinqueversis oblongo-acuminatis sub-sepilibus, Nobis.

Descr. Cauli erecti, tereti, alti duo pedes circa. Folia binata, opposita, ovato-lanceolata quasi internodis. Calici dei fiori tubulati, 5-fidis con 1-2 append. foliaceae alla base - Fiori campanulati, binati uni laterali di un bel ceruleo, apici brevemente picciolati; superioris, gl. inferiori di meno. Capselle bivalvi multoculari, polisperme. Semi minute alati.

4. *Bidens bipinnata* L. an sp. nova?

Synon. - vide - fol. 20. *Bidens alienigena* - Nob. si. sp. nov.

Char. speciei *Vitmanni*. loc. cit. *B.* foliis bipinnatis, incisif, caly-
cibus involucreatis; corollis semi-radiatis; seminibus diver-
gentibus - et vide

Descr. part. Caulis 3 ped. et ultra, geniculati, sub angul.
ramosi, viridi rubentes - Tolia opposita - Flosculi lutei, ap-
cibus fusciscentibus - interdum carent radio - interdum
flosculo uno, alterove radiante - Lacinia linearis ob-
soleta 4-gona, amota intermedia longissima - Vit. loc. cit.

Char. speciei nostrae: *B.* foliis bipinnatis, incisif - Calyibus invo-
lucreatis - Corollis (plerumque) radiatis - Acheniis tetragonis
quatuor-transversis sphaerice divergentibus - Nobis.

Descr. Caulis nitidissimo quadrangolare ad angoli smussati -
Rami oppositi involucrati; alla base un po ingrociati
Cauli e rami di un sanguigno oscuro - Folia oppo-
sita lungamente picciolate, bipinnate; pinnette ottuse.
Calici con 8 involucri (ovoli) fogliacei - Fiori raggiati -
Raggi da - circa, interi o smarginati. Disco
e raggi di color giallo.

Sia il vero i caratteri che danno gli Autori alla *Sedum*
hypnoides, descrivono quasi perfettamente anche la
 nostra, e se già non fosse un poco di intropi-
 trazione di epa e indigena alla Virginia, mentre la
 nostra si trova qui propagata, e senza averlo per
 antecedente propagazione, siamo certi che ben tosto
 e senza dabbizza a questa l'avremmo inferita, ^{anche} ~~mentre~~
 stando, alcuni piccoli caratteri la discostano —
 Sono: corollis semi-radiatis: flosculi lutei apicibus
fuscescentibus: antheris medio longissimis; avendo
 anzi la nostra le corolle raggiate — i fiori (sia raggi odori)
 tutti gialli e le teste uguali, meno una più piccola.

Osservazioni sopra alcune piante rare
 della Provincia Prigiana.

N. I. *Dentaria bulbifera* Linneo

Syn. Linn. Sys. veg. & Murray & Persoon p 468 — Vitman-Summa
 plant. v4 p 34 - n 963 — Re. giorn. p 114 - n 1 — Berg. Fogg.
 Ist. bot. v 3. p 15. n 959 — Brevisan. nei Colli Eug. p 191 - n 2.
 Maironi - Tre vici - p 57 — Sebastiani - R. romano p 215
 n. 746 — Guillemin in Dig. nat. v 5 p 478 —

Char. speciei: *foliis inferioribus pinnatis, superioribus simpli-*
bus; axillis bulbiferis — Sebast. loc. cit.

Abit. Nasce lungo la *Riverana* nel Montello in luo-
 ghi umidi ed apaci.

Osser. È un bello esemplio di pianta ovipara producen-
 do grosse gemme, le quali cadendo in terra met-
 tono radici e formano altre piante. — (Par. Tozz. Licet)

Aggiunte alla Synon. *Dentaria bulbifera* — Lot. Ic. ster p — tavola
 684 fig 2 — De Caudale — Reg. veg. Syst. nat. orbium
 2 p 278 - sp 14 — Linn. Spec. plant. vol 2 pag. 912 n 2.
 Linn. Syst. nat. vol. 3 pag. 433. n 2. Romano. Plant.
 ital. in. Durant. v 12° pag 243. — Samont. Botanico.
 vol. 8° pag 173. n 1.

N. 2. *Cardamine trifolia*, Linnei.

- Synon. — Linneo Sys. vegit. p. 469 - n. 1 — Vitman Sum. plan. v. 4
p. 36 - n. 964. — Maironi: Str. reg. berg. — p. 54
— Iberidi Tuchsii affinis trifolia, Cardamine Clusii
Chabrei — Stirpium icon. et sciz. p. 283 - fig. 2
— Nasturtium montanum — Neudgel. Ind. plant.
Ch. species: foliis ternatis, obtusis — caule subnudo — Vit. loc. cit.
Abit. Nasce lungo la Padovana, la strada nuova, nel
Castel sottoterra, nel Montello, in luoghi umidi
d'ombra.

Offerta. Non trovo che questa pianta abbia prerogative
alcuna che nella pasta far distinguere.
Aggiunti alla Syn. Cardamine trifolia Lob. Stirp. ic. tavola
211 - fig. 2. — De Caudalle. Reg. veg. Sys. nat. vol. 2.
pag. 253. spec. 16. — Linn. Spic. plan. vol. 2. p. 313 n. 6.
et Syst. nat. vol. 3 p. 439 n. 6. — Romano. Plant. ital.
in Dismort. v. II. pag. 243 col. — Dumont. Bot. vol. 8.
pag. 176 n. 3. —

N. 3 *Chrysosplenium alternifolium* - Linnei.

- (an Ch. oppositifolium Linn. 2. ed.)
Syn. — Linneo Sys. veg. p. 528 — Vitman Sum. plan. v. 3.
p. 3 - n. 672. — Maironi: Str. reg. berg. pag. 48.
Lamark. Ill. part. 4 - tav. 374 - a - i — Guillemin. in Diz.
nat. v. 6. p. 55 — Lam. et Meib. Ist. nat. veg. vol. XIV.
p. 175.
— Saxifraga lutea Bodonei — Chab. — Stir. ic. sciz. p. 544
figura 3.
— Sedum etc. — Morisoni, Hist. oxon. v. 3. p. 12 t. 8 f. 8.
Char. species: foliis alternis, ramis corymbosis, br. dif-
f. Vit. loc. cit.
Abit. Nasce sotto le rocce umide, d'ombra, nella Padova-
na, al Castel sottoterra, nella strada nuova, ecc.
Offerta. Gli abitanti dell'Affazia. Della Lorenza l'ado-
perano come vulneraria d'apertiva (Lam. et Meib. l. c.)
Agg. alla Syn. Linn. Spic. plan. vol. 1. p. 569. n. 1. et
Syst. nat. vol. 3 p. 303 n. 1. — Romano. Plant. ital.
in Dismort. pag. 238. I. ed. — Dumont. Bot. vol. 8.
pag. 12. n. 1. —

N. 4. *Corydalis tuberosa* De Caudolle

Syn. De. Can. Flor. franc. — Richard in Sig. nat. v. 5 p. 62
 - *Corydalis bulbosa* - Porf. L. — Magrioni - Reg. nat. bergam.
 p. 58 — Sebastiani - Flor. rom. p. 232. n. 315 — Targioni-
 Tozzetti Ist. bot. v. 3 p. 61 n. 1039

- *Fumaria bulbosa* - Linn. Sys. veg. p. 502. not. 1 - Vitman - Sum-
 ma plan. v. 4 - p. 170 - n. 1016 var. b — Re. Giard. p. 151 sp. 1
 Lam. et Mirb. - Ist. nat. veg. v. XII p. 231

- *Fumaria altera* - Iconf. plant. et anim. p. 93 - fig. 2
 - Un'altra *fumaria* - Mattioli - Dicc. - p. 2. p. 1218 con fig.
 - *Fumaria bulbosa*, radice cava major et cava minor - Chabrac
 Stalp. ic. rar. p. 378 - fig. 3, 4.

Chor. speciei - Cor. caule simplici - Racemo terminali, bracteif
 oblongif, pedunculo longioribus - Folij biterminalif oblongif
 acutiusculif - Radice tuberosa, cava - Sebast. loc. cit.

Abit. Nasce lungo una siepe nella Strada degli Avogari,
 e così pare sotto le Rocce, nella Padovana, ma sempre
 in sito ombroso ed umido.

Oss. E' giunta un elegante pianticella che è, e mente, si è spar-
 coltivate nei giardini. I suoi fiori in ispiga variano

dal bianco al rosso, e fanno una buona figura.
 Questa specie è amarissima, febbrifuga, vermifuga
 ed emmenagoga (Lam. et Mirb. loc. cit.) La radice
 a guisa di quella dell'*Antilochia* si usava una
 volta d'untorela polverizzata sulle piaghe per puri-
 farle, ed impedire la carne delle ossa; ma in oggi
 è dimenticata (Targ-Tozz. loc. cit.)

Aggiunto alla Linn. - Radix cava barbarorum - Lob. Stalp. ic.
 tab. 1459 fig. 1 - De Caudolle Reg. veg. Sys. nat.
 vol. 2. p. 117. n. 8 - *Fumaria bulbosa* Linn.
 Systema natur. vol. 3 p. 469. n. 3 et. Species plan.
 vol. 2. p. 983. sp. 2 - *Corydalis bulbosa* - Romanc. in
 Guss. vol. XII p. 245. - Guss. Bot. vol. 8 pag. 144
 n. 12.

85 - *Lilium bulbiferum* - Linn

Syn. Linn. Sys. veg. p 255 - Vitman. Lum. plan. v 2. p 296
n. 495. sp. 2. - Sebastiani Flor. rom. p 124. n 401.
Re - Giard. p 207. sp. 1. - Bartolini. Naut. tien. p 54. sp. 1.
Maironi. Tre reg. berg. p 46 - Borg de J. Vini. in Dig. nat.
vol. 8. p 207 - Bell. elem. bot. p 215 - Targ. Tozz.
Zot. bot. vol 2. p 273. n 447. - Boitard. etc. - Giard.
vol 1. p 441. - *Lilium orientale* - Lob. stir. ic. tab 165. f 1?
- *Hemerocallis* - Mathioli. Dix. p 466.
- *Hemerocallis* / *Dioncidi* - Mentzel. Ind. plantarum.

Char. speciei = L. foliis sparsis: corollis campanulatis, erectis-
intus scabris - Sebastiani loc. cit.

Abit. Lo ho trovato copioso sopra la vetta della Montenera.
in luogo arido e sassoso: presso la Capra dei S. Onigo.

Oper. Coltivasi questa specie nei giardini per la bellezza dei
suoi fiori di un giallo rossastro.

I bulbi che sono portati alle ascelle delle foglie, fatti come
si si staccano, cadono a terra e mettono radici; di
venendo altramente piante,

Agg. alt. Syn. Linn. Sys. nat. vol 3 p 240 n 406 et sp. pl. v. 1. 433. n 2.
Romano. Plan. Nat. vol III p 226. Burm. Bot. vol 3^a p 193.

86. *Majanthemum bifolium* - Desf

Syn. Desf. Ann. et Mus. - Richard in Dig. nat. v 9. p 622
- *Convallaria bifolia* - Linn. Sys. veg. p 265 -
Vitman. Lum. plan. v 2. p 324. n 513. sp 11
Maironi. Tre regni della nat. in prov. berg. p 46
- *Unifolium* seu *ophrys unifolia* per Einblatt. Chabres.
Stirp. ic. suag. p 506. fig 4 ?? - Lob. ic. t 303. f. 1.
Char. speciei. M. foliis cordatis - floribus tetrandris
Vitman loc. citati.

Abit. Nasce sulla vetta dei colli d' Cornuda in. Lo lo
trovai sicuro d' esser; in luogo petroso e arido.

Oper. E' pianta aerei tenue e di poca figura.

Agg. alt. Syn. Linn. Syst. nat. vol 3. p 248. n 422.
et speciei plant. vol. 1. p 482. n 8.
Burm. Bot. vol 3^a pag 186. spec. 8. Roman.
plant. Ital. pag. 226.

N° 7 *Tofieldia alpina* - Smith

Syn. - Smith. Trans. of the Linn. v. XIV^o - Guillemin. in Diz. nat. vol. 16^o p. 303.

An *Anthericum opifragum* Linn. Sys. veg. p. 261. not 2.

Vitman Linn. plan. vol. 2. p. 315 - Re. Giardin. p.

sive *Northecium opifragum*. Person. - Targ. Tozz. Ist. bot. 2. p. 283 n. 465-??

Tofieldia palustris De Cand. Flor. franc. (fide Guillemin loc. cit.)

Maironi. - I tri veg. nat. berg. p. (Tofieldia per errore) p. 46 - Char. speciei. - Tof. foliis ensiformibus, graminif. caule parum folioso, monostachio - spica oblonga, cylindrica - Nobis.

Abit. Nei prati magri alle sommità dei colli di Cornuda ed a Corvòlo, in un poggio erboso lungo la Piana.

Offes. Serve di pascolo con tutte le altre erbe commestibili, ai buoi ai cavalli - e - Di nessun uso.

Il sinonimo di *Anthericum opifragum* da me suesporto con dubbio, e' del tutto erroneo. Si può vedere le differen.

ze in Richard (in Diz. nat. volume 1. p. 18. artic. *Stammas*)

App. alla Lin. Romano. Plant. Ital. vol. 12^o pag. 227. - Decand. Bot. vol. 3. pag. 177 (*Northecium*) n. 1.

N° 8 *Theopium linophyllum* - Linn

Syn. - Linn. Sys. veg. p. 191 not. 3 - Vitman Linn. Plan.

vol. 2^o p. 61 - n. 355 - sp. 1. - Santi. Vag. Mont. p. 58.

59 - Bartolini. Plant. scien. p. 80 - Lamark. Mus.

part. 2. - tav. 142 fig. 1 - Richard. in Diz. nat. vol. 16^o

p. 221 - Lam. et Mirb. Ist. nat. veg. v. VIII^o p. 210 -

Sebastiani. Flor. rom. p. 105 - n. 303 - Maironi. 4. tri. veg.

nat. bergum. p. 44.

Char. speciei. - Panicula foliacea - foliis linearibus.

floribus plerisque quinquefidis - Sebas. loc. cit.

Abit. Fra i cespugli degli arboscelli sulle colline in parte soleggiata.

Offes. Tutta la pianta ha un leggero odore che si assomiglia a quello dell'*Antemissa dracunculif* Linn. - Non so che abbia nessun uso.

Rad. alla Linn. Linn. Syst. nat. vol. 3^o pag. 188 n. 1. - I. Specif. plant. vol. 1. pag. 301. n. 1.

At 9. *Spiraea aruncus* - Linn.

Lyn. Linn. Lys. veget. p 377 - not. 3 - Vitman Linn. phas.
vol 3^e p 250 - n 159 - spec 13 - Re - Giard. vol 2 p 326.
specie 2 - Targ. Tozz. vol 2 p 449. num. 145 - Richard-
in Dig. nat. v. 15. p 563 - region. 5 - Maironi - G. tr.
regn. bergam. p 53 - Bostani - st. Giard. v 1 - p 650.
n 4 -

— Barba capre - Chab. - Stir. ic. et scographia -

— Barba capre - floribus oblongis - Moutet. - p 44.

Char. bot. - S. Folij supradecompositis - Floribus paniculatis,
polygamis - Person. Synops. 46.

Abit. Cresce nelle vallate umide d'opache, come alle Valle
dell'Acqua, al Castel sottoterra, nella Strada nuova, e
del Bosco, e così pure sulle Montenera a sottoterra.

Osserv. La spannochia di minuti fiori bianchi dei quali è adorna
questa pianta è sorprendente. È degna d'esser
coltivata nei giardini ombrosi (Targ-Tozz. loc. cit.) è
ancora sorprendente nell'autunno la spannochia delle
minuti capsule di un bel colore di caffè e pendente.

At 10 *Potentilla alba* - Linn.

Lyn. Linn. Lys. veget. p 382 - Vitman Linn. phas.
vol. 3^e p 268 - n 163 - spec 21 - Pokorny-
Hor. nat. plant. p. 148 - totid At 268 - Re
Giard - p 270. spec. 3 -

Chr. Pemptaphyllum album - Chab. Stir. ic. scographia
p 171 - fig. 1^a - Sed iconata; folia enim nimium serrata.

Char. speciei - Pot. Folij quinatis, apice conniventi - serratis
ciliatis, procumbentibus, filis omnibus; Recepta-
culis (plerumque) hirsutis - Vitman. loc. cit.

Abit. Sulla sommità della Montenera, nei prati magri
e a solatio.

Osserv. Ogni cinquefoglio è reputato asturgente, ed è
neroso e balsamico (Gianini. Ist. prin. ravennati,
p 237 n 134). Viene mangiato insieme alle
altre erbe dei prati, dai buoi, pecore e c.
È porta dal Re come pianta da giardino
ma è a par poco elegante.

20 N° 11. *Bidens bipinnata* Linn.

Synon. Linn. Syst. veget. p. 575 — Vitman. Summa plan.
vol. 4.^o p. 466 - n. 1112. - spec. 8 — Re. Giard. p. 50
spec. 3. —

Char. speciei. — P. foliis bipinnatis, incisjs — calycibusque
volucratjs — corollis (plerumque) radiatis — Achenijs
tetragonis quatuor-aristatis sphaerice divergentibus. — Nobis

Abit. Cresce questa pianta in vari luoghi della Provincia,
lungo la strada nuova presso Camalò, a Paderno, a Selva
lungo la schiavonessa, ecc. ecc. — Originaria questa pianta
delle Virginia, non è difficile che qui sia stata portata (e ind.
acclimatizzata) per mezzo degli acalli, ai quali fof
s'arrivano attaccati gli acheni uncinati. Per la medesi-
ma causa si avrò introdotta in Italia la *Bidens* bullata
dell'America.

Osserv. È una pianta di buona figura per la maestà con cui sta
diritta, pel suo bel fogliame e per lo stelo ed i rami di
un bel sanguigno. I fiori sono radi, e piccoli —

N° 12 *Gentiana asclepiadacea* Linn

21

Synon. Linn. - Syst. veg. p. 206 not. 3. — Vitman. Summa plant.
vol. 2. - p. 111. - n. 393. - spec. 6 — Re. Giard. p. 154. - sp. 2.
Guillemin. - in. Voy. nat. vol. 5.^o p. 409 art. *Dasistefana* —
Maison. - 1. tri. reg. nat. bot. p. 42 — Boissard etc.
Giard. - vol. 1. - p. 541. - spec. 5 — Bill. Plen. - botanici.
pag. 75. figur. 214. il fiore —

Char. speciei. G. corollis quinquefidis campanulatis op-
positis (nobis vero: corollis binis, secundis) sessilibus
foliis amplexicaulibus. — Vitman. loc. cit.

Abit. Nasce nel Montello e propriamente nella sua ultima
estrità di quarta di Piave, in luogo arido e pietro-
so.

Osservaz. È una bella *Gentiana* che si coltiva nei Giardini.
Porta lunghe spighe di fiori campaniformi di un
bel colore celeste.

N° 13. *Rhus cotinus* - Linn.

- Linn. Lys. veget. p. 229. not 1 — Vitman. Sum. plan.
 vol. 2. p. 189. n. 447. spec 26 — Mairani. 1^a Re. regni.
 nat. berg. p. 44 — Bortard. Grän. vol. 2. p. 927 —
 Bill. Elm. bot. p. 349 e figura 72 pl. 11 — Sartorelli.
 Alb. ital. p. 95 — Re. Grän. vol. 2. p. 286 sp. 6 —
 Cefati. Asp. flor. it. in Bot. & Musieu. p. 787 — Richard
 in Dig. nat. vol. 15. p. 524. Lamarck. 1^a Michel. 1^a nat.
 veget. vol. 15. p. 270. Targ. Pogg. 1^a bot. 2. p. 243. (a)
 Char. speciei: R. Folij simplicibus obovatis. Vit. loc. cit.
 - Cotino - Mattioli - Dioscor. in Dioscor. vol. 1. p. 236.
 - Somnaco scotano - Cavalieri. Ist. Archid. v. 1. p. 64
 n. 171.
 - Coccignia, *Cotinus coriaria* nonnullis dict. Arab. Staj. e. onz
 1^a Meiaz. p. 37. figura 4 —
 Abit. Cresce nel Montello di Praduffa; in situazione
 a solatio.
 Esp. Il suo legno giallo e tenero facile impiegarlo dai
 toruntori e falegnami. (Bill. loc. cit).
 La pianta intera e principalmente il legno della

N° 14 *Allium ursinum* - Linn.

- Linn. Lys. veget. p. 255 — Vitman. Sum. plan. vol. 2
 p. 293. spec 33 n. 494 — Ginanni. Pin. rar. p. 217
 n. 91. spec 1. — — —
 - Aglio orfiro - vol. 1. 590
 - *Allium ursinum trifolium*, venum sylvaticum.
 Chabrei. Stir. ic. et scab. p. 203 figura 4.
 - *Allium sylvestre latifolium*.
 Char. speciei: *Allium*. Scapo nudo, superne triquetris; fo-
 liis lanceolatis, petiolatis; umbella fastigiata. Vit.
 loc. cit.
 Ab. Nasce alla Padovana, al bivio de Gobo, nella strada
 nuova in luoghi umidi ed umidi.
 Osserv: Si dice che sia buono a cagliare il latte (Chab. loc. cit)
 Non si trova in lui quella effiacia che nel sativo trovasi;
 e si sta molto da lungi (Ginanni - loc. cit).

Pel. A 14. Allium ursinum. - Linn. vedi avanti.

cuttione parte della pianta serve per conciare le pelli di capra e di vitello e per dare vari colori gialli, verdi, e bruni alle stoffe ed ai panni (Bartorelli: loc. cit.) Il legno può servire per minutieri e per gli intarpatori - Le foglie sono un veleno potente per le pecore e fanno pregiudice volando alla salute degli altri animali che si cibano di esse - Col fare delle incisioni in primavera sulla sua cortecia cola della gomma-resina - (Bartorelli, loc. cit). Le foglie sono apai odorose ed aromatiche (Perg. - Pogg. loc. cit) e per adornare i giardini questo arboscello è pittoresco in grado estremo (Bartorelli loc. cit.).

(a) Aggiungj i sinonimi = Bartolini, Piant. sinesi.
p. 119. n. 1 - Ginanni. Pin. rasen. p. 213 n. 83

At 15. *Rhododendrum hirsutum* - Linn.

Synonymum Linn. *Sys. veget. pag. 323. not 4* — *Vitman. Lumm. plan. vol. 3. p. 52. n. 656 - spec. 4* — *Re. Giard. v. 2. p. 286 - spec. 8?* — *Sartorelli, Alb. ital. p. 151. n. 2* — *Pokorny - Is. nat. pian. p. 101. n. 188* — *Richard in Dig. nat. vol. 14. p. 482.* *Maironi. 7. tre regni. nat. berg. p. 48* — *Bastard Giard. p. 719. vol. 2. spec. 3.*

— *Nerium alpinum* aliud, *hirsutum*. *Char. Stir. c. - st. sciogr. p. 103. figura. 4* —

Char. speciei. R. Folij ciliatis nudis - Corollis infundibuli- formibus - Vitman. loc. cit.

Abit. Lo ho trovato una sola volta in fiore, lungo un poggio prossimo al Piano, in situazione petrosa. Osserva. Sulle alte giogaje in luoghi sterilissimi, è utile coltivare questa frutice per vaporare il terreno e renderlo atto alla coltivazione di altre piante ed erbe utili.

Serve sulle alpi di ottima legna - Gli alpini usano per ne servono in oltre per far letto alle bestie e mescolato collo sterco è buon concime per prati. Le foglie sono dannose agli animali. (Sartorelli, loc. cit.) (#)

At 16. *Erica multiflora* Linn.

Syn. Linn. Sys. veg. p. 294. not 6 — *Vitman. Lumm. plan. p. 413. vol. 2. n. 587. spec. 71.* *Re. Giard. p. 134. spec. 7* — *Targ. Tozz. Ist. bot. vol. 2. p. 333. n. 548* — *Sebastiani. Flor. rom. p. 140. n. 454.* *Richard in Dig. nat. vol. 15. p. 258. St. B.* — *Maironi. 7. tre reg. nat. berg. p. 47. ??*

— *Erica conf. folio multiflora. Char. Stir. c. p. 76. f. 2.?*

Char. speciei. Anthem. multifloris, exsertis - corollis campanulatis, stylo exsertis; floribus axillaribus, pedunculatis, longitudine floris; foliis quinis linearibus glabris. *Sebastiani. (loc. cit.).*

Vedi per le prerogative Targioni Tozz. loc. cit.

An. Erica mediterranea, aut. tetralix, aut forte altera?

(*) Per la vaghezza dei suoi fiori è tenuto in gran conto dagli alpini, quanto dai visitatori delle Alpi — (Pokorny - Is. nat. pian. loc. cit.)

#17. *Aconitum lycoctonum* - Linn.

Synon. Linn. Sys. veg. p. 401 - not 1 - Vitman. hum. plan. vol 3^o p. 329 n. 816 spec. 1. Re. Giard. p. 9. spec. 4. Maironi. J. tr. veg. burg. p. 53 - Bill. Elen. botanica p. 45 - fig. 118 - Boissard - vol. 1. p. 595. spec. 4 - Targ. Tozz. Is. bot. 2. p. 449 - n. 794 - Edwards. Vapasseur Nat. med. p. 279 - Lam. et Mirb. Is. veg. v. 12. p. 199 - Richard in Dig. nat. v. 1. p. 103. 82. - *Aconitum secundo* - Mattioli - p. 1142 (?) - *Aconitum lycoctonum* - Charbri. Str. ci. p. 531 fig. 1.

Char. speciei - A. Folioj palmatis, multifolij - Foliorum lobis duplicato trifolij - Riform. Synops. 83

Abit. - Raro sui colli di Cornuda e capi sul Bosco dalla parte che guarda il Piave & ai Frati.

Offic. Questo aconito contiene un succo acre e caustico. La sua radice è grossa e tuberosa; ridotta in polvere uccide i lupi. Il suo decotto fa perire i pidocchi dei bestiami, le mosche e le zanzare - le capre e qualche volta le pecore cibano questa pianta, l'altro bestiami la rifiuta (Lam. et Mirb. loc. cit.) L'ucco non fa male ai cavalli (Targ. loc. cit.) (*)

#18 *Limonium abortivum* - Swartz

Synon. Swartz. Nov. act. Hol. 6 - Sebastiani Flor. rom. p. 316 - n. 1125 - Richard in Dig. nat. v. 9 - p. 445. Re. Giard. p. 207. spec. 1.

- *Orchis abortiva* - Linn. - Sys. veg. p. 639 - not 3 - Vitman. hum. plan. v. 5^o p. 218 - n. 1197 spec. 44 - Lamark et Mirb. p. 111 - vol. 8 -

- *Orobanchè et nido avis affinis Pseudo-leimonium austriacum violaceum Lupi - Charbri. Str. ci. p. 257. fig. 6.*

Char. speciei. *Aphyllum*: scapo vaginato: petalis erectis labello ovato undulato: cornu subulato germi- nis longitudine - Sebastiani. loc. cit.

Abit. - Lo ho trovato una fol volta nel bosco, lungo la brentellon, dirimpetto all'immagine di S. sul muro che circonda il podero dei Signi.

Grollo Vapassima Bosello

Offic. È una pianta di bella figura per la grandezza e pel colore dello stelo, squame e fiori. Si usa nel violaceo osano.

(*) Sembra godere questa specie le stesse proprietà dell'*Aconitum Napellus* e lo potrebbe impiegare in caso di bisogno (Edwards e Vapasseur loc. cit.).

28 *N° 19. Asperula taurina* Linn.

Synon. - Linn. *Sys. veg.* p. 107. not. 1 - *Vitman. Lum. plan.*
vol. 1. p. 293. n. 140. spec. 3 - *Re. Giard.* vol. 2. p. 39. sp. 4
Adr. Zupia in *Dij. nat.* vol. II° p. 155 - *Sebastiani. Flor.*
Romana. p. 78. n. 192. - *Maironi* - *T. tringui. burg.*
p. 40.

- *Rubia sylvestris* *Leif.* *Montzel* - p. 266.

- *Rubia quadrifolia* *Italia* *trifolia* - *Chabrei. Flor. ii.* p. 547 n. 2.

Char. bot. speciei - *As.* foliis quaternis, ovato-lanceolatis, trinerviis; floribus polygamis fasciculatis vel verticillatis ternis; lobis - *Sebastiani. loc. cit.*

Abil. Nasa nel bosco in gran copia alla *Saddanna*, alla *Nvada nuova*, alla *Conca*, al *Castel sottoterra*, al *Bus delle Tade* ecc. in luoghi umidi;

Spec. et ragione Chabreo la chiama: Bella è questa specie di *Robbia* (loc. cit.) massimamente a vedela fiorita dove essa è copiosa e folla.

N° 20 - Digitalis ambigua Linn. an. sp. nov. 29

Syn. Linn. *Syl. veg.* p. 445 - *Vitman. Lum. plan.* v. 3°
p. 504. n. 902. sp. 5 - *Re. Giard.* p. 123. spec. n. 1
Bottard. Giard. vol. 1. p. 527. spec. 2 - *Maironi.*
Tri. veg. nat. burg. p. 55 - *Pill. Bot.* p. 43. f. 100.

Char. speciei - *Dij.* Calycis foliolis lanceolatis, corollae
galea emarginata, foliis subtus pubescentibus.
Vitman. loc. cit.

Char. speciei nostrae. Foliis lanceolatis semi-amplexi-
caulibus argute-serratis (1) Calycis laciniis lanceola-
tis - Corollis digitaliformibus, quadrilobis; lobis
tribus inferioribus acuminatis; supero rotundato
aut leviter truncato-emarginato - *Abil.*

Abil. Nel *Montello* dalla parte che guarda il *Piave* in
luogo secco e pietoso, ed a livello in un poggio.

Spec. - Cauli di un piede a due. Diritti tereti fogliosi -
Foglie quasi abbraccianti, lanceolate, seghettate
glabre - Corolle grandi di un giallo pallido,

(1) *adde*: utrinque glabris

col palato screziato di color ferrigno. — Calice pentafil-
lo, a lacinie acute. — Corolla quadrilob; bilobulari;
polisperme. — Gambetti dei fiori corti. Spiga
quasi unilaterale.

La nostra differisce dalla *Digitalis ambigua* per carat-
teri: Corolla galea emarginata — Solij subulj pubescentibj.
mentre anzi ha la calata (galea) generalmente arroton-
data o troncata, e le foglie del tutto glabre. Ed inoltre
per carattere: fiori di color giallo con macchie porporine
del Boissard (loc. cit) avendo il fiore, come si v'è, di color
giallo-pallido col palato screziato di color ferrigno.

È pianta grassiosa e da giardino. Si sfoggia le sue gran-
dissime corolle da Giugno a Settembre.



Modellia