

Florae Carrisinae rudimenta prima
 sistunt catalogum plantarum quae hactenus in provincia
 Carrisina sponte crescentes introducturunt.

(11862)

Plantae vasculares.

Class. I^o Dicotyledoneae

Subcl. I Thalameiflorae

Ordo 1 Ranunculaceae Turric.

Clematis recta Linn. In sum-
 mitibus praesertim collinis et
 montanis Croto, Falgi,
 Cornuda, Petrolta, Serria
 valle. - Maji, Jul.; peren.
 Planta aris.

Clematis Vitalba Linn. In squi-
 bus et summitibus Silva,
 Gràvara, Camalò, Cornuda,
 alibi que. - Jun., Jul. Pe-
 renn. Planta ~~cuti appl.~~ ^{corrosiva et}
~~ita corrosiva est, inter~~
 venenosa. - Vulgo: Vide
 Jon, quia, quasi vitis, san-
 dit.

- β integrata DC. Cum
 specie passim.

Clematis Vikiolla Linn. In se-
 pitibus et summitibus Megli-
 no, Moricigo, circa Tar-
 visium; - Gorgo, Silva
 na (Fracchia). Jun., Aug.

Rehmannia Perennis.

Utrageae alpina Linn. + [*Clematis alpina* Mill.]
Grappa (Parolin). Tur.
Iul. Perennis.

Thalictrum aquilegifolium Linn.
Ad fossas aquosas prop.
Terrisium. Moja, Tur.
Perenne

Thalictrum minus Linn. In
pratibus et dimetibus mon-
tibus et collinis Perrot-
ta, Terravalle. Tur.
Perenne

Thalictrum angustifolium Leg.
Ad fossas, in pratis
humidibus Selva alibi-
que. Tur., Iul. Perenne
Sequenti valde affine.

Thalictrum flavum Linn.
In glareosis, ad muros
domorum Selva alibi-
que. Tur., Iul. Perenne

Anemone Linn.

A. Pulsatilla Linn. + [*Pulsatilla vulgaris* Mill.]
In sterilibus Selva,
Carnato, Volpago; -
Crespan (Montini). Aprilis. Perennis. Herba venenata.

A. nemorosa Linn. In
sylva Montello; ad 14/1

numerosa Paderno, Pozzano; in
collibus fere omnibus. Apr.,
Maj. Perennis.

A. ranunculoides Linn. In
sylva Montello praecipue ad
locum: i' frati, raro. April. Perennis

A. trifolia Linn. In declivi-
tibus umbrosis sylvae
Montello; in sylvaticis
collibus Colfene, Suzzana, Pedersoba,
alibiq. April. Maj. Perennis.

A. alpina Linn. In M. Grop-
pa. Jun. Perennis (Stenberg)
Jun. Perennis.

A. narcissiflora Linn. In
M. Grappa (Stenberg). Maj.
Perennis

A. hortensis Linn. ^{Manitax} + [*A. stellata* Smk, DC]
sponte in Germania, Helvetia
et Italia meridionali et media
colitur in hortis ad orna-
mentum. Mart., April. Peren-
nis. Vulgo: Anemolo.

A. coronaria Linn. Manitax
in Gallia et Italia inferiori
ad in hortis ornament
gratia vulgaris pua est.
Mart., April. Perennis.
Vulgo: Anemolo.

Hepatica Will.

H. nobilis Volkam [Anemone *Hepatica* Linn.]
In sylva Montello colliumque
declivitatibus umbrosis. Mart., April.
Perennis.

Aconitum Linn.

- A. aestivale* Linn. Inter
legales Sabaudia. Maj.
Jun. Annua. Excelsitas
quoque in hortis ac
ornamentum: vulgo: Gio-
ze de sangue, quia ejus
flores, quodam modo,
sanguinis guttatur referunt.

Ranunculus Linn

- R. fuchsiana* Brot. In
fornis lute flentibus
Silva, Vuogozzi, Pavoris—
prope Carvisium (Frau-
clia). Jun., Jul. Perennis.
- R. ophioglossifolius* Vill.
[*R. fistulosus* Brigg.]
In fossis Mogliand (Major)
Jun., Jul. Annua.
- R. lingua* Linn. Pecus
fl. Site prope Quinto
(Fraulia). Jun., Aug.
Perennis.
- R. Thora* Linn. In M.
Grappa (Parolini).
Maj., Jun. Perennis.
- R. auricomus* Linn. In
umbrosis humidis
Silvae Montello. Maj.
Jun. Perennis.
- R. montanus* Linn. In
M. Grappa (Montini);

circa Valerbtäden (Graabuf).
Jun., Jul. Perennis.

R. acris Linn. In pratis
pratensium iunguis Selva
Gravera; in pratis sglus
Mortelle. Maj., Jul. Peren-
nis.

- β flore pleno. In hortis
excolitur ad ornamentum
Vulgo: Boton d'oro, et ejus flores globuliformes et aureos.

R. lanuginosus Linn. In
vallibus lapideis et
humiditibus sylvarum Mon-
telle; - in umbrasis pro-
pe M. Grappa. Maj., Jun. Perennis.

R. repens Linn. Ad fontes
aquosus, in arvis humi-
dulis Selva, Camalo, Tre-
viso alibi que. Maj., Jul. Perennis.

- β fl. pleno. In hortis
excolitur: Vulgo: Boton
d'oro, Stellte d'oro.

R. bulbosus Linn. In
pratis. pascuis, agrorum
aggribus Selva alibi que.
Majo, Jul. Perennis.

R. Phlometis Ehrh. ^(A) Cl. ~~(A): radicis fibrosa; caule basi haud~~
vivarum, fumarumque ~~tuboso; foliis ternatis cum lobo~~
aggribus Selva, Camalo, ~~medio petiolulato; floralibus ternatis~~
alibi que. Maj., Aug. Pe- ~~sensibus, lobis integris ellipticis;~~
rennis. ~~calycibus reflexis; aequalibus margini-~~
~~busissime tuberculatis, submuticis.~~

- R. sceleratus* Linn. Ad
 fassas aquosas silva,
 non frequens. Maj., Jun.
 Annuus. Ranunculorum
 omnium quies accomma.
- R. arvensis* Linn. Inter
 segetes, vulgarissimus ubi-
 que. Maj., Jul. Annuus.
 Vulgo: Erba corona, erba
 vella corona, quia ejus
 carpella aculeata velut
 in coronam disposita sunt.
 Herba venenata.
- R. parviflorus* Linn. In
 arvis silva non longe
 a sylva Montello, raro; —
 secus fassas Magliano (Maj.)
 April., Maj. Annuus.
- R. Sequieri* Willd. In M.
 Grappa (Montini). Jul.,
 Aug. Perennis.
- R. nemorosus* DC. In
 sylva Montello frequens; —
 in M. Grappa (Montini)
 Maj., Jun. Perennis.
- R. asiaticus* Linn. Ex
 oriente, nunc excolitur
 saepe in hortis ad orna-
 mentum. Maj., Jun. Perennis
 Ranuncul.

Ficaria Haller.

F. ranunculoides Moench

[*Ranunculus Ficaria* Linn]

In pratis, sepiusque humi-
dissimis Silva, breviter
alibi que.

Caltha Linn.

C. palustris Linn. In

sylva Montello ora bore-
ali locis humidissimis
de laupagnole. April, Jul.
Perennis

Helleborus Linn.

H. niger Linn. In vallibus

opacis et vis sylvae

Montello atque collium

Cornuda, Maser; - Mofe-

mo (Montini). Mart., April. Perennis.

Herba acris et venenata.

H. viridis Linn. In umbrosis

sylvae Montello ~~vulgatissimus~~ colliumque omnium vulgatissimus.

Mart., April. Perennis.

Vires praecedulis, imo acris.

Vulgs: erba regia, qua utun-
tur villici ad animalia domesti-
ca mœuenda.

Nigella Linn.

N. damascena Linn. Sponte

nasitur in Piemonte, at

seritur sepe in hortis ad

ornamentum. Jun., Jul. Annua.

Aquilegia Linn.

A. vulgaris Linn. In sylva
Montello ad Plavim loco
Dico: le campagnole; in
collibus Cornuta, Colfasco,
Corole, Piombta alibque.
Maj., Jun. Perennis.
Varietates plures excoluntur
in hortis ad ornatum.
Vulgo: Braghette da prete.

Delphinium Linn.

D. Consolida Linn. Inter
feges, in glareosis selva,
Camato alibque. Maj.,
Aug. Annuum. Vulgo
Spironelle salvareghe.

D. Ajacis Linn. Sponte nas-
tur in provincia Papiensi
et Veronensi, sed vulgo
fertur in hortis ornamenti
gratia luteisque floribus
albis, incarnatis, igneis
et ex hisce variis. + Maj., + Vulgo: Spironelle.
Jun. Annuum.

Aconitum Linn. ^{sp.}

A. Anthora Linn. In ru-
pestribus montibus Curva,
Serravalle (Faubia). Herba
et praesertim radix venenata.
Aug., Sept. Perenne.

vulgare DC
A. Napellus Linn [Napellus Dod.
Surg. p. 318, Lobel., Cluj. U. Na-
pellus plurim. auctorum] In
montanis Pedersobba, Serra-
valle. Valde venenatum, et
sepe in medicina adhibitum.
Vulgo: Napul, Leonito. Aug.
Perenne.

A. paniculatum Lamk [A.
cammarum All.] In sylva
lis collinis Cornuta, Colfosco;
interdum in sylva Montello
Sed hoc in loco raro.

Bernicum DC [A. cornutum Wolf.]

Hic illi cum spicis; - in
sepibus S. Pate (Frachina)

A. Lycopodium Linn. [A.
Thelyphorum Rich] In
sylva Montello loco dicto:
S. Pate; in dimotis collium
Cornuta, Pedersobba. Jul. Sep.
Perenne.

A. pyrenaicum Linn. In
M. Crappa (Hornberg, teste
Rich). Jul. Perenne.

A. Laca Linn.

A. spicata Linn. In
uliginosis et opacis sylvae
Montello locis dictis: For-
datis, Tavarani; in valli-
bus M. Montenuva prop-
ter Pedersobba. Paucac venenatae. Maj., Jul. Perennis.

Paeonia Linn.

P. officinalis Linn. ~~Reich~~ Reitz

[*P. kammatica* Reitz]

In montanis Piedemonte,
Serravalle; - Micene (Berenger)

Apr., Maj. Perennis.

3 fl. plene. Excolitur type
in hortis ad ornatum.

Ordo 2. Berberidaceae Ventenat.

Berberis Linn.

B. vulgaris Linn. In

sylva Montello frequentiss.

Loco dicto: le Campagnole;

in septibus Cavole, Cornicia

alibi que. Vulgo: Berberi;

Crespin, spin. calla croce e spi-

narum dispositione nuncu-

patus. Baccae acidae ad

vinum conficiendum interdum

adhibita. Maj., Jun. Frutex.

Epimedium Linn.

E. alpinum Linn. In

sylva Montello abunde;

in nemorosis collibus

et montanis frequentiss.

Hae herba villis stra-

mentum parant animalibus,

domesticis, April. Perenne.

Ordo 3 Nymphaeaceae DC.

Nymphaea Linn.

N. alba Linn. In fossis stagnantibus vel venis fluctibus in inferiori provincia frequent. Vulgo: Capelazzi. Rabin est veniens. Maj, Jun. Perennis.

~~N.~~
Nuphar Smith

N. luteum Smith [Nymphaea lutea Linn] Eisdem in locis ac praevius eodemque tempore floret. ~~R.~~ Perennis.

Ordo 4. Papaveraceae DC.

Papaver Linn

P. hybridum Linn. In arvis, etumque vernis Selva, Völ pass. alibi frequent. ^{Ab. P. raris} Papaveris *hyzema* L. vicia in hac provincia representare videtur, quia *P. hyzema* L. ^{cum} alibi vulgatissimum, nullibi hactenus invenit. Jun., Jul. Annuum.

P. Rhoeas Linn. Inter tegulae frequent. - Vulgo: Rosolinay flores enim quodam modo raris accedunt. Herba tenuella in aetariis comeditur. Maj, Jun. Annuum.

3. integrifolium Boisd.
[P. integrifolium DC.] In
arvis Moglino, ubi tamen
raro (Majus)

P. somniferum Linn. Ex Cructe.
Excolitur sepe in hortis cum
pluribus variet. Herba ma-
culata et viridis, praesertim capsulae,
e quibus opium elicitur, in
usum medicum summopere
adhibitum. Vulgo: Papavere.
Maj., Jun. Annuum

Chelidonium Linn.

C. majus Linn. In rudera-
tis antrophi totius pro-
vinciae. Vulgo: Inzenda-
ria: nomen a Chelidonio forte
corruptum, vel acres plantae
vires indicans, inzenda cum
apud Carinios idem est
de verrere. Succo ^{corrosivo,} quo scaturit
herba, utuntur nonnulli ad
verruas absumendas. April.,
Maj. et Aug. Perenne.

Ordo 5. Fumariaceae DC.

Coryialis DC.

C. cava Schweigg et Hort.

[*Fumaria bulbosa* var & Linn]

In seipibus umbratis Silva;
in vallibus udis sylvae Men-
sillo. Mart., April. Perennis.
β alba. Cum specie sed rarior.

Fumaria Linn.

F. officinalis Linn. In arvis,
hortis, utriusq. Vulgo: Fu-
maria. Mart., April., Maj.
Annua.

F. parviflora Link. In hortis
Silva, prope uento multo rarior.
April., Maj. Annua.

~~Ordo 6. Cruciferae Linn~~
~~Subordo 1. Pleurostrogae DC.~~

~~*Matthiola incana* DC.~~

~~[*Chiranthus incanus* Linn]~~

~~+ Colitur vulgo in hortis ac or-
namentum. Vulgo: Vite bian-
che e rape Doppie. Maj.
et estate. Suffrutica.~~

~~Nascitur sponte circa Germaniam et
Mosciam 204~~

~~*Chiranthus* Linn.~~

Ordo 6 Cruciferae Tushia.
Subordo 1 Fluorotriginae DC. Siliquosae
Matthiola Brown.

M. incana Brown [Cheiranthus
incanus Linn] sponte nascitur
in maritimis regionis Medi-
terraneae sed saepe excolitur
ornament gratia. Vulgo:
Viola rose e blanche. Majo, Jul.
Suffrutex.

Cheiranthus Linn

C. cheiri Linn. In muris
veteribus castri Collatto prope
Fusignano. Majo. Suffrutex.
β fl. pleno. In hortis saepe
educatur ob florem fragrantem.
Vulgo: Viola zale, Zale.

Nasturtium Brown.

N. officinale R. Brown.

[*Sisymbrium Nasturtium* L]

- α *Matthioli*: foliis rotundo-
ovalibus, impari majori. Ad
fontes aquosos silve, Valpago
altitudo.
- β *Lobelii*: foliis omnibus + [*N. majusphyllum* Boiss.!?]
oblongo-lanceolatis. In fossis
intra Tarvisium.
Vulgo: Grastun, nonnu-
quam a Crescione. In acetariis
sepe comeditur. Majo, Jun.
Brevis.

N. palustre R. Br. ⁺ Ad ripas + [*Sisymbrium terrestris* Sm.]
amniculi Merhio haud longe
ab urbe Terracalle. Aug., Sept.
Perenne.

N. sylvestre R. Br. [*Sisym. sylvestre* Linn.]
In arvis, varum aggeribus,
ubique. Maj., Aug. Perenne.

Barbarea R. Br.

B. vulgaris R. Br. [*Erysimum*
Barbarea Linn.] ⁺ iuxta fossas.
in pratis arvisque humidis
selva, Camalò, Santandrea alibique
frequens. Apr., Maj. Perennis.

Arabis Linn.

A. alpina Linn. In sylva
Causiglio frequens, ubi lucet
caule modo erecto, subsimplici,
modo diffuso et ramuloso; — in M. Grappa (Montini).
Mart., Maj. Perennis.

A. hirsuta Linn. In muris ve-
lutiq; selva; in riuiculis sylvarum
Montello loco dicto: i pratis. *A. sagittata* DC. huc reduce.
April., Maj. Perennis.

Cardamine Linn.

- C. impatiens* Linn. In umbro-
sis, humilibus sylvae Montello. - *Scirgana* (Faulst.).
Maj., Jun. Biennis.
- C. hirsuta* Linn. Ad varam
marginem, in horticis, fre-
quens; + Mart., April. Annua. + circa Selvana (Faulst.).
- C. trifolia* Linn. In petrosis
viciis sylvae Montello facile
reperitur. Apr., Jun. Perennis.

Dentaria Linn.

- D. enneaphyllos* Linn. In
aliginosis sylvae Montello, praecipue circa locum: + prati. x
+ Apr., Jun. Perennis. x Flores etiam in viciis albidis ochroleucis.
- D. pentaphyllos* Scop [*D. digi-
tata* Link] In umbrosis
humidibus sylvae Montello
signate ad speciem: Cavaram. Apr., Jun. Perennis.
- D. bulbifera* Linn [*Cardamine bulbifera* Braun]
In humidulis, opacis sylvae
Montello. Datur varietas
floribus roseis, sed raro. Apr.,
Maj. Perennis

Hesperis Linn

- H. matronalis* Linn. In horticis
ornamenti e fragrantis gratia
colitur et interdum occurrit
in hortorum vicinis. *Ulygo*: *Samberti*, sed cur nescio. Maj., Jun. Perennis
- β pusilla: caule humili, subuni-floro; pedunculis duplum calycem saepe
petalis obtusis; floribus sub-inodoriis. tantis;
(*H. inodora* Linn.?) Interdum
decerpsi in arvis Selva. forte
in horticis aufuga et, ^{Santum} toto macriori, ^{ita} evasa ~~ut decerpis~~.

Lisymbrium Linn.

S. *officinale* Scop. [*Erysimum officinale* Linn.]

In ruderalis, ad muros domo-
rum ubique. Vulgo: Barbena.
A. Majo in autumnum. Annuum.

S. *Alliaria* Scop. [*Alliaria officina-
nalis* DC] Ad sepes umbrosas
in tota provincia. Mart., Apr.
Bienni.

S. *Thalictrum* Gauc. [*Arabis Tha-
liana* Linn.] In campis et cultis
silva, levele alibiue vulgatum; - *Tarvisii* (Faubia).
Apr., Majo. Annuum.

Erysimum Linn

E. *Cheiranthus* Pers. [*Cheiranthus* *Cryptimodes* Linn?]

Brassica Linn.

In montibus
Carvisii (Faubia). Majo, Jun. Bienni.

B. *Rapa* Linn. Colitur in hortis
et arvis tenuissimè et hinc au-
paga occurrit hinc dicitur. Pa-
trina ejus ignota. Vulgo: rava.
Comeditur. Apr., Majo. Bienni.

B. *campestris* Linn. Spontanea
dicitur in Anglia, hodie. Smolan-
dia alibiue. Colitur non raro
ad oleum e seminibus eliciendum.
Vulgo: Colzät. Majo. Bienni.

B. *Napus* Linn. Inter segetes
ubique. Vulgo: ravizzen, rava
da ogio. Apr., Majo. Bienni.
β esculenta DC. Encolitur quia
radix in coquinarium usum
recipitur sub nomine: Navon.

B. orientalis Linn. [Erysimum
perfoliatum Crantz; E. orien-
tale R. Br.] In arvis eorum
que hinc inde frequens. Ma-
nem idem ac precedente, var.
sylvest. tribuit vulgus eadem
que utitur ad oleum expres-
sionem. April., Maj. et iterum
Septemb. Annua.

B. oleracea Linn. Sponte in
rupibus montibus Græciæ, Galliarum,
Angliæ, at nunc plurimum
variet ubique ^{ad oleum cultæque} educatur sub
variis nominibus vernaculis:
Vogge, Cavoli, Capuzzi, etc.
Jun. Biennis.

Sinapis Linn.

S. arvensis Linn. In arvis
Selva, non frequens. Apr.,
Maj. Annua.

Erucastrum Schimp. et Spenn.

E. obtusangulum Rehb. [Bras-
sica Erucastrum Pollini; Erysimum
Erucastrum Scop.] In siccis,
sterilibus, ad vias. Maj.,
Jun. Perenne.

Diptotaxis DC.

D. tenuifolia DC. [*Sisymbrium tenuifolium* Linn.] In glareosis, sabulosis fl. Paucis, ita et in ruderalis, ad vias Bracem, la malo, s. pale alibique. Vulgo Nucula matta. Interdum in ac-
taris comertur, uti vid. apud vicum: Lovolo. Jun. - autumn. Perennis

D. muralis DC. [*Sisymb. muralis* Linn.] In muris, ruderalis, ad vias cum prope cute, cui valde affinis. Maj., Sept. Annua.

Cruca DC.

C. fativa Link [*Brassica Cruca* Linn] In arborum limitibus Silva; in hortis saepe culta ad usum culinarem. Maj., Jul. Annua

Subord 2. *Latisepalae*

Alyssum Linn.

A. calycinum Linn [*Alysson calycinum* Scop.] In campis siccis, arenosis Silva; in mol-
vibus Cavertinis. April, Maj. Annuum

Lunaria Linn

L. biennis Millerb [*L. annua* Linn] Smk., non Linn

Excolitur ad ornatum et
exit hic illic in hortorum
vicinis, excolitur sponte
nasatur in Sussia, Germania et
Gallia meridionali. April., Maj.
Perennis.

Draba Linn.

D. verna Linn. [*Erophila vulgaris* DC.]

In arvis, ad vias ubique.

Mar., April. Annua

-β praecox Sibb [*Erophila praecox* DC] In montibus Carviti (Paulin)

Cochlearia Linn

C. armoracia Linn [*A. rustica*

na Baumg] Ad fossarum

margines interdum occurrat

v.g. circa Bratone, Caonada.

Colitur etiam ad usum eco-

nomicum. + Hun., Tul. Perennis. + sub nomine: Gren.

D. aizoides Linn. In Monte

Grappe (Martini) Hun., Tul.

Perennis

Camelina Crantz.

C. sativa Crantz [*Myagrum sativum* Linn; *Alystum sativum* Mill.]

Interdum excolitur in arvis

Harvesta, ad oleum eliciendum. Apr., Maj. Perennis.

Subordo 3. Ungustiseptae

Thlaspi Linn.

T. alpinum Fag [*T. montanum* var γ DC]

In montanis Crespan (Martini)

April., Maj., Jun. Perenne

Theris Linn.

Th. *imperforata* Linn. Veramulij;
her ex Persia orta, nunc colitur
in hortis ad ornamentum ibi
floret per totum annum. Vulgo:
Viole della Madonna, de Maria.

Perennis

Th. *umbellata* Linn. In hortis colitur
ornamento gratia, sed non raro hinc
aufuge possim reperitur. Linn. Annua.

Th. *amara* Linn. In tegulae prope
Mogliano (Majer); in hortis
type culta. Linn., Tul. Annua

Biscutella Linn.

B. *laevigata* Linn. In pratib
apertis collium et planitie.
Tul., Aug. Perennis.

B. *integerrima*: foliis radicalib
cuneato-rotundatis. caulinisque
integerrimis. In pratib silva,
Camalò.

B. *lucida* (B. *lucida* D.C.)
In M. Grappa (Montini).

Lepidium Linn.

L. *paupertue* R. Br. [Thlaspi
paupertue Linn] In arvis silva
frequens. Linn., Tul. Bienn.

L. graminifolium Linn. [*L.*
Heris plur. auctor.] Ad
montes Donorum, in rade-
ralis silva et ubique.
Jun., Aug. Brene.

Hutchinsia A. Br.

H. procumbens Desv. y *integrifolia* DC. [*Mouza Carvina*
Beranger; *H. Berangeriana*
Vil.] In montibus Carvini-
tis et in viarum aggeribus
herbida circa urbem, ubi et
leguntur. Ch. Beranger, Franck,
Baecht, Montini. Sub
fine Febr. et Mart. Annua.

Caprella DC.

C. Bursa-pastoris Vent.
[*Thlaspi Bursa-pastoris* Linn.]
- α . *integrifolia*. In cultis
pinguibus.
- β . *sinuata*. In arvis steri-
libus.
- γ . *coronopifolia*. In sanofis
humidibus. Hujus varietatis
specimen foliis radii longi-
tudine dodrantali lapi circa
Covolo. — April. Sept. Annua.

Aethionema R. Brown.

A. sativum R. Br. [*Thlaspi*
sativum Linn.] In tabularis
annuali Meschio prope Siro,
vallis; in glaciis Slavici Navesa,
Falje. Maj., Jun. Biennale.

Senecioia Poir.

S. coronopus Poir. [*Lactaria*
coronopus Linn; *Coronopus* *stellis* Gärt.]
In cultis humidis Silva.
Jun., Jul. Annua.

Subordo 4. Nucamentaceae.

Calepina Desvoux

C. lovini Desv. [*Crambe* *lovini*
in All.] Circa Mogliano
(Majir). Maj., Jun. Annua.

Bunias Linn

B. Erucago Linn. In arvis
atque ruderalis Silva. Jun.,
Jul. Biennis.

Subordo 5. Lomentaceae

Rapistrum DC.

R. rugosum All. [*Myagrum*
rugosum Linn.] In agris,
ruderalis Silva atque.

- β hispidum. Cum specie pastin.

Raphanus Linn

R. sativus Linn. Sponte nascitur
in China et Japone, Colitur
ad usum coquinarium. Vulgo:
Ravanel, ravani. Maj', Jun.
Biennis

R. Raphanistrum Linn [Raphanistrum legitur Bauhin]
In agrorum pinguium
limitibus silva. Maj', Aug.
Annuus.

Ordo 7 Capparidæ Tussien.

Capparis Linn

C. rupestris Sibth. [C. spinosa, var. Plum^{non}.]

Ad muros vetustas castri.

S. Salvatoris Conitum Cottati.

Maj', Jun. Perennis.

Ordo 8 Cistineæ DC.

Helianthemum Tournefort.

H. Fumana Mill. [Cistus
Fumana Linn.] In collibus
apertis, in sabulosis fl.
Placid. Jun., Jul. Perenne.

H. vulgare Gert. [Cistus Helianthe-
mum Linn.] Jun., Sept. Perenne

- α hirsutum. In glareosis, sicis

Silva alibique.

- β glabrum. Ad fossas, in humi-
dulis passim.
- γ grandiflorum [Hb. grandiflo-
rum DC.] In pratis collinis
et montanis Pedrabba, Senacelle
alibique.

Ordo γ Violariaceae DC.

Viola Linn.

- V. hirta* Linn. In sylvaticis
M. Mompura. April. Perennis
- V. odorata* Linn. Ad sepes umbro-
sas, muros, frequens. Mart.,
April. Perennis. Vulgo: Viola.
- β alta. Cum specie passim
- V. canina* Linn. Ad sepes, in
umbratis sylvae Montello, Silva
Gravara. Maj. Perennis.
- β Ruppia & frequens in s. Mont.
ello. [*V. Ruppia* All.]
- V. montana* Linn. In sylvaticis
collinis cornuta alibique. Maj.
Perennis.
- V. tricolor* Linn. In arvis collinis
frequens: in hortis excolitur, unde
austrata hinc inde occurrit etiam
in plantis. Vulgo: Frattini.
Varietas speciosa, ^{floribus} calycibus multo
majoribus sepe educatur, vulgo:
Pauze, ~~compau~~ e gallico: ~~pusce~~ ~~pusci~~
Maj. Aug. & Perennis.

- β arvensis DC [Vila arvensis, Muss]
In arvis et arenosis frequentis
ubique.

Ordo 10 Ruscaceae DC.

Ruscus Linn

R. lactea Linn. In arvis arenosis
et viciis marginibus Cambrico,
Belveder, Ponzano. Maj., Aug. Perennis

- β crispus. Hinc inde cum specie

R. odorata Linn. Ex Egypto. Specimen ob fragrantiam
in hortis culta ~~et in~~ ~~hortis~~. Jun., Aug.

Aperit nos annua. Vulgo: Amorini.

Ordo 11 Proteraceae DC.

Parnassia

P. palustris Linn. In paludibus
et ad Plavim Corvato, palus;
in humectibus collibus Carmada,
Pederabba; in Turfanis Quinto,
Carbonera (fractis) Jun., Aug.
Perennis.

Ordo 12 Polygalaceae Tussieu.

Polygala

P. vulgaris Linn. In pratis et in Montella
frequens. Majus-Aug. Perennis.

Ludit: floriculus cyaneis, roseis,
albis; sepalis lateralibus plus
minus ovatis, acutis, obtusisve.

foliis cuneatis magis minusque
catis. Quibus lusibus plures

species alii conficiunt. [P. septem Rubb, P. canosa Lkh etc]

P. amara Linn. ? In sabulosis [Polyp. uliginosa Rich.]
humidis fl. hinc circa Mar-
vesa, Julij; - in pratis uligin-
osis circa Carvithum, raro (Frankie)
Majo. - Sept. Perennis.

P. Chamæbuxus Linn. In M.
Montenera circa Pedorotta, in
sylva Cavallia. April., Jun.
Perennis

Ordo 13 Sileneae DC.

Gypsophila Linn.

G. repens Linn. Suis flavim facile
obvia. Maj., Aug.

G. muralis Linn. In uliginosis
Herb. idis sylva Montello, ad fossa-
ram aggeris umbrosos Silva; raro.
Jul., Aug. Annua.


Obs. Melius "uliginosa" danda, quia semper apud nos in hunc
~~nullibi in muris aridius reperta dis reperitur nunquam vero in~~
~~est.~~ muris reperitur.

G. unica Scopoli.

G. saxifraga Scopoli [Gypsophila
rigida Linn. monach. Rich.]
In petrosis, macris aggerum
aggeribus, muris robustis longe
vulgatissima. Maj., Aug. Perennis.

Saponaria Linn.

Sap. Saponaria Vaccaria Linn [Vaccaria
pyramidalis Medik.] Inter
segetes silva, non frequens.
Maj., Jun. Annua.



- β arvensis DC [Vicia arvensis Mill.]
In arvis et arenosis frequens
ubique.

Ordo 10 Resedaceae DC.

Reseda Linn

R. lutea Linn. In arvis arenosis
et vasis marginibus Cambr.
Cé, Belveder, Ponzand. Maji, Aug. Perennis

- β crispa. Hinc inde cum specie

R. odorata Linn. Ex Egyptae, spissimè ob fragrantiam
in hortis culta ~~in~~ ⁱⁿ Jun., Aug.

Aped nos annua. Vulgo: Amoreni.

Ordo 11 Droseraceae DC.

Parnassia

P. palustris Linn. In paludibus
fisque ad Plavim Cordo, falze;
in humicibus callinis Carmida,
Pedorabba; - in superficies Quinto,
Carborera (Faubis). Jun., Aug.
Perennis.

Ordo 12 Polygalaceae Tussess.

Polygala

P. vulgaris Linn. In pratis et a Montello
frequens. Maji-Aug. Perennis.

Ludit: florus cyaneis, roseis,
albis; sepalis lateralibus plus
minus ovalis, acatis, obtusive;

foliis caulibus magis minusque
calis. Quibus lusibus plures

species alii capiunt. [P. oxyptera Rabb., P. comosa Lchb etc]



- P. amara Linn? In sabulosis [Polgg. uliginosa Rehb]
 humidis fl. Nave circa Mar-
 ves, folje; - in pratis uligin-
 osis circa Carostium, raro (fructus)
 Majo. - Sept. Perennis.
- P. Chamæbuxus Linn. In M.
 Nonferera circa Pedrorotta, in
 sylva Laurentia. April., Jun.
 Perennis

Ordo 13 Sileneae DC.

Gypsophila Linn.

G. repens Linn. Sem. flavim facile
 obvia. Maj., Aug.

G. muralis Linn. In uliginosis
 herbidis sylvæ Montello, ad fossa-
 ram aggeris umbrosos Selva; raro.
 Jul., Aug. Annua.

Obs. Melius "uliginosa" Menda, quia semper apud nos in humis,
~~nullibi in muris erigenda reperta~~ his reperitur nunquam vero in
 ut. muris reperitur.

Tunica Scopoli.

T. saxifraga Scopoli [Gypsophila
 rigida Linn. monach. Rehb]
 In petrosis, macris aggerum
 aggeribus, muris ochetis longe
 vulgarissima. i. Maj., Aug. Perennis.

Saponaria Linn.

Sap. Soria Vaccaria Linn [Vaccaria
 pyramidata Meibk.] In ter-
 restribus selva, non frequens.
 Maj., Jun. Annua.

D. officinalis Linn. *Re. types,*
rioulos Silva, Volpago ali,
lique vulgata. Jun., Aug.
Perennis.

Dianthus Linn.

D. prolifer Linn. [*Tunica pro-*
lifera nap.] *In arcuatis*
apertis Silva, lamato ali,
lique frequens. Jul., Aug.
Annuus

D. barbatus Linn. *In sylva Mo-*
sello, frequens. Vulgo: garofol. v. montagne. Jun., Aug. Perennis.
- β *angustifolius. Lam specio-*
patum.

D. atrorubens Mill. *In collibus*
montibusque fere omnibus,
nec vixit in glareosis placi-
tis Silva, Paderno Maj, Jul.
Perennis.

- β *Carthusianorum. [D. Carthusianorum Linn.]*
In collibus Colpase, Lovelo.

D. sylvestris Wulf. *In muris*
vestustis castri Conchiani, Cene, v.
Serravallis; - circa Nivae (Fraculia). Jun., Jul. Perennis

- β *virginicus. [D. virginicus L.]*
In sabulosis fl. Nivae prope
Narvesa, Julge.

D. Caryophyllus Linn. *Colitur*
eximie in hortis, et exit
interdum in murorum fessuris.

Vulgo: Garofol. Tota estate. Perennis.

D. plumarius L. *Colitur*
frequens in hortis at ornan-

das areolarum margines. Vulgo:
Garofolati rampuzhini. Maj. Perennis.

D. Superbus Linn. In sylva
Montello collibusque fere omni-
bus frequens. Vulgo: Garofolati
de bosch. Jul., Aug. Perennis.
Pbt. Dubius herc. num D.
mousseliacus Linn. plurimum ital.
auctorum, ad hanc stirpem
referendus sit.

D. chinensis Linn. nascitur sponte
in China, at excolitur vulgo
in hortis sub nomine: Garofolati
della China. Aestate. Annuus.

D. mousseliacus Linn. (apud quosdam:
moussellanus) in M. grappa
(Montini). Jun., Aug. Perennis.

D. Armeria Linn. In apricis
hortis Sylvae Montello; in
pratib. arborumque versuris
Selva, Camalò alibique. Jun., Jul.
Annuus.

Cucubalus Linn.

C. bacciferus Linn. In sylvib.,
dumetis Selva, Volpago alibique
frequens. Jun., Aug. Perennis.

Silene Linn.

S. Armeria Linn. [Cucubalus fasciculatus Link]
Colitur in hortis ad ornatum
sub nomine: Bechetti & celega; sic
occurrit interdum in hortorum vicinis. Maj., Aug. Annua.

- S. inflata* ~~Linnaeus~~ [Cucubalus Boheu Linn.]
 No vras campestris, muros
 frequens. ~~Major~~ ~~Minor~~ Vulgo:
 Carletti, carline. In aetariis frequenter a villis
 comedtar. Maj., Jun. Perennis.
 - β angustifolia [S. angustifolia Guss]
 Cum spuri, in macrioribus.
S. saxifraga Linn. In rupibus
 M. Grappa (Montini) Maj., Jul.
 Perennis.
S. limicola Gmel. In arvis Tarvisinis
 inter limum. (Major) Maj., Jun.
 Annua.
S. obtusa Linn. In M. S. Augustae
 Serravallis, - Comblanis, ~~Tarvisii~~ (De Bracht)
 Jun., Jul. Annua.
S. gallica Linn. In hortis Tarvisii
 sponte. (Paulus); - in collibus arcuosis
 Caerano. Jun., Jul. Annua.
S. nutans Linn. In pratis
 feracioribus Selva; in sylva
 Montello; - Tarvisii, Comblanis
 (De Bracht). Jun., Jul. Perennis.
S. quadrifida Linn. + In M. + [Lychnis quadridentata L. 1795]
 Grappa (Montini). Jun., Aug.
 Perennis.

Lychnis

- Lychnis flos cuculi* Linn. In
 pratis, locis herbosis praevalent
 humidatis Selva, Montello.
 Maj. Jun. Perennis.
 - β plena. Cum specii papilion.

L. Coronaria Link [*Agrostemma*
coronaria Linn] Sponte in Alpi-
bus et Tauria; sed frequenter ad
ornamentum in hortis excolitur
unde profuga quandoque reperitur
in agrorum argeribus, hortorumque
replantamentis. ^{var} β Maj., Jul. Annuæ. + Vulgo: Veludini ob foliorum,
tomentum.

L. vespertina Sibth [*L. dioica*, ^{var} β Linn., ~~var~~ β .]

In alta sipes, passas Silva, Val
pago et ubique. Vulgo: Pichie
de lievaro, ob foliorum formam.

Edulis in acetariis. Maj., Aug.

Perennis.

L. diurna Sibth [*L. dioica*, var α Linn; *L. sylvestris* Hopp.]

In rupibus circa Terravalle et
in M. Endimion. Jul.; Aug. Perennis

- β plena. In hortis sepe numero
educatur ad ornamentum. Vulgo:

Nome.

L. Chalcidonica Linn. Sponte

circa Barnaoul et in Japonia.

Vulgo culta in hortis sub no-
mine: Scarlattea, ob florum colorem.

Da

Agrostemma Linn

A. Githago Linn. [*Lychnis Githago* Link.; *Githago segetum* Desf]

Inter segetes ubique. Vulgo:

Giotton, nomen forsasse corruptum
a latino: Githago. Jun

Annuum.

var α in pingu-
follis form

[Faint, illegible handwriting on lined paper, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mirrored across the page.]