

Catalogo dei Rettili della prov. di Treviso

accompagnato dalla nomenclatura vernacola frivegiana e da qualche ^{osservazione} ~~Cheloni~~.

1. *Testudo graeca* Linn. Syst. nat. 1043, n. 10. *Bissa scutellera* (Gajandra presso i veneziani). Si tiene in qualche giardino e nelle cucine per distruggere i vermi e le blatte: però non molto spesso. L'*Emys* europea è ancor meno frequente presso di noi.
- Saurii*
2. *Anguis fragilis* Linn. Syst. nat. 1122. *Biscorbola* de Busch o *Colaba* Madonna. È frequente nelle siepi umide e ombrose e frequente spino nel Mondello. È affatto innocuo e i boccafusi erroneamente lo giudicano privo d'occhi, stante la loro piccolezza. Sallustiani fino faceva parte degli *Aspidi*.
3. *Lacerta viridis* Linn. *Libert*. È molto frequente. *Notans*. *Languro*. *Boracolon* boccafusi. D' vederlo spino in auarite latte colla vipera. È provveduto d'insulte e denti robustissimi.
4. *Lacerta muralis* Mer. È comune nei siti soleggiati e caldi. Questa *Potamif muralis* Wagf. specie era tenuta un tempo per la *Lacerta fragilis* di Linn., ma si è verificato che questa ultima non solamente nell'Europa boreale. La varietà *p. campestris* è verdastro sanguigna e si ritrova spino nei campi e nei prati.
5. *Lacerta bilineata* Daud. Si ritrova insieme alle precedenti in 4. Non diversifica da queste che per colore; tanti parecchi autori la hanno come semplice varietà.
- Ophidii*
6. *Coluber viridiflavus* Lacép. Encycl. Oph. tab 38. fig 3. — *Coluber atrovirens* Schaw., nomi qui come viene ai nostri individui coloriti, ma sempre in verde nerastro. — Volg. *Seagion*, a cagione delle eguaglie grosse e brillanti. H. Ch. Catullo (Glogn. p. 172)

attribuendo a questa specie il nome ver-
nacolo di Aliga sembra confonderla
col Coluber flavescens Gm. Da esso
Castello non ricordato. — Il Coluber
viridis flavus Lasp. è molto abbondante
nel Montello e spande ovunque vaba-
un odore d' muschio fortissimo.

- 7 Coluber flavescens
syn. Collopettius flavescens
Bonap. - Nardo prospecti
aurin. vent. 1860. p 56

Lasp. Gmbl. in Linn Syst. nat. 1115 -
Coluber Esculapii Shaw. Bory in Diz.
clap. stor. nat. vol 4 p 533 - Aliga
di' boscapiali. - Il suo colore è d'un
gigio terreo, con una banda longitudinale
più oscura a ciascun lato del corpo;
le squamme visive alle piante dell' addome
sono bianche, al dritto bordate di nero;
il ventre è quasi bianco; le squame dor-
si sono lisce. - Vive nel Montello e
nei luoghi cospugliosi.

- 8 Coluber carbonarius Schreb. - Da alcuni avuto per variet-
del precedente ^{n. 6}, però è sufficientemente
distinto. - Carbonaz o Garbonaz - Com-
un nel Montello e fa le sue ombre

- 9 Tropidonotus Natrix Wagl. - Coluber Natrix Linn Syst. nat.
syn Natrix torquata Mer. p. 1100 - Bis rarer

- 10 Vipera Aspis Mer. - Syst. nat. p 1093 - Vipera, Lipara,
e i giovani indivisi: Liparott

- 11 Vipera Berus (Linn) Daud. = Pelias Berus Reankir. -
Serp. - Nel Montello, ma più rara della
precedente n. 10.

Batrachii

- 12 Bombinator igneus Mer. - Bufo Bombina Laurent.
Mudal, plur. Mudui - Vive in
tutti i fossati.

- 13 Rana exultans Linn. p. 1053 - Rana

- 14 Rana temporaria Linn. p 1053 n 14 - Rana temporaria

- 15 Hyla aridis Lasp. - Rana del Siquor, Racola

- 16 Bufo vulgaris Lasp. - Rosp., rospazz.

Rettili frevigiani, ed osservazioni relative.

Ord. Chelonii.

Testudo graeca L. Non è indigena, ma in si è naturalizzata. Si tiene frequentemente nelle cucine perchè distrugge le blatte. Vulgo: Tastaruga.
Emys lutaria Merr. Lungo qualche fossato ombroso a Selva e così nel B. Montello, non è frequente. V. Bissa scudeleræ.

Ord. Saurii.

Lacerta viridis Daud. Vulg. Lusert, Verdaz. Hanno due più varietà.

Zootoca vivipara Wagl. Non è rara nell'alveo della Piave.

Podarcis muralis Wagl. Vulgo: Bissorbola, Boribola, Lusertola.

- *P. campestris*. È comune nelle massiere de' sassi a Selva.

- *P. flaviventris*. Nel B. Montello, piuttosto rara.

Anguis fragilis L. Vulgo: Bissorbola de la Madonna, Bissorbola de bonh.

Ord. Ophidi.

Coronella Riccioli Laur Bp? Nei luoghi asprugliati del letto della Piave anzi vicino al B. Montello. La ho veduta sommergersi nell'acqua e nuotare. Non sembra molto rara.

Coronella austriaca Laur. Frequente nel B. Montello e in tutte le colline; più rara nella pianura. Vulgo: Serp. È cosa singolare ~~che talora~~ che le gente del nostro contado persevera a creder velenato questo innocente serpentello: e ciò è poi anche deplorabile in quanto che questa fallace credenza produce timori e spauriti gravissimi a volte senza il minimo principio di ragione. Ma che non di rado ne rimane morsicato.

Coluber flavescens Gm. Vulgo: Muta.

„ *viridiflavus* Lac. var. *carbonarius*. Vulgo: Garbonaz.

Tropidonotus Natrix Wagl. Vulgo: Bis raner.

„ *tessellatus* De Filip. Vulgo: Stagion.

Vipera Aspis Merr. V. *Vipera*, *lipara*, *liparot* (il giovane). È frequente nel B. Montello, non però in tanta copia, qual viene indicata dal ch. De Betta.

? *Vipera ammodytes* L. Ricordo questa specie, perchè per l'osservazione di alcuni bonapuoti, che mi dissero aver veduta nel Montello vipere con due cornetti alla fronte: quali non potrebbero inferiori che alla *Vipera ammodytes*.

Ord. Batrachii

- Hyla viridis* Laur. Vulgo: Racola, maiola del Lago.
Rana esculenta L. V. Rana.
" *temporaria* L. V. Rana rompicέρα.
Bombinator igneus Merr. V. stinal, midoi.
Bufo vulgaris Laur. } Rosp.
" *viridis* Laur. }
Salamandra maculosa Laur. E' frequente nelle vallate
ombre e umide del R. Montello. Vulgo:
Marsingola lora (coll'o larga, che significa
variopinto)
Triton cristatus Laur. }
" *punctatus* Latr. } Vulgo: Marsingola de acqua
" *alpestris* Seur. } o de fossal

- 17 *Bufo viridis* Laur. — *Rana* *Bufo* var *p.* *Gm.* *yst. nat.*
p. 1047 — *Rosp. respazz.*
- 18 *Salamandra maculosa* Laur. — *Sauro* *salamandra* *Linn.*
yst. nat. *p.* 1056 n 47. — *Marfango*
la lora (*lòr, lora d'aggettiva* *De bosca*
justi the vale: variegato, varieginto)
- 19 *Triton cristatus* Laurent. — *Marfangelà* *de fanal*
- 20 *Triton junceus* Latr. " " — *Pis. mara*
vella *preudente n. 19.*

Enumeratio reptilium et amphibiorum in Favissina provincia
hucusque observatorum.
juxta systema Cl. P. C. L. Bonaparte.

Classis III^a Reptilia

Sectio II^a Testudinata

Ordo II^{us} Chelonii

Fam. Chelonidae.

1 *Emis lutaria* Meri ex Plin.

2 *Testudo graeca* Linn.

Sectio II^a Squamata

Ordo III^{us} Lacertii

Fam. Lacertidae.

3 *Lacerta viridis* Linn. ex Plin.

4 *Lacerta muralis* Wagl. ex Linn.

" " var *bilineata*

" " var *campetris* Ch.

Fam. Anguillidae.

5 *Anguilla fragilis* Linn.

Ordo IV^{us} Ophidii

Trib. I^a Innocei

Fam. Colubridae.

6 *Collopetis flavescens* Asp. ex Sup.

7 *Coluber viridiflavus* Lacép.

" " var *carbonarius*

Fam. Natricidae

8 *Natrix torquata* Meri. ex Lacép.

9 " *terrestris* Meri. ex Gm.

Trib. II^a Venerati

Fam. Viperidae.

10 *Vipera Berus* Daud. ex Linn.

11 " *Aspis* Meri. ex Linn.

12 " *Ammodontes* Latr. ex L. (?)

Classis IV^a Amphibia

Subcl. I^a Batrachia

Ordo I^{us} Ranae

Fam. Bombinatoridae.

13 *Bombinator igneus* Meri. ex Linn.

Fam. Ranidae

14 *Rana exulenta* Linn.

15 *Rana temporaria* Linn.

Fam. Hylidae

16 *Hyla viridis* Linn. ex Linn.

Fam. Bufonidae

17 *Bufo vulgaris* Linn.

18 *Bufo viridis* Laurent.

Ordo II^{us} Salamandrac

Fam. Salamandridae

19 *Salamandra maculosa* Linn.

20 *Triton cristatus* Linn.

" *punctatus* Latr.