

Materiali
per Progetto della Fiera Triennale

Avena pubescens L. nel M. Grappe (DO)

Poa trivialis L. - β *supina* nel M. Grappe (Stey-
berg)

Amorpha fruticosa Linn. ~~Linn.~~ -

Della Carolina. Lo trovo ^{in natura} in natura
in selva di alto nelle Siep. presso
la fam. Gola e Selva: 18 maggio 1865.
Carduus nutans L. - var. *albiflorus*
A. Ciano.

Mithago sativa L. var. *versicolor*. A
Paderna.

Robinia hispida L. Da Virginia
(*R. rosea* Dub.)

Lobularia maritima Desv. [*Clypeola maris-
tima* L.] È comune negli orti ^{ove si pro-}
paga ^{spontaneamente}, ma abita propriamente
nei lidi dell'adriatico.

Persea japonica DC. [*Persea japonica* L.]
Del Giappone. Coltivata negli orti e per le
siepi e si propaga spontaneamente.
Vulgo: Rosetta del Giappone.

Pyrethrum Parthenium Smith [*Matricaria Parth.* L.]
Comune negli orti e fra i calcinacci.

Pyr. indicum Cass. [*Chrys. indicum* L.] Della China.
Si coltiva negli orti frequentemente per abbellimento
e i suoi fiori spontanei. Vulgo: Antoni dal
per piccolo.

~~*Strom. maculatum* L. (Rehb. Ita. 7. VIII) &
Strom. dal'cum Mill. (Rehb. Ita. 7. XI)
in cacumine montis S. Laurentii prope
Cueslam.~~

~~*Geranium molle* L. - var. β *grandiflorum*
de Vis. (Daln. III. 212; *G. villosum* Rehb.
non Tenor. - Germ. bot. N. f. 4860).~~

~~Planta hirsuta-glandulosa, et *G. pyrenaicum*,
sepala mucronato-glandulosa, petala
calyce saepe duplo longiora, capsellae
rugosae, glabrae & radice etiam perennis
mihi videtur. Si *G. Pertolmii* S.
pyrenaico tribuit capsellas quaedam
rugosas, quoniam utrumque hae varietates
multis recedit a pyridate *pyrenaico*?
an varietates unius speciei?~~

~~*Soria hispida* Michx. (Golichof *Soria* L.) Del
Jaappre. Si colitur in campo de Salmo
a Tederobba, Salmo, prohi dai fover.
Si colitur in sufficiente coffe.
Phlox Toxicodendron L. Del Canada.
Impatiens will. rep. a M. Bellum.~~

Lycopodium exaltatum Linn. - In adis Cuetan-
tis - Insuendum nam planta maerit
Lycop. europaei folia primat p. d. f.
et praestum ima lineali-pinnatifida
habeat. Determino in iuxta. specim.

Hieracium australe R. S. (Hieracium
Gmel. senes) - In pratis montanis
circa Cuetan.

Carex humilis Leyss. In montanis
Cuetanibus et terravallibus - Nescio
quid sit iste Leyss. - Cur non
admitta vetera adpellatis C. laudstonei
Good vel C. prostrata All.

Singicula alpina L. - ^{Leysser in p. fl. pal. 1761 p.} frequens
in montibus Cuetae et terravallis -
Calcar cauro, humore, glab. h. capi-
calyptus, florumque colore differt
a vulgar.

Scorzonera ^{australe Willd. (S. humilis Leg.)}
humilis L. - Flor. dec. 83 -
In montibus Cuetae frequentissima -
Species interata valde quoad folia poly-
morphe. Varietas mea est angustissima
et bene respondet Scor. australe Lag.
Bened. declaratur ab illust. Rostko.

~~X *Anthriscus sylvestris* Hoffm. Prostr. Ca-~~
~~cartium del Lf. Mori a Ceneda.~~
~~in laquis umbrosa umidit. (Char-~~
~~ophyllum sylvestre L et Pohl)~~

~~X *Sinapis arvensis* L In cultis a Costa.~~

~~X *Diuga reptans* L. - β alba - a Costa.~~

~~X *Anemone pratensis* L In pratis~~
~~et multis rebus a Ceneda, Ceravalle.~~

~~X *Linaria vulgaris* - DC. var. α Henningii.~~

~~In pratis montanis a Ceravalle.~~


~~X *Mazus ^{procon} montanum* Lf. In montibus~~
~~in multis pratis Ceravalle;~~
~~copiosius praeo C. argent. del~~
~~Meno. (off. procon Lf.)~~

~~X *Lactuca perennis* L. a Meno~~

~~X *Cineraria spatulifolia* Gmel (Senecio~~
~~*spatulifolius* DC (odr. VI. 362). Obscr.~~
~~vandum si cl. Bertolonius hanc coniungit~~
~~cum C. longifolia Lf. En m. Cineraria~~
~~Bertolonius accepit suam longifolia.~~
~~An eadem ego cum spatulifolia mea?~~
~~In DC. et Pohl - nec ulla spatulifolia~~
~~longifolia. Coniungit~~

~~X *Citran. Epithales* Lf. In montibus Ceravalle.~~

fructu perfecte
 hili culae, rotundatae, margine tenuifloro
 pellucida circumdatae crassiuscula cum
 planata, vix apice emarginatae, stylis
^{longioribus} ~~longioribus~~ interiectis. Semina 4 in quaque
 loculo, funiculis paulo longiora, ellipsoidea,
 exequiis verrucis granulosa.



Hutchinsia ~~*Elaeagnus*~~ ^{niki.}

Sect. I (b) *Pseudodrava*

Scapi ^{monanthi} ~~aphylli~~; ~~flores solitarii~~; ^{omnia} ~~folia radicalia~~,

^{omnibus radicalibus,}
Glabra; *scapis* nudis unifloris; *foliis* longe petiolatis hastato-rotundatis, integris; *petalis* calyce ~~seculo~~ duplo longioribus; *siliculis* rotundatis, *style* longiusculo apiculatis.

An *Draba pumilio* Brown in DC. Syst. nat. veg. 2. p. 353?

Hab. Legi in horto clau. Dom. Angeli-
fracomelli Tarvisii, ad parietes externas
calidarii, solo fertili, expositione ad me-
ridiem.

Planta parvula, tenera, annua, glabra,
vin 3 cent. superans. — Radix perpendicu-
laris, alba, fibris capillaribus parce obita,
3 cent. longa — Folia omnia radicalia,
potius pauciora, in petiolo pro laminae magni-
tudine ^{valde} longo (cent. metiente) utidentia,
pupilla, hastato rotundata, basi vix hastata,
prope 3 mill. longa et paulo lata —

Leaf ^{plurimum} ~~aphylli~~; simpliciflori, 2-3 cent. longi;
monanthi. — Calycis sepala elliptico-
acuta, concava, viridia, margine nonnihil
achlorophylla, ideo ^{albo} pellucida, petalis
dimidio breviora, erecto-patula, ^{post petala decidua} in capsu-
lis flavescentia, patula, ~~decidua~~ —
Petala ^{grana} angustis anguste cuneatis $1\frac{1}{2}$ longis
viridi, limbo ovato, $2\frac{1}{2}$ mill. longis
ex albo azureo-perficinis. — Stamina
sex subaequilonga, edentula, petalis
breviora filamentis brev. staminibus, albis,
antheris flavis, dein fuscis. Pistilli
ovarium subphaerium, stylus brevis,
stigma ^{perovum} subcapitellatum
Siliulae ^{majorculae} fere exequite rotundatae,
crassiusculae complanatae, margine semis-
pino ~~sem~~ achlorophylloso circumdatae,
vix apice emarginatae, stylo longiusculo
in apiculatae. Dissepimentum valvis contra

versum, elliptico-lanceolatum, tenuissimum,
semina & in quaque localitate⁴ fructulo
paulo longiora, elliptica, emarginata
granulosa -

Obs. A *Draba punctulata* Brown, a
de Candolle inter species ~~pro~~ dubias
recessita recedit: statura major, scapulis
folio longioribus; floribus masculinis
nec unguinis, purpureis nec albis -
Insuper non est *Draba*, quia gaudet
silicula transversa^{et angustisepala}, dum in *Draba*
est parallelosepala et latisepta
Hutchinsonia differt a *Thlaspidi* siliculis
non alatis, a *Capella* siliculis non
triangularibus, a *Tesdalia* staminibus
non appendiculatis -

Minime est *Draba punctulata* B. Brown, cum habet
petala bipida (Willd. Sp. Syst. Veg. II. 875)
degen ad *Erophilum* pertinent -

Est *Donopodium acule* Richb. Torr. cat. 7. W. 874.
Cochlearia acutifolia Desf. DC. W. etc. Spontanea
in Lusitania, nomen *Louraeortia*, in Westphalia
introducenda, nunc sponte illuc exiit et multiplicatur

* Ruscus cotryphes Mill. nascit a M. racemosa
 foliis brevibus, strictius, floribus glabris,
 variis, capitulis secundariis. Frequenter
 est in prat. a Concliano ad Ceretam.

* Myosotis sylvatica Hoffm. Frequenter in sylva i. Martello
 et in prat. a Cereto etc. Nunc cum
 M. intermedia confunditur, sed apparet differt:
 corollae limbo planior, appendicibus paucioribus
 recurvis, corollae aequaliore, et tubulose.

* Saxifraga tridactylites L. - β oxilis - Frequenter
 cum specie praeterita in mont. v. v. v.

* Geranium pyrenaicum Linn. fere absque dubio
 est meum. G. orthosium. Optime respondet
 descriptioni. Reichenbachianae in Her. exar. f.

* Arabis Torrita Linn. In rupibus et mont. v. v. v.
 Terravallij. Rehb. Her. 2. 4345. et. flor.
 minus octoleuca!

* Adonis Montebelliana L. In M. S. Laurenti, prope
 Terravallum, nec in v. v. v. sylva Martello,
 sociis Myosotis, Dent. bulb., Card. trifolia,
Alis. urtica, Asp. taurina, R. longirima, etc.

* Pell. Pastorum Michx. In M. Terravallum f.

* Aronia Anclanthica Pohl. In petasis montium
 circa Ceretam et Terravallum. Folia acutiora
 quam ab. autibus indicata; sed figura Clusii
 ramulorum juvenum representative convenit et
 florum in Raveller. optima. Seducunt
 ma. tantum uniflori, ut habet Pohlmann, f. Symm.
 Tep. A. 300 - optima, juvenum et adultum ramulorum f. Symm.

Offic. d. cum ligno o. b. hunc
 flos d. cum ligno o. b. hunc
 flos d. cum ligno o. b. hunc

Veronica didyma Ten. cum *agrostis* junct. J. Pentheu.
~~*Halimolobos*~~ *obscurum* veram *agrostem*, dum *Pentheu*
~~ad murem~~. *Didymum*, inq. sub nomine *polistae*
fieri. *Veronica* *perfoliata* in *Rhb.* in. *Veronica* *ord.*
Ver. agrostis habet capsulas glanduloso-pilosas.
in *Didyma* investigandas.

Myosotis arvensis mea (Prop. Trev. 94) non est L. *Willd.*
Myosotis *arvensis* *Meib.* cum *Rhb.*, *DC.* *Myosotis*
Rhb. *M. hippida* appellanda. *Myosotis* *arvensis*
DC. promittit *fructu* *relatum* *delendum* *est*. *Myosotis*
Cuscuta Epithymum *hirs.* non L. (*C. minor* *C. Bauh.*, *Chrys.*)
europaea L. in parte (*C. major* *C. Bauh.*, *Chrys.*)
C. Ep. β *infolii* *Publ.* *hu* *hirs.* *C. minor*

Veronica agrostis Linn. et *V. didyma* Ten. a *selva*
obscurum in *ap.* et *hortis*, *sepis* *sociis* *N. agrostis*
Si species bene distinguo et determino *N. agrostis*
L. a *V. didyma* Tenon recedit: foliis β *majoribus*
 β cum *planta* *hirsutioribus*; *floribus* *calyce* *sempre* *univertis*,
(in *Didyma* *calycem* *quant.*) *albis*, cum *logo* *super* *peristoma*
striato; *sepatis* *longioribus* et *thickioribus*, *sepis* *levis*
vicinis, *capsulas* *nubem* *superantibus*, *majis* *divaricatis*,
capsula *minor*, *humida* et *pilis* *longioribus* *adpressis*.
planta *caule* *laxum* *hirsutum*.

Viola hirta in *pratib.* a *selva* *pere* *Mantellum*.

Lamium *bracteatum* β *album* a *selva*, *raro*.

Gymnophytum *tuberosum* *Schumgr.* β *maioribus* *Say* β *Chrys.*

Gmel. β *tuberosum* β *tuberosum* *Berthol.*

Suares *Trev.* 93) *hinc* *spatiata* a *S. tuberosa*

L. recedit: *planta* *minor*, *radiciforme*, *florum*

lobis *diversis*, et *prosertim* *appendicibus* *interst.*

humilibus *exsertis*. β *Alpe* a *selva*

aperte 17 1865 (in *meo* *sp.* *di.*)

Glechoma *hederacea* β *hirsuta* (*S. hirsuta* *W.K.*) α

sepe a *selva*, *Queda*.

~~Glechoma hirsutum W. H.
Asiatic Cereales. Phæn
habitu of maple in the reced
a G. hirsuta~~

~~Mythology were collected
Chen. Lys. Puntia; J. Lys.
efflu~~

~~Wing. guen. Jy. a. Lys. Lys.
Simphytum tuberosum. Lys. Lys.
Thalictrum aquilegifolium
Allium persicum
X Caltha palustris
X Galium aparine
Vinca major - a. Lys. Lys.~~

Plantae circa Cuscutam C. lae
Pascha 65.

~~Caren oruthopada~~

~~— glauca~~

~~— praecox~~

~~Euphorbia peruviana~~

~~— amygdaloides~~

} communes

~~Anemone hepatica~~

~~Weberia carnea~~

~~Taraxacum palustre - Cuscuta et~~

~~Hieracium in pratibus~~

~~Gentiana verna~~

~~Plantago lanceolata~~

~~capitata~~



Cineraria longifolia Vig?

In monte ad S. Laurentium.
21 april. 1865.

- a. ramulus florifer -
b. flos radialis -
c. flos strobilae

1



Geranium malle. L.

— var. β *grandiflorum* ^{Wj.}

Geranium villosum.

Pohl.

a. ramoscello fiorito


b. petalo

c. sepalo

—

d. ramoscello fruttifero

e. arillo spogliato dei sepali



Sida Abutilon Linn - In hortis
 culta sed spontanea, forte
 Pothos in humilis plantis vero
 nati vera patria ex hortis augea?
~~Callirhoe pedata A. Gr. Arkansas~~
~~(Nuttallia Hook - Sida Spr) Cutler~~
~~Malva origina L. In Syria~~
~~in hortis introducta, et quesi.~~
~~in Nigeria facta -~~

$$\begin{array}{r}
 48 \\
 180 \\
 \hline
 576
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 48 \\
 12 \\
 \hline
 48
 \end{array}$$

Pulsatilla pratensis Mill. B. & H.
 et fl. examp. n. 4655.
 In muris circa Comum Lave
 18 ap. 1865 -
 A Pulsatilla vulgaris, quam pro
 proculdubio in partibus Camalo
 alio tempore de a. 1771, recedit
 floribus mutanthis, campanulatis
 petalis oppositis reflexis utique.
 nec aliud dixerim uides,
 nisi ex longitudine staminum
 ex laevitudine fit, quod
 hecenus nescio deciderit

~~Drosera septentrionalis Turra~~ ⁽⁺⁾ ~~[D. rotundifolia et D. longifolia L.] Nelle paludi prossime al fiume Piave.~~

~~Oxalis tetradifolia L. Presso Fregene.~~
~~Nasturtium amphitrium R. Br. Nel sito a Cuneo.~~
~~Allium oleraceum L. Presso alcune siepi ombrose a Selva, Gravara, Bavaria.~~

Fin alle Canapombree.

~~Lactuca scariola L. var. esculenta~~

~~Phleum Michxii All. Nel rovereto del M. Grappa (Montebelluna, in abbar. Belluno)~~
~~Asperum Vill. Nei prati aridi, special- mente di collina a Colfosco, Cornuda.~~

~~Festuca ovina L. var. violacea. Presso il C. San Salvatore (Belluno)~~
~~Flavescens Bell. Nel M. Grappa~~

~~Calamagrostis acutiflora H. Nel M. Grappa~~ Monteb.
~~Stichophylla Vill. Nel M. Grappa~~

~~Scirpus sylvaticus L. Nei prati paludosi attorno Treviso.~~

100

70

100

55

~~Sisymbrium angustifolium~~ - 325

~~Senecio Dorris A. J. Palo, Curato.~~

~~Orchis sambucina L. var. inornata L.~~

~~Hemerocallis Monorchis R. Brown.~~

~~Malachium matronum Rott.~~

~~Orobancha minor L.~~

~~" caryophyllacea L.~~

~~Orchis maculata~~

~~" papilionacea~~

~~Platanthera bifolia.~~

~~Regeneria diuina.~~

~~Samolus Viterbensi L. A. J. Palo~~

~~Tetraglochin filipes M. & A.~~

~~Conitis maculata L.~~

~~Ononis Natrix~~

~~Malva Alcea L. n. 16. ad Arcade.~~

~~Salvia pratensis L. var. diuina Rott.~~

~~Cyperus longus L. J. Curato.~~

~~- var. badius (C. badius Pers!) : spiculis
lineari-lanceolatis, ^{elongatis} canalicatis, inualuro
subtriphytis, foliis angustioribus.~~

~~Sonchus oleraceus L. N. longus inultus~~

~~Mugilans?~~

~~Clematis Vitiella A. Myricis~~

Appendici. 21 Giugn. 63. 1-3 subscutibus, ovatis,
Plantago Coronopus L. Nelle apliciis, ~~ma~~ ^{multa} culmi:
fessure delle pietre in via, apice spicas valde
nanga del portello di Trisimperante. Ad ripas

Opium graveolens Hof. Lung. Htis Tarasini.

Il f. filo fuori del portello. Solium temulentum L. var.

Neseda odorata L. In d'una aristatum. Nei campi di Selva.
maraglia insieme ad Ortho Quopordon Meanthium L.
erbe odorali fuori del portello, ai margini delle vie a
Zello.

Videloago

Amaranthus prostratus Nei Crocus vernus All. var.
luoghi aridi, incolti presso & pariflorus Rehb. Nei
il portello.

Sinapis arvensis L. Nei luoghi ^{presso il portello} Trabanchet emedat Ben.
gli incolti presso il portello. Nei prati a Bavaria, Cusig.
& a Cusignaua, e a Cusignaua.

Sorarium rotundifolium L. Cirsium serratuloides Scop.
Lungo i muri fuori del portello. Nei prati a Cusignaua,
Selva, Camalo.

Scirpus pungens Urticula Oner. Ho qualche molo
basi pare folioso, super, e per ritenere che il
ne nudo, triquet, spic. C. canum All. di alcune
nostri botanici sia da riferirsi
al C. serratuloides Scop.

~~Senecio Dorris A. S. Pale, Quercus~~

~~Orchis sambucina L. var. inornata L~~

~~Herminium Monorchis R. Brown.~~

~~Malachium matronum Rott.~~

~~Orobancha minor L.~~

~~" caryophyllacea L.~~

~~Orchis maculata~~

~~" papilionacea~~

~~Platanthera bifolia.~~

~~Begonia decolor.~~

~~Samolus Waterandi L. A. S. Pale~~

~~Tetragolobus subquadrifidus M. & A.~~

~~Conthia maculata 76~~

~~Ononis Natrix~~

~~Malva Alcea L. n. 16. Ad Arade.~~

~~Silene pratensis L. var. dimorpha Rott.~~

~~Cyperus longus L. D. Quercus.~~

~~- var. badius (C. badius Desf.) : spiculis
linearibus-lanceolatis, ^{elongatis} cernuis, involucri
subtriphylo, foliis angustioribus.~~

~~Sonchus oleraceus L. N. longifolius L.~~

~~Mugliano.~~

~~Clematis Vitiella A. Myricus~~

Gedranium molle L. Alle
 rive erbose dei fontali e
 delle vie e Selva, Caudolo etc. 11 ~~Santolima~~
Silene gallica L. Sulle mu- ~~Spiranthes pinnatifida~~ Ric.
 ra di Treviso. ~~Paldingera arundinacea~~
Lamium amplexicaule L. ~~Campanula Rapunculif~~
 Comune negli orti a Cusignana. ~~Anagallis cerulea~~ Schreb.
~~Alopecurus glaucolatus~~ e Sideranthus annuus
 Presso gli stagni ombrosi. Meryanthes bifoliata.
 nel B. Martello e presso Aspidium Thelypteris
 i fontali a Cusignana, Ariinto. Scirpus lacustris.
Cynoglossum picinum Vit. a Chloro perfoliata
 Cusignana Thellandrium aquaticum
Hydrocharis Majus rari. Potamogeton natans
 A Ariinto; e così le seguenti: 11 pusillum.
Rumex crispus
Carduus palustris
Senecio paludosus
Hottentia palustris
Carex distans
 11 Oederi
Juncus obtusiflorus Physcomitrium Schreb. All.
 alle Sulle mura Martello che
 che suona bene le fiave.

~~*Poligonum nodosum* Pers. Arbo. le aspe. ^{Site: Treviso.}
Saxifraga crustata Verd. Alle radici ^{sopra} delle
alpi a Saravalle, Trienza.~~

~~*Ranunculus flammula* L. A Gaieto
Infolium ochroleucum L. Nei prati secchi
collini del b. Mandello, a Caerano, etc.
Robertia caulescens L. Nella fossure
delle mpi. Lungo la Riva a Narvesa, Savo-
ia etc.~~

~~*Silium bulbiferum* L. In una macchia a Selva
nella campagna detta: al Palazzo, rari-
ssimo ove non fiorisce; rampicante.~~

~~*Xanthium macrocarpum* DC. Nei campi
a Fontane nei campi presso la cascina
del sig. Baratti; a Treignano al mar-
gine d'un campo.~~

~~*Verbascum lychnitidis* L. A Villa
Vicina del gen. *Leptularia* G. punga:
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc. Del
^{Bellgards} Giappone, introdotto di recente e per suo aspetto
generale poco confuso colla *Salpa bigonioides*
Walt. li vede nei boschetti e li più alti
di tutta la provincia.~~

~~Piada del Convolvulus. Pharbitis hispida
Choisy [Convolvulus purpureus L.] Della
America meridionale, ora è coltivata in
numerosi varietà in quasi tutti gli orti, dove
si riproduce senza cultura.~~

~~Vulgo: Lbordeon. Dell'oriente.
Avena orientale Schreb. Nei campi
commista alla A. sativa, lungo le vie
a Selva, quasi spontanea.~~

~~Andropogon (Laghuus) holoseris Pers. Lungo
le vie a Mozzana. Euphrasia verna Willd.~~

~~Urticaria minor L. In alcuni rivoli della
gr. Fingiano (Terra)~~

~~Cryptis aculeata Poir. Nei luoghi aridi per.
Diphacis laciniata L.
Le ripe della Piave (Terra)~~

~~Erithraea spicata Pers. Presso il f. Piave (T).~~

~~— pulchella Zing. Lungo i margini
umidetti delle vie a Mozzana.~~

~~Acorus Calamus L. Presso Capriva (Terra)~~

~~Ala Rob. Pseudocallis L. Di semp. del Tiro.~~

~~(1780) cresceva specialmente nel Territorio.
Himantus humilis L. Nelle selve presso la
Piave (Terra).~~

N^o 1^o ^{de}
Vare spore compajon in questa bene memoria
~~la quale ha~~ ~~non~~ ~~registrate~~ ~~non~~ ~~registrate~~ ~~de~~
nelle flore venete finor publiche

Argemone ochroleuca Sweet.
Archuzia provera Ben

